

11 березня 2019 р.

Задача 1. Розв'язати задачу багато-критеріальної оптимізації


$$f_1 = -x_1 - x_2 \rightarrow \max, \quad f_2 = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max, \quad f_3 = x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

з допустимою областю що визначається нерівностями

$$x_1 + x_2 \leq 4, \quad x_1 + 2x_2 \leq 6, \quad x_{1,2} \geq 0$$

методом послідовних поступок (величини поступок вибрати самостійно).

Розв'язок. Перш за все зобразимо допустиму область G_0 :




З графічних міркувань знаходимо

$$\tilde{x}_1 = \arg \max f_1(x_1, x_2) = (0, 0), \quad f_1^* = \max_{x \in G_0} f_1(x_1, x_2) = 0.$$

Покладаючи величину поступки Δf_1 за першим критерієм рівною 2 отримуємо, що до допустимої області додається умова

$$f_1(x_1, x_2) \geq f_1^* - \Delta f_1 = -2,$$

тому уточнена допустима область G_1 має вигляд:




З графічних міркувань знаходимо

$$\tilde{x}_2 = \arg \max f_2(x_1, x_2) = (2, 0), \quad f_2^* = \max_{x \in G_1} f_2(x_1, x_2) = 4.$$

Покладаючи величину поступки Δf_2 за другим критерієм рівною 2 отримуємо, що до допустимої області додається умова

$$f_2(x_1, x_2) \geq f_2^* - \Delta f_2 = 2,$$

тому уточнена допустима область G_2 має вигляд:



З графічних міркувань знаходимо

$$\tilde{x}_3 = \arg \max f_3(x_1, x_2) = (0, 2), \quad f_3^* = \max_{x \in G_2} f_3(x_1, x_2) = 6.$$

Оскільки це останній критерій, то ми не робимо поступок, а просто кажемо, що знайдена точка \tilde{x}_3 є розв'язком x^* .

Наостанок зауважимо, що $f(x^*) = (-2, 2, 6)$.

Задача 2. Розв'язати задачу багато-критеріальної оптимізації


$$f_1 = -x_1 - 2x_2 \rightarrow \max, \quad f_2 = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max, \quad f_3 = x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

з допустимою областю що визначається нерівностями

$$x_1 + x_2 \leq 4, \quad 2x_1 + x_2 \leq 6, \quad x_{1,2} \geq 0$$

методом послідовних поступок (величини поступок вибрати самостійно).

Розв'язок. Перш за все зобразимо допустиму область G_0 :




З графічних міркувань знаходимо

$$\tilde{x}_1 = \arg \max_{x \in G_0} f_1(x_1, x_2) = (0, 0), \quad f_1^* = \max_{x \in G_0} f_1(x_1, x_2) = 0.$$

Покладаючи величину поступки Δf_1 за першим критерієм рівною 4 отримуємо, що до допустимої області додається умова

$$f_1(x_1, x_2) \geq f_1^* - \Delta f_1 = -4,$$

тому уточнена допустима область G_1 має вигляд:




З графічних міркувань знаходимо

$$\tilde{x}_2 = \arg \max_{x \in G_1} f_2(x_1, x_2) = (3 - t, 2t), \quad t \in \left[0, \frac{1}{3}\right], \quad f_2^* = \max_{x \in G_1} f_2(x_1, x_2) = 6.$$

Покладаючи величину поступки Δf_2 за другим критерієм рівною 3 отримуємо, що до допустимої області додається умова

$$f_2(x_1, x_2) \geq f_2^* - \Delta f_2 = 3,$$

тому уточнена допустима область G_2 має вигляд:



З графічних міркувань знаходимо

$$\tilde{x}_3 = \arg \max f_3(x_1, x_2) = \left(\frac{2}{3}, 1 \frac{2}{3} \right), \quad f_3^* = \max_{x \in G_2} f_3(x_1, x_2) = 5 \frac{2}{3}.$$

Оскільки це останній критерій, то ми не робимо поступок, а просто кажемо, що знайдена точка \tilde{x}_3 є розв'язком x^* .

Наостанок зауважимо, що

$$f(x^*) = \left(-4, 3, 5 \frac{2}{3} \right).$$