



Amar com protecção

Unidade Didáctica 1

Fundamentos Básicos da PrEP

No final desta unidade os participantes deverão ser capazes de:

- Explicar os fundamentos básicos do PrEP.
- Descrever as três componentes da prevenção combinada.
- Explicar o conceito de PrEP.
- Descrever os mecanismos de funcionamento da PrEP oral.
- Identificar o tempo necessário para que a PrEP comece a fazer efeito.
- Definir Profilaxia pós-exposição (PPE).
- Descrever os mecanismos de funcionamento da PPE para o HIV.
- Diferenciar PrEP de PPE e TARV.

- A prevenção do HIV exige mudanças durante a vida de uma pessoa.
- A **prevenção combinada** é uma combinação de intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais que diminuem o risco de aquisição de HIV.
 - Abordagens combinadas podem resultar em um impacto maior do que o uso de intervenções individuais isoladas.
- Os medicamentos antirretrovirais (ARVs) usados na PrEP são uma importante ferramenta adicional de prevenção.

Prevenção Combinada

Estrutural

- Políticas
- Leis
- Ambiente regulatório
- Cultura
- Mobilização financeira

Comportamental

- Educação
- Aconselhamento
- Redução do estigma
- Redução de danos
- Intervenções de adesão

Biomédica

- Teste de HIV
- Preservativos
- CMMV
- PTV
- Tratamento de ITS
- Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)
- Profilaxia Pós-Exposição (PPE)
- Tratamento antirretroviral para prevenção (TARV)

O que é profilaxia pré-exposição (PrEP)?





Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)

- A **PrEP oral** é um novo método de prevenção da infecção pelo HIV que consiste na toma diária de medicamentos antirretrovirais por **peessoas HIV negativas** de modo a reduzir a probabilidade de adquirir a infecção.

Pré

- Antes

Exposição

- Actividade que pode levar à infecção por HIV

Profilaxia

- Prevenção

Como funciona o PrEP oral?





Mecanismos de Funcionamento da PrEP Oral

- Combinação de dois medicamentos (tenofovir-TDF/emtricitabina-FTC) ou (tenofovir-TDF/lamivudina-3TC) que bloqueiam algumas etapas que o HIV usa para infectar o organismo.
- Se a pessoa tomar PrEP diariamente, a medicação pode impedir que o HIV se estabeleça e se espalhe pelo organismo da pessoa.

ATENÇÃO: *PrEP só tem efeito se a pessoa tomar os comprimidos todos os dias enquanto estiver em risco. Caso contrário, pode não haver concentração suficiente do medicamento na corrente sanguínea para bloquear o vírus.*

Em quanto tempo a PrEP começa a fazer efeito?



Em quanto tempo a PrEP começa a fazer efeito?

- Após 7 dias de uso para relação anal e 20 dias de uso para relação vaginal.

IMPORTANTE!

A PrEP não protege de outras Infecções de Transmissão Sexual (tais como sífilis, clamídia e gonorreia) e de gravidez indesejada. Portanto, deve ser combinada com outras formas de prevenção, como o preservativo.

*O que é profilaxia pós-exposição (**PPE**)?*



- A **Profilaxia pós-exposição (PPE)** é uma medida de urgência de prevenção da infecção pelo HIV, hepatites virais e outras infecções de transmissão sexual (ITS), que consiste no uso de medicamentos para reduzir o risco de adquirir essas infecções.
- Deve ser utilizada **após** qualquer situação em que exista risco de contágio, tais como:
 - Violência sexual.
 - Relação sexual desprotegida com parceiro sexual HIV+ (sem o uso do preservativo ou com o rompimento do mesmo).
 - Acidente ocupacional (com instrumentos perfuro-cortantes ou contacto directo com material biológico).

Como funciona a PPE para o HIV?



- Combinação de 3 medicamentos (**tenofovir-TDF/lamivudina-3TC/Dolutegravil-DTG**) que bloqueiam algumas etapas que o HIV usa para infectar o organismo.
- Trata-se de uma **urgência médica**, que deve ser iniciada o mais rápido possível - preferencialmente nas primeiras 2 horas após a exposição e no máximo até 72 horas.
- A duração da PPE é de **28 dias** e a pessoa deve ser acompanhada por um provedor de saúde.


O que é TARV?



Tratamento Antiretroviral (TARV)

- A combinação usada para a primeira Linha do TARV em adultos de 15+ anos é o **TDF/3TC/DTG**.
- TARV é oferecido a pessoas infectadas pelo HIV para se manter saudáveis e prevenir a transmissão.
- O **tratamento do HIV** exige a adesão de longa duração (para toda a vida) com uma dosagem consistente, totalmente supressiva.

Como funciona a PrEP, PPE e TARV?



Quais são as semelhanças e diferenças entre profilaxia pré-exposição (PrEP) , profilaxia pós-exposição (PPE) e tratamento antirretroviral (TARV)?



Semelhanças e diferenças entre PrEP, PPE e TARV

	PrEP	PPE	TARV
Utilizada por pessoas não infectadas pelo HIV	X	X	
Uso de antirretrovirais para prevenir a infecção pelo HIV	X	X	X
Eficazes quando tomado correctamente e de forma consistente	X	X	X
ARV iniciado antes da exposição ao HIV	X		

Semelhanças e diferenças entre PrEP, PPE e TARV

	PrEP	PPE	TARV
Prescrito por clínicos (TMG, Médico, Enfermeiro)	X	X	X
ARV iniciados após a exposição		X	
Tempo recomendado para a utilização	Durante períodos de alto risco de infecção pelo HIV	28 dias	Toda a vida



*Dúvidas!
Comentários!*

- A **prevenção combinada** é a combinação de intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais que diminuem o risco de aquisição de HIV, sendo o seu impacto maior do que o uso de intervenções individuais isoladas.
- A **PrEP oral** é um método de prevenção da infecção pelo HIV que consiste na toma diária de medicamentos antirretrovirais por **pessoas HIV negativas** de modo a reduzir a probabilidade de adquirir a infecção.
- A PrEP só tem efeito se a pessoa tomar os comprimidos todos os dias enquanto estiver em risco.
- A PrEP não protege de outras Infecções de Transmissão Sexual e de gravidez indesejada, devendo por isso ser combinada com o uso correcto e persistente de preservativo.