



Amar com proteção

Unidade Didáctica 2

Elegibilidade para a PrEP

No final desta unidade os participantes deverão ser capazes de:

- Identificar o grupo-alvo da PrEP.
- Listar os critérios de elegibilidade para a Profilaxia Pré-Exposição.
- Explicar o Algoritmo de avaliação da elegibilidade para o início da PrEP.
- Descrever os procedimentos para Confirmação do Sero-estado do Utente
- Explicar o que se entende por Risco substancial de infeção pelo HIV.
- Descrever como avaliar o risco substancial da infecção pelo HIV.
- Explicar como avaliar o risco substancial de infecção pelo HIV nas subpopulações.
- Listar os Principais Sintomas da Infecção Aguda Pelo HIV.
- Explicar porque avaliar a infecção aguda pelo HIV.

Atenção!

- A PrEP deve ser oferecida a todas as pessoas com **idade igual ou superior a 15 anos** pertencentes ao **grupo alvo** e que reúnam **todos os critérios de elegibilidade**.

Qual é o grupo alvo da PrEP?



- Parceiro(a) negativo(a) de casal sero-discordante.
- Adolescentes e Jovens dos 15-24 anos em risco (ambos sexos).
- População-Chave (HSH, TS, PID, Reclusos, Transgénero).
- Mulheres grávidas e lactantes em risco.
- Homens 25+ em risco (**camionistas de longo curso, mineiros e militares**).

Quais são os critérios de elegibilidade para iniciar a PrEP?





Critérios de elegibilidade para a Profilaxia Pré-Exposição

- **Sexualmente activo(a)** - indivíduo engajado em actividade vaginal, anal ou oral com um ou mais parceiros nos últimos 6 meses anteriores a avaliação.
- Ter resultado do teste de HIV negativo (**testagem feita dentro de três meses em relação a data da última testagem**).
- Estar em risco substancial de infecção pelo HIV.
- Não ter nenhuma suspeita de infecção aguda pelo HIV (**rastreio de sinais e sintomas**).
- Sem contraindicação a nenhum dos medicamentos usados para a PrEP (HTA e Diabetes não controladas, doença renal crónica).

Atenção!
Só inicia a PrEP utente que consente .

Como confirmar o sero-estado do utente?





Confirmação do Sero-estado do Utente (1)

Testagem do HIV no contexto da PrEP

- A testagem será feita para a confirmação do sero-estado, caso o utente não tenha um documento que comprove um teste negativo válido nos últimos 3 meses
- O teste de HIV deve ser realizado com base nas directrizes e algoritmos nacionais, utilizando os testes rápidos. Pode ser realizado nas portas onde é feito o rastreio para a elegibilidade ou na paragem única da PrEP.
- Deve-se encaminhar prontamente os **utentes com resultados positivo** aos serviços de cuidados e tratamento do HIV.
- Aos **utentes com resultado negativo** ofereça a PrEP e outros serviços de prevenção (CMMV, preservativos, lubrificantes, redução de danos....)

Atenção!

Utentes com resultado indeterminado não iniciam a PrEP.

- Caso o resultado seja indeterminado, durante as consultas de seguimento, a PrEP deverá ser interrompida.
- Para as duas situações acima referidas é obrigatório o seguimento conforme algoritmo nacional de testagem e após confirmação de resultado negativo reavaliar a elegibilidade para a PrEP.



Confirmação do Sero-estado do Utente (3)

Testagem do HIV no contexto da PrEP

- O aconselhamento e testagem para o HIV deve **ser repetido a cada 3 meses após o início da PrEP** para descartar a sero-conversão e o diagnóstico positivo. No entanto, **na primeira visita de seguimento (30 dias após o início) devem ser retestados somente utentes:**
 1. Que apresentem sinais e sintomas sugestivos de infecção aguda pelo HIV.
 2. Com teste feito há mais de três meses de validade em relação a data da última testagem.

***O que é risco substancial de infecção pelo
HIV?***



Risco substancial de infeção pelo HIV

- O risco substancial de infecção pelo HIV é definido como a incidência de HIV em torno ou superior a 3 por 100 pessoas/ano na ausência da PrEP (**com base no contexto epidemiológico e na avaliação do risco individual**).
- A título individual o risco varia em diferentes grupos populacionais, dependendo do comportamento individual e das características dos parceiros sexuais.
- A identificação e oferta de PrEP oral a quem corre risco substancial leva a:

Grande
benefício
individual

Forte
impacto
epidemiológico

Investimento
eficiente de
recursos

***Como avaliar o risco substancial de
infecção pelo HIV?***



Avaliação do risco substancial da infecção pelo HIV (1)

- O risco substancial de infecção pelo HIV deve ser avaliado a cada consulta para identificar se o utente apresenta algum factor de risco no momento da avaliação.
- As perguntas de rastreio devem ser estruturadas com foco no comportamento das pessoas, ao invés de sua identidade sexual, e devem se referir a um período de tempo definido (**6 meses anteriores a consulta**).

NOTA!

- É importante que os profissionais de saúde sejam sensíveis, solidários e não preconceituosos para não desenvolver um processo que possa desencorajar o uso da PrEP.

Avaliação do risco substancial da infecção pelo HIV (2)

A avaliação deve ser feita de modo a identificar se o utente apresenta ou relata **um dos seguintes factores de risco nos últimos 6 meses:**

- Relação sexual vaginal ou anal com mais de 1 parceiro sem o uso correcto e consistente do preservativo **OU**
- História de ITS **OU**
- Parceiro sexual HIV positivo que não esteja em TARV ou não tenha CV indetectável **OU**
- Parceiro sexual que seja usuário de drogas injectáveis com estado serológico desconhecido **OU**
- Partilha de seringas com um usuário de drogas injectáveis com estado serológico desconhecido **OU**
- História ou uso recorrente de profilaxia pós-exposição (PPE) por exposição sexual ao HIV.

Avaliação de risco substancial de infecção pelo HIV nas subpopulações (1)

GRUPOS POPULACIONAIS	FACTORES DE RISCO NOS ÚLTIMOS SEIS MESES
Casais Sero-discordantes	• Parceiro HIV positivo que não esteja em TARV. • Parceiro está em TARV mas a carga viral não esteja indetectável. • Desconhecimento da adesão ao TARV do parceiro positivo. • Ter mais de 1 parceiro para além do parceiro HIV positivo. • Parceiro HIV+ que apresente actualmente condição activa do estágio 3 ou 4 da OMS.
População-Chave (HSH,TS,PID, Reclusos e Transgénero)	• Usar o Algoritmo para a avaliação de comportamentos de risco e o Guião para identificação e avaliação de comportamentos de risco das populações-chave.



Avaliação de risco substancial de infecção pelo HIV nas subpopulações (2)

GRUPOS POPULACIONAIS

FACTORES DE RISCO NOS ÚLTIMOS SEIS MESES

Adolescente ou Mulher grávida e lactante HIV negativa com idade igual ou superior a 10 anos de idade.

São elegíveis a PrEP as Adolescentes/Mulheres Grávida ou Lactante com idade igual ou superior a 10 anos que reúnam os factores listados abaixo:

1. Adolescente/Mulher Grávida ou Lactante cujo parceiro sexual HIV+ não esteja em TARV, ou está em TARV mas cuja carga viral não esteja indetectável, ou que apresente actualmente condição activa do estágio 3 ou 4 da OMS (Casal serodiscordante) OU
2. Adolescente/Mulher Grávida ou Lactante pertencente a população-chave : trabalhadora de sexo, PID, reclusa. OU
3. Adolescente/Mulher Grávida ou Lactante que desconhece o seroestado do parceiro sexual e que não se enquadre em nenhum dos critérios anteriores (Adolescente/Mulher Grávida ou Lactante em Risco) + um dos seguintes factores:
 - A adolescente/mulher grávida ou lactante que tenha mais de um parceiro sexual actualmente ou nos últimos 3 meses OU
 - A adolescente/mulher grávida ou lactante com diagnóstico sintromico de ITS nos últimos 6 meses e/ou diagnóstico de infecção por sífilis OU
 - O parceiro sexual que tenha mais de um(a) parceiro(a) sexual actualmente ou nos últimos 3 meses OU
 - O parceiro sexual pertencente a população-chave e de risco OU
 - O parceiro sexual tem ocupação de maior risco (camionistas de longo curso, mineiros e militares).



Avaliação de risco substancial de infecção pelo HIV nas subpopulações (3)

GRUPOS POPULACIONAIS

FACTORES DE RISCO NOS ÚLTIMOS SEIS MESES

Adolescentes e Jovens 15-24
anos de idade em risco

São elegíveis para a PrEP todos os adolescentes e jovens com idade entre os 15 - 24 anos que apresentem um dos factores de risco listados abaixo nos últimos seis (6) meses:

- Relação sexual vaginal ou anal com mais de 1 parceiro sem o uso correcto e consistente do preservativo OU
- História de ITS OU
- História ou uso recorrente de profilaxia pós-exposição (PPE) por exposição sexual ao HIV OU
- Parceiro sexual HIV positivo que não esteja em TARV ou não tenha CV indetectável OU
- Parceiro sexual que seja usuário de drogas injectáveis com estado serológico desconhecido OU
- Partilha de seringas com PID cujo estado serológico é desconhecido
- Envolvido em sexo transgeracional sem o uso correcto e consistente do preservativo OU
- Relações sexuais em troca de dinheiro ou bens (sexo transaccional).

GRUPOS POPULACIONAIS

Casos excepcionais de elegibilidade para PrEP em Adolescentes < 15 anos de idade

FACTORES DE RISCO NOS ÚLTIMOS SEIS MESES

Consideram-se também elegíveis a PrEP todos os adolescentes e jovens com idade dos 10 – 14 anos e peso ≥ 35 kg, que apresentem um dos factores de risco listados abaixo nos últimos seis (6) meses:

1. Adolescentes grávidas ou lactantes que reúnam os critérios descritos para MG/ML (Casal serodiscordante, pertencer a população chave ou estar em risco) OU
2. História ou uso recorrente de profilaxia pós-exposição (PPE) por violação sexual (3 episódios ou mais nos últimos 6 meses) OU
3. Envolvido em sexo transgeracional sem o uso correcto e consistente do preservativo OU
4. Envolvido em relações sexuais em troca de dinheiro ou bens (sexo transaccional).



Avaliação de risco substancial de infecção pelo HIV nas subpopulações (4)

GRUPOS POPULACIONAIS

Homens 25+ em risco
(camionistas, mineiros, militares)

FACTORES DE RISCO NOS ÚLTIMOS SEIS MESES

- Relação sexual vaginal ou anal com mais de 1 parceiro sem o uso correcto e consistente do preservativo durante as missões OU
- História de ITS OU
- Parceiro sexual HIV positivo que não esteja em TARV ou não tenha CV indetectável OU
- Parceira sexual que seja usuário de drogas injectáveis com estado serológico desconhecido OU
- Partilha de seringas com um usuário de drogas injectáveis com estado serológico desconhecido OU
- História ou uso recorrente de profilaxia pós-exposição (PPE) sexual ao HIV + *um dos seguintes factores de vulnerabilidade:*
 - Clientes de mulheres trabalhadoras de sexo.
 - Trabalho fora da sua residência habitual.

Grupo Alvo - Classificação da Categoria do Utente

Tabela de Grupo Alvo - Classificação da categoria do(a) utente



Casal Serodiscordante CSD

Categoria	Classificação final
CSD + AJ	► CSD
CSD + HSH	► HSH
CSD + TS	► TS
CSD + TG	► TG
CSD + REC	► REC
CSD + PID	► PID
CSD + PID + TS	► PID
CSD + PID + REC	► PID
CSD + PID + HSH	► PID
CSD + PID + TG	► PID
CSD + TG + TS	► TS
CSD + HSH + TS	► TS
CSD + HSH + REC	► HSH
CSD + HSH + TG	► TG
CSD + AJ + PID	► PID
CSD + AJ + HSH	► HSH
CSD + AJ + TS	► TS
CSD + AJ + TG	► TG
CSD + AJ + REC	► REC



Adolescente e Jovem (AJ) em risco

Categoria	Classificação final
AJ + CSD	► CSD
AJ + HSH	► HSH
AJ + TS	► TS
AJ + TG	► TG
AJ + REC	► REC
AJ + PID	► PID
AJ + PID + TS	► PID
AJ + PID + REC	► PID
AJ + PID + HSH	► PID
AJ + PID + TG	► PID
AJ + TG + TS	► TS
AJ + HSH + TS	► TS
AJ + HSH + REC	► HSH
AJ + HSH + TG	► TG

SIGLAS

PID – Pessoas que Injectam Drogas

TG – Transgéneros

ML – Mulher Lactante

REC – Reclusos

HSH - Homens que fazem sexo com Homens

AJ – Adolescentes e Jovens em risco

MIL – Militar

MG – Mulher Grávida



Mulher Grávida ou Mulher Lactante em Risco

Categoria	Classificação final
MG ou ML cujo o parceiro tem seroestado desconhecido	
MG ou ML cujo o parceiro tem seroestado desconhecido + ITS	► MG ou ML em Risco
MG ou ML cujo o parceiro tem seroestado desconhecido + Parceiro Sexual de PC e de risco	► MG ou ML em Risco
MG ou ML cujo o parceiro tem seroestado desconhecido+ Múltiplos Parceiros	► MG ou ML em Risco
MG ou ML cujo o parceiro tem seroestado desconhecido + Parceiro Sexual com Ocupação de Maior Risco (CLC, MIN, MIL)	► MG ou ML em Risco
MG ou ML em Risco e com outros Comportamentos	
MG ou ML em Risco + AJ	► MG ou ML em Risco
MG ou ML em Risco + CSD	► CSD
MG ou ML em Risco + TS	► TS
MG ou ML em Risco + PID	► PID
MG ou ML em Risco + TG	► TG



Homens com 25/+ anos em risco (Camionista de Longo Curso, Mineiro, Militar)

Categoria	Classificação final
CLC ou MIN ou MIL + CSD	► CSD
CLC ou MIN ou MIL + HSH	► HSH
CLC ou MIN ou MIL + TS	► TS
CLC ou MIN ou MIL + TG	► TG
CLC ou MIN ou MIL + REC	► REC
CLC ou MIN ou MIL + PID	► PID

NOTA: NÃO IMPORTA A ORDEM COMO AS CATEGORIAS SÃO APRESENTADAS, MAS É O MAIOR RISCO QUE DETERMINA A CATEGORIA A SER SELECIONADA.

Ex: AJ+TG►TG será o mesmo se a ordem for TG+AJ►TG

Nos casos em que as combinações acontecem somente entre populações chave, usar a seta com a regra de menor para o maior risco para definir a classificação final. Nesta seta use somente a parte que contém população chave (REC, HSH, TS, TG e PID).

Todo o AJ dos 10 – 14 anos, independente do risco entram apenas na categoria de AJ em Risco.

Menor risco

Maior risco

O que é infecção aguda pelo HIV?




- A infecção aguda por HIV (IAH) é a **fase inicial da doença por HIV**, que é caracterizada por uma elevada carga viral.
- A IAH desenvolve-se **no prazo de duas a quatro semanas** depois que alguém é infectado pelo HIV.
- Aproximadamente 40% a 90% dos pacientes com IAH experimentarão **"sintomas semelhantes aos da gripe"**:
 - Estes sintomas não são específicos para o HIV, eles ocorrem em muitas outras infecções virais.
 - Utentes com infecção aguda pelo HIV são suscetíveis a serem assintomáticos.

Atenção!

NÃO inicie a PrEP em caso de suspeita de IAH.

Principais Sinais e Sintomas da Infecção Aguda Pelo HIV



Porque avaliar a infecção aguda por HIV?



Porque avaliar a infecção aguda pelo HIV?

- Durante a infecção aguda pelo HIV, os anticorpos podem ser inexistentes ou ainda, estar abaixo do limite de detecção
 - Os testes serológicos utilizando teste rápido podem ser negativos.
- A infecção aguda pelo HIV pode ser diagnosticada através de testes rápidos (Determine e Unigold).
 - Repita o teste sorológico de HIV após quatro semanas caso o utente apresente sinais e sintomas de IAH nas últimas 2 a 4 semanas anteriores ao momento de avaliação.

O utente consente em fazer a PrEP?




O utente consente em fazer a PrEP?

- Educação e aconselhamento são oferecidos para ajudar os utentes a fazer uma escolha informada sobre a PrEP.
- Os utentes não devem ser coagidos a usar a PrEP.
- A adesão é maior entre pessoas que sabem que estão em risco de infecção pelo HIV e que estão motivadas a tomar a PrEP.

***Algoritmo de avaliação da elegibilidade para
o início da PrEP?***

Algoritmo de avaliação da elegibilidade para o início da PrEP

Algoritmo de avaliação da elegibilidade para o início da PrEP





**Exercício:
Cenários clínicos**

- José, 22 anos, apresenta-se na US porque está interessado em iniciar a PrEP. Ele relata o uso de preservativo, por vezes durante o sexo com o seu parceiro masculino HIV-positivo. Seu parceiro é saudável e está em TARV há 4 anos. Sua carga viral mais recente "**há alguns meses atrás**" foi relatada como de 1200 cópias/mL. Sua última relação sexual desprotegida foi na semana passada. José está com bom estado geral e não toma nenhuma medicação. Seu teste rápido de HIV foi negativo hoje.
- *Questões:*
 - *O José é elegível a PrEP?*
 - *Em caso afirmativo, que elementos considerou para determinar a elegibilidade?*

- Maria é uma mulher de 18 anos, que se apresenta na US porque se sente doente e teme que ela possa ter HIV. Ela relutantemente explica que durante o ano passado, teve sexo em troca de dinheiro ou presentes para sustentar seus dois filhos. Alguns dos seus parceiros usaram preservativos e outros não. Ela não sabe se seus parceiros têm HIV. Maria relata que está se sentindo fraca e doente. Seu teste rápido de HIV foi negativo hoje.
- **Questões:**
 - *A Maria é elegível a PrEP?*
 - *Caso afirmativo, explique porquê!*
 - *Caso não, justifique!*
 - *Quais outras informações você necessitaria a fim de determinar a elegibilidade?*

- Geralda, esposa e mãe lactante de 30 anos, apresenta-se na US porque ouviu que pode receber remédios que impedirão que ela tenha HIV. Ela suspeita que seu marido esteja a usar drogas injectáveis, já que ele tem marcas de agulha nos braços. Geralda tem medo que seu marido possa ter HIV e que ele irá infectá-la. Ela relata que seu marido não fez testes. O teste rápido de HIV de Geralda foi negativo hoje.
- Questões:
 - *A Geralda é elegível a PrEP?*
 - *Caso afirmativo, explique porquê?*
 - *Que outras informações você necessitaria para determinar a elegibilidade?*

- Daniel, 24 anos apresenta-se na US para tratamento de "bolhas." Ele relata que, durante os últimos dias, tem tido algumas bolhas dolorosas na boca e nos órgãos genitais. Ele se recusa a falar sobre a sua actividade sexual; diz que é um homem casado e fiel à sua esposa. Ele pergunta se pode tomar um medicamento para as bolhas na US, de modo que a sua esposa ou os vizinhos não descubram que ele está a tomar medicamentos. Daniel não quer tomar nenhum medicamento continuamente, já que os seus vizinhos ou a igreja poderiam descobrir e achar que ele tem HIV. Ele se recusa a fazer um teste de HIV.
- **Questões:**
 - *O Daniel é elegível para a PrEP?*
 - *Explique porquê!*



*Dúvidas!
Comentários!*

- A PrEP deve ser oferecida a todas as pessoas com **idade igual ou superior a 15 anos** pertencentes ao **grupo alvo** e que reúnam **todos os critérios de elegibilidade**.
- Existem casos excepcionais de elegibilidade para PrEP em AJ < 14 anos (adolescentes e jovens com idade dos 10 – 14 anos e peso ≥ 35 kg).
- Testagem para o HIV deve ser feita para a confirmação do sero-estado com base nas diretrizes e algoritmos nacionais, utilizando os testes rápidos.
- Os utentes com resultado negativo para o HIV mas não elegíveis a PrEP, devem ser oferecidos outros métodos de prevenção tais como: preservativos, lubrificantes, CMMV, rastreio de ITS e VBG, redução de danos.

- A educação e aconselhamento são oferecidos para ajudar os utentes a fazer uma escolha informada sobre a PrEP por isso, os utentes não devem ser coagidos a usar a PrEP mas sim consentir em fazer a PrEP.
- É importante que se faça uma avaliação do risco substancial de infecção pelo HIV a cada consulta para identificar se o utente apresenta algum factor de risco no momento da avaliação.
- **NÃO inicie a PrEP em caso de suspeita de IAH.**