OBJECTIFS 3

- Utiliser des modèles pré-algébriques pour résoudre des problèmes algébriques.
- Identifier la structure d'un motif évolutif en repérant une régularité.

Algèbre

1. Problèmes algébriques




EXEMPLE •

Thomas a 8 stylos. A eux deux, Thomas et Léa ont 13 stylos. On peut représenter cela par le schéma ci-dessous :

$$\underbrace{8 + ? }_{\text{Thomas}} + \underbrace{13 }_{\text{Total}}$$

Léa a donc 13 stylos – 8 stylos = 5 stylos.

2. Schémas en barres



EXEMPLE 💡

Lors d'une compétition de ski, $650 \in$ sont répartis entre les trois premiers. Le premier reçoit deux fois plus que le troisième et le second reçoit $50 \in$ de plus que le troisième.

On représente la part du troisième par . On obtient le schéma ci-dessous :



Ainsi, le troisième reçoit 150 €, le second 150 € + 50 € = 200 € et le premier 2 × 150 € = 300 €.

EXERCICE 1

Pour la fête d'un village, on organise une course cycliste. Une prime totale de 320 € sera répartie entre les trois premiers coureurs. Le premier touchera la prime d'or, le deuxième la prime d'argent et le troisième la prime de bronze.

La prime d'or s'élève à 70 € de plus que la prime d'argent, et la prime de bronze à 80 € de moins que la prime d'argent.

En utilisant un schéma en barres, donner la valeur en euros de chacune des primes.



√Voir la correction: https://mes-cours-de-maths.fr/cours/sixieme/algebre-logique/#correction-1.

3. Modèle de l'équilibre



EXEMPLE 9

On pèse des melons et un ananas. En réalisant deux pesées, on obtient les résultats suivants :



Ainsi, un ananas pèse 7,5 kg - 5,5 kg - 2 kg. En utilisant la deuxième balance, on obtient que le melon pèse 5,5 kg - 2 \times 2 kg = 1,5 kg.

EXERCICE 2

On pèse des pommes et des poires. En réalisant deux pesées, on obtient les résultats suivants :

Fruits	6666	##
Poids (en g)	620	500

En procédant comme dans l'exemple ci-dessus, déterminer les poids d'une pomme et d'une poire.



Motifs évolutifs



EXEMPLE 🔋

On considère un triangle équilatéral que l'on colorie en turquoise. À chaque étape, on trace dans chaque triangle turquoise un triangle plus clair qui a pour sommet les milieux des côtés du triangle turquoise.











Cette construction porte un nom : c'est le triangle de Sierpiński. On peut déduire le nombre de triangles turquoises à une étape donnée.

- À l'étape 1, il y en a 1.
- À l'étape 2, il y en a 3.

- ..
- À l'étape 6, il y en a $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 243$.

EXERCICE 3


La mosaïque est un art décoratif que l'on retrouve dans beaucoup de constructions. Voici un exemple de mosaïque où des carreaux colorés sont disposés autour de carreaux blancs formant un carré.




Carré de taille 1



Carré de taille 2



Carré de taille 3



Carré de taille 7

