

## OBJECTIFS

- Connaître les lignes trigonométriques dans le triangle rectangle : cosinus, sinus, tangente.
- Mener des raisonnements et s'initier à la démonstration en utilisant les propriétés des figures, des configurations et des transformations.

## I Les fonctions trigonométriques

### 1. Définitions

#### À RETENIR

#### Définitions

Soit  $ABC$  un triangle rectangle en  $A$ .

- On appelle **cosinus de l'angle**  $\widehat{ABC}$  le rapport :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{\text{longueur du côté adjacent à } \widehat{ABC}}{\text{longueur de l'hypoténuse}} = \frac{AB}{BC}$$


- On appelle **sinus de l'angle**  $\widehat{ABC}$  le rapport :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{\text{longueur du côté opposé à } \widehat{ABC}}{\text{longueur de l'hypoténuse}} = \frac{CA}{BC}$$

- On appelle **tangente de l'angle**  $\widehat{ABC}$  le rapport :

$$\tan(\widehat{ABC}) = \frac{\text{longueur du côté opposé à } \widehat{ABC}}{\text{longueur du côté adjacent à } \widehat{ABC}} = \frac{CA}{AB}$$

Le cosinus, le sinus et la tangente sont des grandeurs sans unité.



#### INFORMATION


On peut retenir ces définitions à l'aide du mnémotechnique « CAH-SOH-TOA » :

$$\cos(\text{angle}) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} \quad \sin(\text{angle}) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} \quad \tan(\text{angle}) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

#### EXERCICE 1

On considère le triangle  $DEF$  ci-contre. Effectuer les calculs suivants.

1.  $\cos(\widehat{EFD}) = \dots\dots\dots$
2.  $\sin(\widehat{EFD}) = \dots\dots\dots$
3.  $\tan(\widehat{EFD}) = \dots\dots\dots$



## 2. Propriétés

### À RETENIR

#### Propriétés

Soit  $\alpha$  la mesure d'un angle aigu.

1.  $\cos(\alpha)$  et  $\sin(\alpha)$  sont des nombres compris entre 0 et 1.
2.  $\tan(\alpha) > 0$ .
3.  $\cos(\alpha)^2 + \sin(\alpha)^2 = 1$ .
4.  $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$ .

### EXERCICE 2

L'objectif de cet exercice est de prouver la dernière propriété. Soit  $ABC$  un triangle rectangle en  $A$ .

1. Que vaut  $\sin(\widehat{ABC})$ ?

$\sin(\widehat{ABC}) = \dots\dots\dots$

2. Que vaut  $\cos(\widehat{ABC})$ ?

$\cos(\widehat{ABC}) = \dots\dots\dots$

3. Simplifier le quotient  $\frac{\sin(\widehat{ABC})}{\cos(\widehat{ABC})}$ .

$\frac{\sin(\widehat{ABC})}{\cos(\widehat{ABC})} = \dots\dots\dots$

4. Conclure.  $\dots\dots\dots$

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/trigonometrie/#correction-2>.

## II Utilisation dans un triangle rectangle

### 1. Calculer la longueur d'un côté

### À RETENIR


#### Méthode

Il est possible de calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle si on connaît la longueur d'un côté et la mesure d'un des angles aigus. On trouve la longueur inconnue en utilisant le rapport trigonométrique qui fait intervenir l'angle connu, la longueur connue et la longueur inconnue.

### EXEMPLE

Le triangle  $GHI$  ci-contre est rectangle en  $H$ . Calculons  $IG$ .


$$\begin{aligned}\cos(\widehat{IGH}) &= \frac{GH}{IG} \\ \cos(60^\circ) &= \frac{1,5}{IG} \\ IG &= \frac{1,5}{\cos(60^\circ)} = 3\end{aligned}$$



### EXERCICE 3

On considère le triangle  $JKL$  ci-contre. Calculer une valeur approchée de  $KL$ .

.....  
 .....  
 .....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/trigonometrie/#correction-3>.

## 2. Calculer la mesure d'un angle

### À RETENIR


#### Méthode

Il est possible de calculer la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle si on connaît les longueurs de deux côtés. On trouve la mesure inconnue en utilisant le rapport trigonométrique qui fait intervenir l'angle inconnu et les deux longueurs connues.

### EXEMPLE

Le triangle  $MNO$  ci-contre est rectangle en  $M$ . Calculons une valeur approchée de  $\widehat{MNO}$ .

$$\begin{aligned}\tan(\widehat{MNO}) &= \frac{OM}{MN} \\ \tan(\widehat{MNO}) &= \frac{5}{12} \\ \widehat{MNO} &= \arctan\left(\frac{5}{12}\right) \approx 23^\circ\end{aligned}$$



### INFORMATION

#### Remarque


Les fonctions arccos, arcsin et arctan permettent d'inverser respectivement cos, sin et tan. Ainsi, si  $\alpha$  désigne la mesure d'un angle aigu :

$$\arccos(\cos(\alpha)) = \alpha \quad \arcsin(\sin(\alpha)) = \alpha \quad \arctan(\tan(\alpha)) = \alpha$$

### EXERCICE 4

On considère le triangle  $PQR$  ci-contre. Calculer une valeur approchée de  $\widehat{RPQ}$ .

.....  
 .....  
 .....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/trigonometrie/#correction-4>.