

OBJECTIFS

- Utiliser la racine carrée d'un nombre positif en lien avec des situations géométriques (théorème de Pythagore ; agrandissement, réduction et aires).
- Calculer une longueur d'un côté d'un triangle rectangle à partir de la connaissance des longueurs des deux autres côtés.
- Démontrer qu'un triangle est un triangle rectangle à partir de la connaissance des longueurs de ses côtés.
- Dans une configuration de Thalès, savoir calculer une longueur manquante en utilisant la proportionnalité.
- Démontrer le parallélisme de deux droites en s'appuyant sur des rapports de longueurs.

I Théorème de Pythagore


1. Calculer une longueur

À RETENIR

À RETENIR

EXEMPLE

Le triangle ABC ci-contre est rectangle en A . On applique le théorème de Pythagore.




$$\begin{aligned} BC^2 &= BA^2 + AC^2 \\ &= 1^2 + 2^2 \\ &= 1 + 4 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Donc $BC = \sqrt{5} \text{ cm} \approx 2,24 \text{ cm}$.

EXEMPLE

Le triangle IJK ci-contre est rectangle en K . On applique le théorème de Pythagore.




$$\begin{aligned} IJ^2 &= IK^2 + KJ^2 \\ 5^2 &= 3^2 + KJ^2 \\ 5^2 - 3^2 &= KJ^2 \\ 16 &= KJ^2 \end{aligned}$$

Donc $KJ = \sqrt{16} \text{ cm} = 4 \text{ cm}$.

EXERCICE 1

On considère le triangle JKL ci-contre. Calculer une valeur approchée de JL .

.....
.....
.....




2. Montrer que des droites sont perpendiculaires

À RETENIR

À RETENIR

EXEMPLE




D'une part :
 KI^2
 $= 14,2^2$
 $= 201,64$

D'autre part :
 $SI^2 + SK^2$
 $= 11,36^2 + 8,52^2$
 $= 201,64$

$KI^2 = SI^2 + SK^2$, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, SKI est rectangle.

EXEMPLE




D'une part :
 MN^2
 $= 2,4^2$
 $= 5,76$

D'autre part :
 $NO^2 + OM^2$
 $= 1,6^2 + 1,7^2$
 $= 5,45$

$MN^2 \neq NO^2 + OM^2$, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, MNO n'est pas rectangle.

EXERCICE 2

On considère le triangle DEF ci-dessous. Est-il rectangle ?



.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/pythagore-thales/#correction-2>.

II Théorème de Thalès

1. Calculer une longueur

À RETENIR ☞

À RETENIR ☞

EXEMPLE 💡

On considère le triangle ci-contre. Calculons les longueurs CN et CA .

On sait :


- C, M et A sont alignés.
- C, N et B sont alignés.
- $(MN) \parallel (AB)$.

On applique le théorème de Thalès.

$$\frac{CM}{CA} = \frac{CN}{CB} = \frac{MN}{AB} \Rightarrow \frac{4,8}{CA} = \frac{CN}{5} = \frac{3,2}{4}$$


Ainsi :

- $\frac{CN}{5} = \frac{3,2}{4}$, donc $CN = 5 \times \frac{3,2}{4} = 4$ cm.
- $\frac{4,8}{CA} = \frac{3,2}{4}$, c'est à dire $\frac{CA}{4,8} = \frac{4}{3,2}$, donc $CA = 4,8 \times \frac{4}{3,2} = 6$ cm.



EXERCICE 3 📄

On considère la figure ci-contre où $(AB) \parallel (DE)$. Calculer AC .



☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/troisieme/pythagore-thales/#correction-3>.

2. Montrer que des droites sont parallèles

À RETENIR ∞

À RETENIR ∞

EXEMPLE 💡


On se demande si (GH) et (FD) sont parallèles. On sait :

- E, G et F sont alignés dans le même ordre.
- E, H et D sont alignés dans le même ordre.

Or,

$$\frac{EG}{EF} = 0,6 \text{ et } \frac{EH}{ED} = 0,6$$

D'après la réciproque du théorème de Thalès, (GH) et (FD) sont parallèles.



$EG = 0,6 \text{ cm}$ $EF = 1 \text{ cm}$ $EH = 0,9 \text{ cm}$ $ED = 1,5 \text{ cm}$

EXEMPLE 💡


On se demande si (AB) et (OI) sont parallèles. On sait :

- A, L et I sont alignés dans le même ordre.
- B, L et O sont alignés dans le même ordre.

Or,

$$\frac{LA}{LI} = 0,4 \text{ et } \frac{LB}{LO} = 0,5$$


D'après la réciproque du théorème de Thalès, (GH) et (FD) ne sont pas parallèles.



$LA = 0,48 \text{ cm}$ $LI = 1,2 \text{ cm}$ $LB = 0,85 \text{ cm}$ $LO = 1,7 \text{ cm}$

EXERCICE 4 📄

On considère la figure ci-contre. Les droites (BM) et (PC) sont-elles parallèles?



$BC = 15 \text{ cm}$ $AB = 7 \text{ cm}$ $AC = 8 \text{ cm}$ $AM = 4 \text{ cm}$ $AP = 6 \text{ cm}$

.....