



EXERCICE 1

Calculer les produits suivants.

1. $(-5) \times (-3)$
2. $(-6) \times 4$
3. $8 \times (-7)$
4. $(-9) \times (-2)$
5. $(-1) \times 12$
6. $(-2,5) \times 4$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Calculer les quotients suivants.

1. $(-18) \div 6$
2. $20 \div (-5)$
3. $(-30) \div (-6)$
4. $\frac{-45}{9}$
5. $\frac{36}{-4}$
6. $\frac{-7}{-1}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Relier chaque calcul à son résultat.

- | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----|
| $(-4) \times (-5)$ | • | • | -14 |
| $(-36) \div 3$ | • | • | 8 |
| $(-2) \times 3 \times (-1)$ | • | • | 20 |
| $(-48) \div (-6)$ | • | • | 6 |
| $7 \times (-2)$ | • | • | -12 |

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Compléter les égalités suivantes.

1. $(-3) \times \dots = 12$
2. $\dots \times (-5) = -35$
3. $(-42) \div \dots = 7$
4. $\dots \div (-4) = -3$

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Sans effectuer les calculs, entourer le signe de chaque expression.

$(-3) \times (-7) \times (-2)$	+	-
$(-5) \times 4 \times (-1) \times (-2)$	+	-
$\frac{(-8) \times 3}{-6}$	+	-
$(-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1)$	+	-

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Un sous-marin part de la surface, où sa profondeur vaut 0 m, et descend régulièrement de 4,5 m par minute.

1. À quelle profondeur se trouve-t-il au bout de 6 minutes?
2. Combien de temps lui faut-il pour atteindre la profondeur -90 m?
3. Il remonte ensuite de 12,5 m par minute pendant 4 minutes. Quelle est alors sa profondeur?

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Calculer les expressions suivantes en respectant les priorités opératoires.

1. $-3 \times (-4) + 5 \times (-2)$
2. $(-2) \times (7 - 10)$
3. $\frac{-24}{-3} - 5 \times 2$
4. $-5 \times (-2) \times (-1) + 10$
5. $\frac{15 - 3 \times 9}{-4}$
6. $(-6) \div 3 \times (-2)$

●●● Approfondissement

EXERCICE 8


Voici les températures relevées à 8 h pendant cinq jours : -3 °C, 2 °C, -5 °C, -1 °C et 2 °C.

1. De combien la température a-t-elle varié entre le premier et le troisième jour?
2. Calculer la température moyenne sur ces cinq jours.
3. Quelle température faudrait-il relever le sixième jour pour que la moyenne sur les six jours soit égale à -1 °C?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Dans la pyramide ci-dessous, chaque case est le produit des deux cases situées juste en dessous d'elle. La compléter.



Sur fiche

Sur fiche

★ Pour le plaisir