

OBJECTIFS

- Reconnaître les ensembles usuels vus par le passé ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$).
- Découvrir les nombres irrationnels et apprivoiser l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels, avec sa représentation sous forme de droite numérique.
- Connaître les différents intervalles de $\mathbb{R}$ avec les notations $-\infty$ et $+\infty$.
- Savoir utiliser la valeur absolue et sa caractérisation en tant que distance.
- Représenter l'intervalle $[a - r; a + r]$ et utiliser sa caractérisation par la condition $|x - a| \leq r$.

I Ensembles usuels

1. Ensembles déjà connus

1

À RETENIR

EXERCICE 1

On souhaite démontrer que $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal. Nous allons procéder *par l'absurde*.

1. Supposons que $\frac{1}{3}$ est un nombre décimal. Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$ tels que $10^n = 3a$

.....

2. Est-ce que 10^n peut être un multiple de 3? Justifier.

.....

3. Conclure.

.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/ensembles-de-nombres/#correction-1>.



2. Nombres réels

2

À RETENIR




EXEMPLE

Les ensembles vus depuis le début sont inclus les uns dans les autres :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

On a, par exemple :

- $5 \in \mathbb{N}$, donc $5 \in \mathbb{Z}$.
- $5,2 = \frac{52}{10}$, donc $5,2 \in \mathbb{D}$ et ainsi $5,2 \in \mathbb{Q}$.
- $-14 \notin \mathbb{N}$, mais $-14 \in \mathbb{Z}$.
- $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$, mais $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$.
- π est irrationnel : $\pi \notin \mathbb{Q}$.
- $0 \in \mathbb{N}$, donc $0 \in \mathbb{Z}$, $0 \in \mathbb{D}$, $0 \in \mathbb{Q}$ et $0 \in \mathbb{R}$.



EXERCICE 2

Compléter le tableau suivant avec $\in$ ou $\notin$.

Nombre	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
3					
$\frac{18}{3}$					
2×10^{-2}					
$-\frac{9}{11}$					
$\frac{\pi^2}{6}$					
$\sqrt{1,44}$					
$-\sqrt{64}$					

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/ensembles-de-nombres/#correction-2>.

1. Définition

3

À RETENIR

Définitions

L'ensemble des nombres réels compris entre a et b (inclus) est appelé **intervalle** et se note $[a; b]$. a et b sont les **bornes** de l'intervalle. On peut définir d'autres types d'intervalle.

Intervalle	Signification	Représentation

Quand le crochet est **fermé** (orienté vers la borne), la borne est incluse; quand il est **ouvert** (non orienté vers la borne), la borne est exclue. À noter que le crochet est toujours ouvert en $-\infty$ et $+\infty$. On note généralement $\mathbb{R}^+ = [0, +\infty[$ et $\mathbb{R}^- =]-\infty; 0]$.

EXERCICE 3

1. Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels x tels que $-3 \leq x < 4$. Puis, le représenter sur une droite graduée.
2. Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres strictement supérieurs à $\frac{1}{5}$. Puis, le représenter sur une droite graduée.

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/ensembles-de-nombres/#correction-3>.



2. Union, intersection

4

À RETENIR

EXEMPLE

Par exemple, $\mathbb{R} = \mathbb{R}^- \cup \mathbb{R}^+$.

EXERCICE 4

Écrire les intersections et les réunions suivantes sous la forme d'un seul intervalle.

1. $[-4; 5] \cup [0; 10] = \dots\dots\dots$ 3. $[0; 4[\cap [4; +\infty[= \dots\dots\dots$ 5. $[1; 2] \cup [2; 3] \cup [2; 4] = \dots\dots\dots$
2. $]0; 5] \cap [-2; 3] = \dots\dots\dots$ 4. $[-10; 5] \cup [4; 12] = \dots\dots\dots$ 6. $\mathbb{R}^- \cap \mathbb{R}^+ = \dots\dots\dots$

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/ensembles-de-nombres/#correction-4>.

III Inégalités et inéquations

1. Manipulation d'inégalités

5

À RETENIR

EXEMPLE

$$3x + 8 < 7 \iff 3x < -1$$

L'ordre ne change pas car on soustrait 8.

EXEMPLE

$$2x > 8 \iff x > 4$$

L'ordre ne change pas car on divise par 2.

EXEMPLE

$$-3x < 18 \iff x > -6$$

L'ordre change car on divise par -3 .

EXERCICE 5

Compléter par le symbole « $<$ », « $\leq$ », « $>$ » ou « $\geq$ ».

1. $x + 2 > 0 \iff x \dots\dots -2$. 3. $y \geq 4 \iff y - 4 \dots\dots 0$.
2. $a < 10 \iff -6a \dots\dots -60$. 4. $3c \leq 4 \iff -12c \dots\dots -16$.

👉 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/ensembles-de-nombres/#correction-5>.

2. Résolution d'inéquations

6

À RETENIR

EXERCICE 6

Parmi les inéquations suivantes, lesquelles acceptent le nombre 9 comme solution ?

1. $-3x + 2 \geq 0$: 3. $2x < 1$:
2. $5(x - 9) > 0$: 4. $\frac{x+1}{4} \geq (-3) \times \frac{x-2}{3}$:


• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/ensembles-de-nombres/#correction-6>.

7

À RETENIR

EXEMPLE

$$\begin{aligned} 2x + 4 &\geq 8 \\ \Leftrightarrow 2x &\geq 4 \\ \Leftrightarrow x &\geq 2 \end{aligned}$$



L'ensemble solution est $\mathcal{S} = [2; +\infty[$.

8

À RETENIR

EXEMPLE

Dans l'inéquation précédente, le crochet enferme la valeur 2 car dans l'énoncé, le symbole « $\geq$ » est utilisé.

EXERCICE 7

Résoudre l'inéquation $-x + 1 < 2x + 10$.

• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/ensembles-de-nombres/#correction-7>.

3. Valeur absolue

9

À RETENIR

EXERCICE 8



Déterminer les valeurs absolues suivantes.

1. $|-8| = \dots\dots\dots$
2. $|5| = \dots\dots\dots$
3. $|1 - 3| = \dots\dots\dots$
4. $|3 - 1| = \dots\dots\dots$

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/ensembles-de-nombres/#correction-8>.

10

À RETENIR



EXERCICE 9

1. Déterminer sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels x tels que $|x - 4| \leq 3$.

.....
2. On considère l'intervalle $I = [8; 20]$. Écrire une inégalité sous la forme $|x - c| \leq r$ (où c et r sont deux nombres réels à déterminer) vérifiée par tous les nombres appartenant à I .

.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/ensembles-de-nombres/#correction-9>.