

OBJECTIFS

- Déterminer une équation de droite à partir de deux points, un point et un vecteur directeur ou un point et la pente.
- Déterminer la pente ou un vecteur directeur d'une droite donnée par une équation ou une représentation graphique.
- Tracer une droite connaissant son équation cartésienne ou réduite.
- Déterminer si deux droites sont parallèles ou sécantes.
- Résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues, déterminer le point d'intersection de deux droites sécantes.

I Équations d'une droite

1. Vecteur directeur

1

À RETENIR


EXERCICE 1

On se place dans le repère cartésien ci-contre. Pour chaque droite, donner les coordonnées d'un vecteur directeur.

1. (d_1) :

2. (d_2) :

3. (d_3) :



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/droites/#correction-1>.

2. Équation cartésienne

2

À RETENIR

EXEMPLE

Un vecteur directeur de la droite (d_1) de l'exercice précédent est $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Son équation cartésienne est donc de la forme $x - y + c = 0$. Or, le point $A(0; 1)$ appartient à cette droite, donc $0 - 1 + c = 0 \iff c = 1$. Une équation cartésienne de (d_1) est donc $x + y + 1 = 0$.

EXERCICE 2

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(-1; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

.....


2. Le point $B(0; 6)$ appartient-il à cette droite?

.....

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/droites/#correction-2>.

3. Équation réduite

3


À RETENIR**EXERCICE 3**

On considère la droite (d) d'équation réduite $y = -\frac{2}{3}x + 2$.

1. Donner les coordonnées d'un vecteur directeur de (d)

.....

2. Représenter (d) dans le repère ci-contre.




☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/droites/#correction-3>.

INFORMATION

Remarque

Il y a un lien fort entre ce concept et celui des fonctions affines : la représentation graphique d'une fonction affine $x \mapsto mx + p$ est la droite d'équation réduite $y = mx + p$. Réciproquement, toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées est la représentation graphique d'une fonction affine.

On a représenté une droite (d) ci-contre. Déterminer son équation réduite.



✎ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/droites/#correction-4>.

II Intersection de deux droites

1. Parallélisme

Propriété

Soient (d_1) et (d_2) deux droites. On note :

- $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ une équation cartésienne et $m_1x + p_1 = 0$ l'équation réduite de (d_1) .
- $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ une équation cartésienne et $m_2x + p_2 = 0$ l'équation réduite de (d_2) .

On a les relations suivantes.

Position des droites	Vecteurs directeurs	Équations cartésiennes	Équations réduites
Parallèles	Colinéaires	$a_1 = k \times a_2$ et $b_1 = k \times b_2$	$m_1 = m_2$
Confondues	Colinéaires et de même origine	$a_1 = k \times a_2$, $b_1 = k \times b_2$ et $c_1 = k \times c_2$	$m_1 = m_2$ et $p_1 = p_2$
Sécantes	Non colinéaires	Pas de proportionnalité	$m_1 \neq m_2$

.....

.....

.....

2. Coordonnées du point d'intersection

9

Vérifier que $(-3; 5)$ est solution du système

.....

.....

.....

10

9

EXERCICE 7

Que peut-on dire des droites (d_1) et (d_2) d'équations cartésiennes respectives $2x + 3y - 9 = 0$ et $-x + 2y - 13 = 0$?

.....
.....
.....

 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/droites/#correction-7>.

8**À RETENIR** **EXERCICE 8**

Résoudre le système $\begin{cases} 4x - 3y + 1 = 0 \\ -2x + y + 3 = 0 \end{cases}$ par substitution.

 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/droites/#correction-8>.

9**À RETENIR**

Résoudre le système $\begin{cases} 3x - 2y + 1 = 0 \\ -2x + 4y = 3 \end{cases}$ par combinaison.

 Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/seconde/droites/#correction-9>.