


# Chapter 4.1: 课后作业



1. 对于边长为 $a$ 的二维正方晶格，证明：  
自由电子在第一布里渊区边界（如右图所示）C点处的动能是A点处动能的2倍。



2. 对于一维近自由电子模型， $k = \pm \frac{2\pi}{a}$  状态简并微扰的能量为 $E_+$ 和 $E_-$ ，  
求出对应的波函数 $\psi_+$ 和 $\psi_-$ ，并说明它们都代表驻波。（假设 $V_n = V_n^*$ ）


提交时间： 4月10日之前

提交方式： 手写（写明姓名学号）后拍照，通过本班课代表统一提交电子版

# Chapter 4.1: 课后作业-答案



1. 对于边长为 $a$ 的二维正方晶格，证明：  
自由电子在第一布里渊区边界（如右图所示）C点处的  
动能是A点处动能的2倍。



$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\hbar^2 (k_x^2 + k_y^2)}{2m}$$

$$A\left(\frac{\pi}{a}, 0\right) \longrightarrow E(A) = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2}$$


$$C\left(\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right) \longrightarrow E(C) = \frac{\hbar^2 \pi^2}{ma^2}$$

$$\longrightarrow E(C) = 2E(A)$$

## Chapter 4.1: 课后作业-答案



2. 对于一维近自由电子模型,  $k = \pm \frac{2\pi}{a}$  状态简并微扰的能量为  $E_+$  和  $E_-$ , 求出对应的波函数  $\psi_+$  和  $\psi_-$ , 并说明它们都代表驻波。(假设  $V_n = V_n^*$ )



## Chapter 4.1: 课后作业-答案



2. 对于一维近自由电子模型,  $k = \pm \frac{2\pi}{a}$  状态简并微扰的能量为  $E_+$  和  $E_-$ , 求出对应的波函数  $\psi_+$  和  $\psi_-$ , 并说明它们都代表驻波。(假设  $V_n = V_n^*$ )

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 |\varphi_k\rangle &= \varepsilon_k |\varphi_k\rangle & \hat{H}_0 |\varphi_{k'}\rangle &= \varepsilon_{k'} |\varphi_{k'}\rangle \\ |\psi\rangle &= \alpha |\varphi_k\rangle + \beta |\varphi_{k'}\rangle \\ |\varphi_k\rangle &= \frac{1}{\sqrt{Na}} e^{i\frac{2\pi}{a}x} & |\varphi_{k'}\rangle &= \frac{1}{\sqrt{Na}} e^{-i\frac{2\pi}{a}x} \end{aligned}$$

$$\text{把 } |\psi\rangle \text{ 带入 } (\hat{H}_0 + \hat{H}')|\psi\rangle = E|\psi\rangle: \longrightarrow \begin{cases} (\varepsilon_k - E)\alpha + V_2^* \beta = 0 & (1) \\ V_2 \alpha + (\varepsilon_{k'} - E)\beta = 0 & (2) \end{cases} \quad \begin{aligned} V_2 &= \langle \varphi_{k'} | \hat{H}' | \varphi_k \rangle \\ V_2^* &= \langle \varphi_k | \hat{H}' | \varphi_{k'} \rangle \end{aligned}$$

$$\longrightarrow \begin{vmatrix} \varepsilon_k - E & V_2^* \\ V_2 & \varepsilon_{k'} - E \end{vmatrix} = 0 \longrightarrow \begin{cases} E_+ = \varepsilon_k + |V_2| \\ E_- = \varepsilon_k - |V_2| \end{cases}$$

## Chapter 4.1: 课后作业-答案



把  $E_+ = \varepsilon_k + |V_2|$  带回(1)(2)可得:

$$\begin{cases} -|V_2|\alpha + V_2^*\beta = 0 & (3) \\ V_2\alpha - |V_2|\beta = 0 & (4) \end{cases}$$

由  $\alpha(4) - \beta(3)$  可得  $V_2\alpha^2 - V_2^*\beta^2 = 0$

由  $V_2 = V_2^*$  可得

利用

可得

$$\left. \begin{aligned} \alpha^2 - \beta^2 &= 0 \\ \alpha^2 + \beta^2 &= 1 \end{aligned} \right\}$$

$$\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{或} \quad \alpha = -\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

分别代入(3)和(4)验证可得: 如果  $V_2$  为实数, 则取值  $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

如果  $V_2$  为虚数, 则取值  $\alpha = -\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$  (应舍掉)

## Chapter 4.1: 课后作业-答案



把  $E_- = \varepsilon_k - |V_2|$  带回(1)(2)可得:

$$\begin{cases} |V_2|\alpha + V_2^*\beta = 0 & (5) \\ V_2\alpha + |V_2|\beta = 0 & (6) \end{cases}$$

由  $\alpha(6) - \beta(5)$  可得  $V_2\alpha^2 - V_2^*\beta^2 = 0$

由  $V_2 = V_2^*$  可得

$$\left. \begin{aligned} \alpha^2 - \beta^2 &= 0 \\ \alpha^2 + \beta^2 &= 1 \end{aligned} \right\}$$

利用

可得  $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$  或  $\alpha = -\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

分别代入(5)和(6)验证可得: 如果  $V_2$  为实数, 则取值  $\alpha = -\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$

如果  $V_2$  为虚数, 则取值  $\alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt{2}}$  (应舍掉)

## Chapter 4.1: 课后作业-答案



$$\rightarrow \begin{cases} |\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\varphi_k\rangle + |\varphi_{k'}\rangle) = \frac{2}{\sqrt{2Na}} \cos\left(\frac{2\pi}{a}x\right) \\ |\psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\varphi_k\rangle - |\varphi_{k'}\rangle) = \frac{2i}{\sqrt{2Na}} \sin\left(\frac{2\pi}{a}x\right) \end{cases}$$



考虑一维单原子链（原子间距为 $a$ , 链长为 $Na$ ）, 对于原子的 $s$ 能级, 利用紧束缚模型, 求:

1. 原子链能带的色散关系 $E(k)$ ;
2. 能带的态密度 $g(E)$ ;
3. 能带的宽度.

提交时间: 4月10日之前


提交方式: 手写（写明姓名学号）后拍照, 通过本班课代表统一提交电子版



## Chapter 4.2: 课后作业-答案



$$1. \quad E_k = \varepsilon - J_0 - \sum_{j=\text{nbs}} J_1(\vec{a}_j) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{a}_j} = \varepsilon - J_0 - J_1(e^{-ika} + e^{ika}) = \varepsilon - J_0 - 2J_1 \cos(ka)$$




## Chapter 4.2: 课后作业-答案



2. 波矢密度:  $\frac{dn}{dk} = \frac{Na}{2\pi}$        $\frac{dE}{dk} = 2aJ_1 \sin(ka)$

→ (不计自旋)  $g(E) = \frac{dn}{dE} = 2 \times \frac{dn}{dk} \frac{dk}{dE} = 2 \times \frac{dn}{dk} \left( \frac{dE}{dk} \right)^{-1} = \frac{N}{2\pi J_1 \sin(ka)} = \frac{N}{\pi \sqrt{4J_1^2 - (E_k - \varepsilon + J_0)^2}}$

3. 带宽:  $E_{\pi/a} - E_0 = 4J_1$



考虑原胞数为 $N$ 的一维晶格, 电子能带为

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left[ \frac{7}{8} - \cos(ka) + \frac{1}{8} \cos(2ka) \right]$$

求:

1. 能带宽度;
2. 电子在波矢 $k$ 状态时的速度;
3. 电子在带底和带顶时的有效质量。

提交时间: 4月10日之前

提交方式: 手写 (写明姓名学号) 后拍照, 通过本班课代表统一提交电子版

## Chapter 4.4: 课后作业-答案



1. 先求能量极值点位置:  $\frac{dE}{dk} = 0 \longrightarrow \sin(ka) = 0 \longrightarrow k = 0, \frac{\pi}{a} \text{ (或 } -\frac{\pi}{a} \text{)}$

带宽:  $E_{\pi/a} - E_0 = \frac{2\hbar^2}{ma^2}$

2.  $v_k = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} = \frac{\hbar}{ma} \left[ \sin(ka) - \frac{1}{4} \sin(2ka) \right]$

3.  $m^* = \hbar^2 \left( \frac{d^2E}{dk^2} \right)^{-1} \longrightarrow$

带顶( $k = \frac{\pi}{a}$ ):  $m^* = -\frac{2}{3}m$

带底( $k = 0$ ):  $m^* = 2m$