МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЛОДЭ | 111 www.lode.by | МИНСК БРЕСТ ГРОДНО ВИТЕБСК | ГАРАНТИЯ ЛОДЭ КАЧЕСТВА

SIEMENS MAGNETOM SOLA 1,5 Тесла

г.Минск, пр-т Независимости, 58А

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ф.И.О.: **Кунцов Святослав Юрьевич**
Пол: м.
Дата рождения: **28-05-2005г.**
Дата проведения исследования: 22-04-2026г.
ID: 3584-26.

На основании частей второй и третьей статьи 44 Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 N 2435-XII "О здравоохранении" пациент устно проинформирован о необходимости проведения простых медицинских вмешательств и от пациента получено устное информированное добровольное согласие на проведение простых медицинских вмешательств.

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: **поясничный отдел позвоночника, мягкие ткани, миелография, объемная (3D) МР-визуализация .**
МЕТОДИКА СКАНИРОВАНИЯ: T2sag, T1sag, T2 fs sag, T2tra, T2cor, T2myelo, T2 fs cor.

КОНТРАСТИРОВАНИЕ: нет.
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ: нет.

Дата проведения исследования: 22.04.2026 ID № 3584-26

Дата описания исследования: 23.04.2026

При МРТ исследовании **поясничного отдела** позвоночника костно-деструктивных изменений не определяется. Поясничный лордоз в горизонтальном положении сглажен. Ось позвоночника в положении лежа в корональной плоскости отклонена вправо. Признаков аномалий развития не выявлено.

Срединный сагиттальный размер позвоночного канала (ПК) на уровне тел позвонков не уменьшен (от 17 мм). Тела позвонков имеют обычное взаиморасположение.

Высота и форма тел позвонков сохранены.

Определяется субхондральный склероз, замыкательные пластинки тел позвонков неровные, с узелками Шморля, с минимальными краевыми остеофитами. МР-признаки начального спондилоартроза.

Костный мозг, находящийся в телах позвонков, имеет обычную интенсивность сигнала.

Снижена интенсивность МР-сигнала от дисков на Т2-ВИ за счет дегидратации.

Сегмент **Th 11-Th 12**: высота диска незначительно снижена, медианная протрузия диска, выступающая в ПК до 3,8 мм, с незначительной компрессией переднего ликворного пространства, незначительная деформация суставных фасеток дугоотростчатых сочленений, незначительное сужение МПО, латеральные карманы не сужены, без уменьшения размеров позвоночного канала, ход корешков конского хвоста не изменен.

Сегмент **L 3- L 4** высота диска незначительно снижена, симметричное выпячивание диска, выступающая в ПК до 3,7 мм, с незначительной компрессией переднего ликворного пространства, незначительная деформация суставных фасеток дугоотростчатых сочленений,

незначительное сужение МПО, латеральные карманы не сужены, без уменьшения размеров позвоночного канала, ход корешков конского хвоста не изменен.

Сегмент **L4-L5** высота диска незначительно снижена, медианная протрузия диска, выступающая в ПК до 3,8 мм, с незначительной компрессией переднего ликворного пространства, незначительная деформация суставных фасеток дугоотростчатых сочленений, незначительное сужение МПО, латеральные карманы не сужены, без уменьшения размеров позвоночного канала, ход корешков конского хвоста не изменен.

Конус спинного мозга расположен на обычном уровне, с четкими контурами, без очагов патологической интенсивности сигнала в конусе спинного мозга и в области конского хвоста.

При **МР-миелографии** признаков нарушения ликвородинамики не выявлено.

Паравертебральные мягкие ткани не изменены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

МР-признаки начальных дегенеративных изменений поясничного отдела позвоночника. Медианные протрузии дисков Th 11-Th 12, L 4-L 5. Выпячивание диска L 3-L 4.

Рекомендации: консультация невролога.

МРТ-заключение не является окончательным диагнозом и подлежит интерпретации специалистом с учетом анамнеза, клинических данных и других методов исследования)
Данный документ без печати и подписи уполномоченного лица не имеет юридической силы и предоставляется для ознакомительных целей.
Выдана запись МРТ исследования: компакт-диск (с паспортными данными).

22-04-2026г. _____ Врач лучевой диагностики: Цховребова Л. А., 1 категория