

# 概率论

## 第 1 章 事件的概率

- 组合公式
- 事件的运算

## 第 2 章 随机变量及概率分布

- 2.1 一维随机变量
  - 2.1.1 离散型随机变量
    - 1 二项分布
    - 2 泊松分布
    - 3 超几何分布
    - 4 负二项分布
    - 5 几何分布
    - 5' 几何分布
  - 2.1.2 连续型随机变量
    - 1 正态分布
    - 2 指数分布
    - 3 威布尔分布
    - 4 均匀分布
    - 5 对数正态分布
    - 6 柯西分布
    - 7 拉普拉斯分布
- 2.2 多维随机变量
  - 2.2.1 离散性随机向量
    - 1 多项分布
  - 2.2.2 连续型随机向量
    - 1 矩形均匀分布
    - 2 二维正态分布
    - 3 多元正态分布
  - 2.2.3 边缘分布
    - 1 概念解释
    - 2 多项分布
    - 3 二维正态分布
- 2.3 条件概率分布与随机变量的独立性
  - 2.3.1 条件概率分布的概念
  - 2.3.2 离散性随机变量的条件概率分布
  - 2.3.3 连续性随机变量的条件概率分布
  - 2.3.4 随机变量的独立性
- 2.4 随机变量的函数的概率分布
  - 2.4.1 离散性分布
  - 2.4.2 连续型分布
    - 1 单变量函数
      - 1.1 严格单调
      - 1.2 幂函数
    - 2 多变量函数
  - 2.4.3 随机变量和的密度函数
  - 2.4.4 随机变量商的密度函数
  - 2.4.5 多个随机变量的最值

注意事项

## 第 3 章 随机变量的数字特征

- 3.1 数学期望与中位数
  - 3.1.1 数学期望的定义
  - 3.1.2 数学期望的性质
  - 3.1.3 条件数学期望 (条件均值)
  - 3.1.4 中位数
- 3.2 方差与矩
  - 3.2.1 方差和标准差
  - 3.2.2 原点矩与中心矩
  - 3.2.3 基于矩的系数
- 3.3 协方差与相关系数
  - 3.3.1 协方差

- 3.3.2 相关系数
- 3.4 大数定理和中心极限定理
  - 3.4.1 大数定理
  - 3.4.2 中心极限定理
- 3.5 母函数
  - 3.5.1 母函数的定义
  - 3.5.2 常见分布的母函数
  - 3.5.3 母函数的性质
  - 3.5.4 母函数的定理
- 3.6 特征函数
  - 3.6.1 特征函数的定义
  - 3.6.2 常见分布的特征函数
  - 3.6.3 特征函数的性质
- 3.7 矩量母函数
  - 3.7.1 相关定义
  - 3.7.2 常见分布的矩量母函数
  - 3.7.3 矩量母函数的性质
- 例题

# 第 1 章 事件的概率

## 组合公式

由  $(a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^i b^{n-i}$  知

$$\begin{aligned}\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} &= 2^n \\ \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \cdots + (-1)^{-1} \binom{n}{n} &= 0\end{aligned}$$

由  $(1+x)^{m+n} = (1+x)^m (1+x)^n$  知

$$\binom{m+n}{k} = \sum_{i=0}^k \binom{m}{i} \binom{n}{k-i}$$

特别地, 当  $m = k = n$  时,

$$\binom{2n}{n} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}^2$$

第一式还可以写作下式, 并可以从直观上理解.

$$\sum_{k_1+k_2=k} \binom{n_1}{k_1} \binom{n_2}{k_2} = \binom{n_1+n_2}{k_1+k_2}$$

此外还有下式, 也可以从直观上理解.

$$\sum_{n_1+n_2=n} \binom{n_1}{k_1} \binom{n_2}{k_2} = \binom{n_1+n_2+1}{k_1+k_2+1}$$

多项式系数:  $\frac{n!}{r_1! \cdots r_k!}$ .

利用第一式 (杨辉恒等式) 数归得第二式 (或直观理解)

$$\begin{aligned}\binom{n+m}{m} + \binom{n+m}{m+1} &= \binom{n+m+1}{m+1} \\ \sum_{r=0}^m \binom{n-1+r}{r} &= \binom{n+m}{m}\end{aligned}$$

由负指数二项展开式  $(1-x)^{-r} = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{-r}{i} (-x)^i = \sum_{i=0}^{\infty} \binom{i+r-1}{r-1} x^i$  知

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{\infty} \binom{i+r-1}{r-1} &= 0 \\ \sum_{i=0}^{\infty} \binom{i+r-1}{r-1} (-1)^i &= 2^{-r} \\ p^{-r} &= \sum_{i=0}^{\infty} \binom{i+r-1}{r-1} p^r (1-p)^i\end{aligned}$$

原式两边求导, 并令  $x = 1-p$ , 得

$$rp^{-r-1} = \sum_{i=0}^{\infty} i \binom{i+r-1}{r-1} (1-p)^{i-1}$$

# 事件的运算

- 记号
  - $A + B \equiv A \cup B$ .
  - $AB \equiv A \cap B$ .
  - $A - B \equiv \overline{AB}$ .
- 加法
  - 交换律:  $A + B = B + A$ .
  - 结合律:  $(A + B) + C = A + (B + C)$ .  
于是可定义  $A + B + C = (A + B) + C$ .
  - 自加:  $A + A = A$ .
- 乘法
  - 交换律:  $AB = BA$ .
  - 结合律:  $(AB)C = A(BC)$ .  
于是可定义  $ABC := (AB)C$ .
  - 自乘:  $AA = A$ .
- 分配律
  - 加法与乘法:  $(A + B)C = AC + BC$ .
  - 减法与乘法:  $(A - B)C = AC - BC$ .  
本质为  $ABC = (AC)(BC)$ , 这个式子在推导中是有用的.
  - 乘法与加法:  $(AB) + C = (A + C)(B + C)$ .
  - 乘法与减法:  $(AB) - C = (A - C)(B - C)$ .
- 减法
  - $A - B = \overline{AB} \neq A + (-B)$ .
  - $A \subseteq B \Leftrightarrow A - B = \emptyset$ .
  - $A = B \Leftrightarrow A - B = B - A = \emptyset$ .
- 无消去律
  - $A + B = A + C \nRightarrow B = C$ .
  - $A - B = A - C \nRightarrow B = C$ .
  - 注:  $A + AB = A$ .
- 混合运算
  - $(A + B) - C \neq A + (B - C)$ . (因为减法本质上是乘法)  
因此  $A + B - C$  没有意义, 除非定义运算顺序或优先级.
  - $A - (B + C) = A - B - C = (A - C) - (B - C)$ .
  - $A - (B - C) = (A - B)C = AC - BC$ .
- 负号 (补集)
  - $-(A + B) = (-A)(-B)$ .
  - $-(A - B) = B - A = (-A)B$ .
  - $-(AB) = (-A) + (-B)$ .  
理论上可以这么写, 实际上用  $\overline{A}$  的符号会更方便.
- 互斥
  - $A$  与  $B$  互斥  $\Leftrightarrow AB = \emptyset \Leftrightarrow P(AB) = 0$ .
  - $AC = BC \Leftrightarrow A - B$  与  $B - A$  均与  $C$  互斥  $\Leftrightarrow P(\overline{ABC}) = P(A\overline{BC}) = 0$ .  
当且仅当  $C = \Omega$  时, 可由此推出  $A = B$ .
  - $A$  与  $B$  互斥  $\Rightarrow AC$  与  $BC$  互斥  $\Rightarrow P(C(A + B)) = P(AC) + P(BC)$ .
- 对立
  - $A$  与  $B$  对立  $\Leftrightarrow AB = \emptyset$  且  $A + B = \Omega$ .
  - $\overline{A_1 A_2 \cdots A_n} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \cdots + \overline{A_n}$ .

- $\overline{A_1 + A_2 + \cdots + A_n} = \overline{A_1} \overline{A_2} \cdots \overline{A_n}$ .
- 条件概率
  - 定义:  $P(A | B) = P(AB)/P(B)$ .
  - 全概率公式: 若两两互斥的  $B_i$  之交为必然事件, 则  $P(A) = P(B_1)P(A | B_1) + P(B_2)P(A | B_2) + \cdots$ .
  - 贝叶斯公式:
    - $P(B | A) = \frac{P(B)P(A | B)}{P(A)}$ .
    - $P(B_i | A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A | B_i)}{\sum P(B_j)P(A | B_j)}$ .
- 几率
  - 定义:  $O(A) = \frac{P(A)}{1 - P(A)} = \frac{P(A)}{P(\overline{A})}$ .
  - 贝叶斯公式:  $O(B | A) = \frac{P(B | A)}{P(\overline{B} | A)} = \frac{P(B)P(A | B)}{P(A)P(\overline{B} | A)} = \frac{P(B)P(A | B)}{P(\overline{B})P(A | \overline{B})} = O(B) \frac{P(A | B)}{P(A | \overline{B})}$ .
  - 贝叶斯因子:  $BF = \frac{P(A | B)}{P(A | \overline{B})}$ , 故  $O(B | A) = BF \cdot O(B)$ .
- 促进作用的性质
  - 具有对称性:  $A$  促进  $B$ , 则  $B$  促进  $A$ , 即
 
$$P(A | B) > P(A) \Leftrightarrow P(B | A) > P(B).$$
  - 不具有传递性:  $B$  促进  $A$  且  $C$  促进  $B$  不能推出  $C$  促进  $A$ , 即
 
$$P(A | B) > P(A), P(B | C) > P(B) \not\Rightarrow P(A | C) > P(A).$$
  - 若  $B$  和  $C$  都促进  $A$ , 则  $B + C$  一定促进  $A$ , 但  $BC$  和  $B - C$  不一定促进  $A$ , 即
 
$$P(A | B) > P(A), P(A | C) > P(A) \Leftrightarrow P(A | B + C) > P(A).$$
  - 若  $B$  促进  $A$ , 则  $\overline{B}$  抑制  $A$ ,  $B$  抑制  $\overline{A}$ ,  $\overline{B}$  促进  $\overline{A}$ , 即
 
$$P(A | B) > P(A) \Leftrightarrow P(A | \overline{B}) < P(A) \Leftrightarrow P(\overline{A} | B) < P(\overline{A}) \Leftrightarrow P(\overline{A} | \overline{B}) > P(\overline{A}).$$

$$P(A | B) = P(A) \Leftrightarrow P(A | \overline{B}) = P(A) \Leftrightarrow P(\overline{A} | B) = P(\overline{A}) \Leftrightarrow P(\overline{A} | \overline{B}) = P(\overline{A}).$$
- 独立
  - $A$  与  $B$  独立  $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B) \Rightarrow P(A | B) = P(A)$ .
  - 两两独立:  $\forall i, j (1 \leq i, j \leq n, i \neq j) : P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j)$ .
  - 相互独立:  $\forall 1 \leq k \leq n, 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n : P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$ .
  - 相互独立  $\Rightarrow$  两两独立, 反之不一定成立.
  - 独立事件的任一部分也独立.
  - 若  $A_1, A_2, \cdots, A_n$  独立,  $B_i = A_i$  或  $\overline{A_i}$ , 则  $B_1, B_2, \cdots, B_n$  也独立.
- 独立事件的概率
  - 乘法:  $P(\prod E_i) = \prod P(E_i)$ .
  - 加法:  $P(\sum E_i) = 1 - P(\prod \overline{E_i}) = 1 - \prod P(\overline{E_i})$ .
  - 实例:
 
$$P(E_0 + E_1 E_2) = 1 - P(\overline{E_0} \overline{E_1} \overline{E_2}) = 1 - (1 - P(E_0))(1 - P(E_0 E_1))$$

$$= P(E_0) + P(E_1)P(E_2) - P(E_0)P(E_1)P(E_2).$$
- 运算定理
  - 加法定理 (并集):  $P(A + B) = P(A) + P(B) \Leftrightarrow AB = \emptyset \Leftrightarrow P(AB) = 0$ .
  - 减法定理 (差集):  $P(A - B) = P(A) - P(B) \Leftrightarrow A \supseteq B \Leftrightarrow P(B - A) = 0$ .
  - 乘法定理 (交集):  $P(AB) = P(A)P(B) \Leftrightarrow A$  与  $B$  独立.
  - 加法推论 (补集):  $P(A^c) = P(\overline{A}) = 1 - P(A)$  恒成立.
- 表为互斥事件
  - $\sum A_i = A_1 + \overline{A_1} A_2 + \cdots + \overline{A_1} \overline{A_2} \cdots \overline{A_{n-1}} A_n$ .
    - $A + B = A + (B - A)$ .
    - $A + B + C = A + (B - A) + (C - B - A)$ .
  - 设  $f(m) = \sum_{k,l} \left( \prod_{i=1}^m A_{k_i} \prod_{j=1}^{n-m} \overline{A_{l_j}} \right)$ , 则  $\sum_{i=1}^n A_i = \sum_{m=1}^n f(m)$ .
    - $A + B = (B - A) + (A - B) + AB$ .

$$A + B + C = ABC + (BC - A) + (AC - B) + (AB - C) + (A - B - C) + (B - A - C) + (C - A - B)$$

◦ 综合应用

$$A + B = A + (B - A) = (A - B) + B = (B - A) + (A - B) + AB,$$

$$\text{即 } A + B = A + \overline{A}B = \overline{A}B + \overline{A}B + AB.$$

$$P(A + B) = P(A) + P(\overline{A}B) = P(\overline{A}B) + P(\overline{A}B) + P(AB).$$

• 容斥原理

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB), \text{ 或 } P(AB) = P(A) + P(B) - P(A + B).$$

$$P(\overline{A}B) = P(\overline{A} + \overline{B}), P(\overline{A}B) + P(\overline{A}\overline{B}) = P(\overline{A}) + P(\overline{B}).$$

$$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(CA) + P(ABC).$$

• 恒等式

◦ 化简含括号的运算

$$(A + B) + (A - B) = A + B.$$

$$(A + B) - (A - B) = B.$$

$$(A - B) + (B - A) = (A + B) - AB.$$

$$(A - B) - (B - A) = A - B.$$

◦ 有用的概率恒等式

$$A - B = A - AB, \text{ 或 } \overline{A}B = A\overline{A}B.$$

$$P(A - B) = P(A) - P(AB). \text{ (利用减法定理)}$$

$$P(AB) = P(A) - P(\overline{A}B).$$

$$P(\overline{A}B) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(B) + P(\overline{A}B).$$

• 例题

$$\text{◦ 欧拉装错信封: } P_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}.$$

$$\text{◦ 先胜 } n \text{ 局者为胜, 甲 } a \text{ 胜 } b \text{ 负, 则甲胜的概率为: } P_n(a, b) = \sum_{i=1}^{n-b} p^{n-a-1+i} (1-p)^{n-b-i} \binom{2n-a-b-1}{n-a-1+i}.$$

$$\text{◦ 设 } n \text{ 个独立事件 } A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 的概率分别为 } p_1, p_2, \dots, p_n, \text{ 记 } p = p_1 + p_2 + \dots + p_n, \text{ 则}$$

$$\text{■ } A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 都不发生的概率小于 } e^{-p}.$$

$$\text{■ } A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 中至少发生 } k \text{ 个的概率小于 } p^k/k!.$$

$$\text{◦ 蒲丰投针问题: } p = \frac{2l}{\pi a}.$$

## 概率的公理化定义

1. 非负性.
2. 规范性.
3. 可列可加性.

### 定理 1 独立事件的交与并

若  $A$  和  $B$  均与  $C$  独立, 则  $AB$  与  $C$  独立  $\Leftrightarrow A + B$  与  $C$  独立.

### 证明

• 法一

1. 必要性

$$\begin{aligned} P((A + B)C) &= P(AC + BC) \\ &= P(AC) + P(BC) - P(ABC^2) \\ &= P(C)(P(A) + P(B) - P(AB)) \\ &= P(C)P(A + B). \end{aligned}$$

2. 充分性

$$\begin{aligned}
P(ABC) &= P((AC)(BC)) \\
&= P(AC) + P(BC) - P((A+B)C) \\
&= P(C)(P(A) + P(B) - P(A+B)) \\
&= P(C)P(AB).
\end{aligned}$$

• 法二

1. 必要性

$$\begin{aligned}
P((A+B)C) &= P((A-B)C) + P((B-A)C) + P(ABC) \\
&= P(AC - ABC) + P(BC - ABC) + P(ABC) \\
&= P(A)P(C) - P(AB)P(C) + P(B)P(C) - P(AB)P(C) + P(AB)P(C) \\
&= P(C)(P(A) + P(B) - P(AB)) \\
&= P(C)P(A+B).
\end{aligned}$$

2. 充分性

$$\begin{aligned}
P(ABC) &= P((A+B)C) - P((A-B)C) - P((B-A)C) \\
&= P(A+B)P(C) - P(AC - ABC) - P(BC - ABC) \\
&= P(A+B)P(C) - P(A)P(C) + P(ABC) - P(B)P(C) + P(ABC) \\
&= P(AC) + P(BC) - P((A+B)C) \\
&= P(C)(P(A) + P(B) - P(A+B)) \\
&= P(C)P(AB).
\end{aligned}$$

**推论** 增加互斥条件的充分条件

若  $A$  和  $B$  均与  $C$  独立, 且  $A$  与  $B$  互斥, 则  $AB$  与  $A+B$  均与  $C$  独立.

**定理 2** 相互独立的充要条件

设  $0 < P(A) < 1$ , 则  $P(B|A) = P(B|\bar{A})$  是事件  $A, B$  相互独立的充要条件.

**证明**

1. 必要性

$$\begin{aligned}
P(B) &= P(AB) + P(\bar{A}B) \\
&= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) \\
&= P(B|A) = P(AB)/P(A).
\end{aligned}$$

2. 充分性

$$\begin{aligned}
P(B|A) &= P(AB)/P(A) = P(B) \\
&= P(AB) + P(\bar{A}B) \\
&= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) \\
&= P(B|\bar{A}).
\end{aligned}$$

**推论** 相互独立的充要条件

设  $0 < P(A) < 1$ , 则  $P(A|B) = P(\bar{A}|B)$  是事件  $A, B$  相互独立的充要条件.

## 第 2 章 随机变量及概率分布

### 2.1 一维随机变量

建议使用常见且最不容易混淆的词语 (已用黑体标出):

- **离散型随机变量**
  - **概率分布律**, 或概率分布, 或概率律, 或分布律.  
Law of Probability Distribution.
    - **分布列**, 分布表.  
Probability Distribution.
      - **类比数列的列表法**.
      - 适用于一维或二维.
    - **概率质量函数**, 或概率函数.  
**pmf**, Probability Mass Function.
      - **类比数列的通项公式**.
      - 取值即概率.
  - **累积分布函数**, 或分布函数, 或累积函数.  
**CDF**, Cumulative Distribution Function.
    - 单调, 有界, 右连续.
- **连续型随机变量**
  - **概率密度函数**, 或概率函数, 或密度函数.  
**pdf**, Probability Density Function.
    - 取值非负, 与  $x$  轴围成面积为 1.
    - 定积分后为概率.
  - **累积分布函数**, 或分布函数, 或累积函数.  
**CDF**, Cumulative Density Function.
    - 单调, 有界, 处处连续.
- **互补累积分布函数**, 或生存函数 (Survival Function),  
或残存函数 (Survivor Function), 或可靠性函数 (Reliable Function)  
**CCDF**, Complementary Cumulative Distribution Function.

此外, **各分布的定义在不同资料上可能不同, 请注意区分**.

常见分布更详细的信息请见笔记附录 ([源代码](#), [PDE](#), 或 [HTML](#))

#### 2.1.1 离散型随机变量

##### 1 二项分布

$$X \sim B(n, p).$$

理解: 事件发生的概率为  $p$ , 则重复  $n$  次试验, 事件发生的次数为  $x$ .

$$\text{概率分布: } P(X = i) = b(i; n, p) = \binom{n}{i} p^i (1 - p)^{n-i}.$$

$$\text{最可能数: } x = \lfloor (n + 1)p \rfloor.$$

##### 2 泊松分布

$$X \sim P(\lambda).$$

理解: 单位时间内事件平均发生  $\lambda$  次, 则某一段单位时间内发生的次数为  $x$ .

$$\text{概率分布: } P(X = i) = \lim_{n \rightarrow \infty} b(i; n, \frac{\lambda}{n}) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^i}{i!}.$$

当二项分布满足  $n > 50, p < 0.1, np < 5$  时, 用泊松分布近似效果较好.



### 3 超几何分布

$$X \sim H(N, n, M).$$

理解:  $N$  件产品中有  $M$  件次品, 从总体中抽  $n$  件时次品的数量  $m$ .

$$\text{概率分布: } P(X = m) = \frac{\binom{M}{m} \binom{N-M}{n-m}}{\binom{N}{n}}.$$

### 4 负二项分布

$$X \sim NB(r, p).$$

理解: 合格率为  $p$ , 抽取到  $r$  个合格产品时, 抽到的不合格产品的个数  $x$ .

$$\text{概率分布: } P(X = i) = d(i; r, p) = \binom{i+r-1}{r-1} p^r (1-p)^i.$$

### 5 几何分布

$$X \sim GE(p).$$

理解: 合格率为  $p$ , 抽取到第一个合格产品时, 抽到的不合格产品的个数  $x$ .

$$\text{概率分布: } P(X = i) = p(1-p)^i.$$

几何分布具有无记忆性.

### 5' 几何分布

$$X \sim G(p).$$

理解: 合格率为  $p$ , 抽取到第一个合格产品时, 抽到的总产品的个数  $x$ .

$$\text{概率分布: } P(X = i) = p(1-p)^{i-1}.$$

几何分布具有无记忆性.

## 2.1.2 连续型随机变量

### 1 正态分布

$$X \sim N(\mu, \sigma^2).$$

$$\text{概率密度函数: } f(x) = (\sqrt{2\pi}\sigma)^{-1} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

$$\text{标准正态分布: } Y = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1).$$

$3\sigma$  原则: 0.6826, 0.9544, 0.9974.

$$\text{上 } \alpha \text{ 分位数: } \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha.$$

### 2 指数分布

$$X \sim E(\lambda).$$

$$\text{概率密度函数: } f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$\text{分布函数: } F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0. \end{cases}$$

指数分布具有无记忆性, 即  $P(X > m + t | X > m) = P(X > t)$ .

### 3 威布尔分布

$$\text{概率密度函数: } f(x) = \begin{cases} \lambda \alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x^\alpha}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$\text{分布函数: } F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x^\alpha}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

## 4 均匀分布

$$X \sim R(a, b).$$

$$\text{概率密度函数: } f(x) = \begin{cases} 1/(b-a), & a \leq x \leq b, \\ 0, & x < a \text{ 或 } x > b. \end{cases}$$

$$\text{分布函数: } F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ (x-a)/(b-a), & a < x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$

## 5 对数正态分布

$$\ln X \sim N(\mu, \sigma^2).$$

$$\text{概率密度函数: } f(x, \mu, \sigma) = \begin{cases} (x\sqrt{2\pi}\sigma) \exp\left[-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right], & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

## 6 柯西分布

$$X \sim C(\gamma, x_0).$$

$$\text{概率密度函数: } f(x; x_0, \gamma) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\gamma}{(x - x_0)^2 + \gamma^2} \quad (-\infty < x < +\infty).$$

## 7 拉普拉斯分布

$$X \sim \text{La}(\mu, b).$$

$$\text{概率密度函数: } f(x) = \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{|x-\mu|}{\lambda}}.$$

# 2.2 多维随机变量

## 2.2.1 离散性随机向量

### 1 多项分布

$$X = (X_1, \dots, X_n) \sim M(N; p_1, \dots, p_n).$$

$$P(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_n = k_n) = \frac{N!}{k_1! k_2! \dots k_n!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_n^{k_n}.$$

多项分布的边缘分布是二项分布.

$$(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim M(N; p_1, p_2, \dots, p_n) \Rightarrow X_1 + X_2 \sim B(N; p_1 + p_2).$$

## 2.2.2 连续型随机向量

### 1 矩形均匀分布

### 2 二维正态分布

$$X = (X_1, X_2) \sim N(a, b, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho).$$

$$f(x_1, x_2) = (2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2})^{-1} \exp\left[-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{(x_1-a)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x_1-a)(x_2-b)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-b)^2}{\sigma_2^2}\right)\right].$$

当且仅当  $\rho = 0$  时,  $X_1$  和  $X_2$  独立.

### 其它性质

- 二维正态分布的[边缘分布](#)是正态分布.
- 二维正态分布的[条件分布](#)是正态分布.

若  $(X, Y) \sim N(a, b, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ , 则给定  $X = x$  时  $Y$  的条件分布为

$$N(b + \rho\sigma_2\sigma_1^{-1}(x-a), \sigma_2^2(1-\rho^2)).$$

- 二维正态分布的**边缘分布的和**仍为正态分布  
若  $(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ , 则  $Y = X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2)$ .
- **独立**的正态分布的**联合分布**是正态分布.  
正态分布的联合分布不一定是二维正态分布.
- 相互独立的正态分布的和仍为正态分布  
若  $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ , 则  $X_1 + \cdots + X_n \sim N(\mu_1 + \cdots + \mu_n, \sigma_1^2 + \cdots + \sigma_n^2)$ .
- 若  $Y = X_1 + X_2$  服从正态分布,  $X_1, X_2$  独立, 则  $X_1, X_2$  也是正态分布. ★

### 3 多元正态分布

设  $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$  为  $n$  元随机变量, 令

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix},$$

其中  $\mathbf{C}$  为**协方差矩阵**. 如果  $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$  的概率密度函数为

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \frac{e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T \mathbf{C}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})}}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |\mathbf{C}|^{\frac{1}{2}}}$$

则称  $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$  是参数为  $\boldsymbol{\mu}, \mathbf{C}$  的  $n$  元正态变量.

#### 其它性质

- $n$  维正态分布的**边缘分布**是正态分布.
- $n$  维正态分布的**条件分布**是正态分布.
- $n$  维正态分布的**边缘分布的和**是正态分布.
- $n$  维随机变量  $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$  服从  $n$  维正态分布的充要条件是:

$$\forall l_i \in \mathbb{R} (i = 1, 2, \cdots, n) : l_1 X_1 + l_2 X_2 + \cdots + l_n X_n \sim N(\mu, \sigma^2).$$

- 若  $Y_1, Y_2, \cdots, Y_m$  都是  $n$  维正态分布分量  $X_i (i = 1, 2, \cdots, n)$  的**线性函数**, 则  $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_m)$  服从  $m$  维正态分布.
- $n$  维正态分布各分量**相互对立**充要条件是它们**两两不相关**.

## 2.2.3 边缘分布

### 1 概念解释

- 随机向量的分布可以决定其任一分量的边缘分布, 但反之不亦然.
- 随机向量也叫作其边缘分布的**联合分布**.
- 类似的有二维的边缘分布.

### 2 多项分布

$(X_1, \cdots, X_n) \sim M(N; p_1, \cdots, p_n)$  关于  $X_1$  的边缘分布为  $M(N, p_1)$ .

### 3 二维正态分布

$(X_1, X_2) \sim N(a, b, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$  关于  $X_1$  和  $X_2$  的边缘分布分别是  $N(a, \sigma_1^2)$  和  $N(b, \sigma_2^2)$ .

## 2.3 条件概率分布与随机变量的独立性

### 2.3.1 条件概率分布的概念

## 2.3.2 离散性随机变量的条件概率分布

### 1 多项分布

在给定  $X_2 = k_2$  的条件下,  $X_1$  的条件分布为  $B(N - k_2, p_1/(1 - p_2))$ .

## 2.3.3 连续性随机变量的条件概率分布

$$f_1(x_1 | a \leq X_2 \leq b) = \int_a^b f(x_1, t_2) dt_2 / \int_a^b f_2(t_2) dt_2$$

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= f_2(x_2)f_1(x_1 | x_2) \\ f(x_1, \dots, x_n) &= g(x_1, \dots, x_k)h(x_{k+1}, \dots, x_n | x_1, \dots, x_k) \end{aligned}$$

$$f_1(x_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x_2)f_1(x_1 | x_2)dx_2$$

正态变量的条件分布仍为正态. 正态分布[条件分布的中心位置](#)是

$$m(x_1) = b + \rho\sigma_2\sigma_1^{-1}(x_1 - a).$$

## 2.3.4 随机变量的独立性

两个变量的独立  $\Leftrightarrow f_1(x_1) = f_1(x_1 | x_2)$ .

**定义 3.1** 连续型随机变量的相互独立 (独立)

$$X_1, X_2, \dots, X_n \text{ 相互独立 (独立)} \Leftrightarrow f(x_1, \dots, x_n) = f_1(x_1) \cdots f_n(x_n).$$

**定理 3.1**

$$\text{连续变量独立} \Leftrightarrow \text{对应的事件独立}.$$

**定理 3.2**

若连续型随机向量  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  的概率密度函数  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g_1(x_1)g_2(x_2) \cdots g_n(x_n)$ , 则  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立, 且  $f_i(x_i) = Cg_i(x_i)$ .

**定理 3.3**

若  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立,

$$Y_1 = g_1(X_1, X_2, \dots, X_m), Y_2 = g_2(X_{m+1}, X_{m+2}, \dots, X_n),$$

则  $Y_1$  和  $Y_2$  独立.

**定义 3.2** 离散性随机变量的相互独立

$X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立 (独立) 等价于

$$\forall a_1, a_2, \dots, a_n: P(X_1 = a_1, \dots, X_n = a_n) = P(X_1 = a_1) \cdots P(X_n = a_n).$$

**示性函数**

$$X = \begin{cases} 1, & \text{当事件 } A \text{ 发生时,} \\ 0, & \text{当事件 } A \text{ 不发生时.} \end{cases}$$

## 2.4 随机变量的函数的概率分布

### 2.4.1 离散性分布

1. 多项分布  $(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim M(N; p_1, p_2, \dots, p_n) \Rightarrow X_1 + X_2 \sim B(N; p_1 + p_2)$ .
2. 二项分布  $X_1 \sim B(n_1, p), X_2 \sim B(n_2, p) \Rightarrow X_1 + X_2 \sim B(n_1 + n_2, p)$ .
3. 泊松分布  $X_1 \sim P(\lambda_1), X_2 \sim P(\lambda_2) \Rightarrow X_1 + X_2 \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$ .

## 2.4.2 连续型分布

### 1 单变量函数

#### 1.1 严格单调

若  $X$  有密度函数  $f(x)$ ,  $Y = g(X)$  且该函数**严格单调**, 令  $X = h(Y)$ , 则  $Y$  的概率密度函数为

$$l(y) = f(h(y)) |h'(y)|.$$

- $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ .
- 若  $X \sim f(x)$ , 则  $aX + b \sim \frac{1}{a}f\left(\frac{x-b}{a}\right)$ .

#### 1.2 幂函数

若  $X$  有密度函数  $f(x)$ ,  $Y = X^n$ , 其中  $n$  为偶数, 则  $Y$  的概率密度函数为

$$l(y) = \left| \frac{y^{\frac{1}{n}-1}}{n} \right| \left[ f(y^{\frac{1}{n}}) + f(-y^{\frac{1}{n}}) \right]. \quad (n \text{ 是偶数})$$

- 若  $X \sim N(0, 1)$ , 则  $Y = X^2$  的密度函数为  $l(y) = \begin{cases} \left(\sqrt{2\pi y}\right)^{-1} e^{-y/2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$

### 2 多变量函数

以两个为例, 多变量是类似的.

$$\begin{cases} Y_1 = g_1(X_1, X_2) \\ Y_2 = g_2(X_1, X_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_1 = h_1(Y_1, Y_2) \\ X_2 = h_2(Y_1, Y_2) \end{cases}$$

则雅可比行列式为

$$J(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial y_1} & \frac{\partial h_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial h_2}{\partial y_1} & \frac{\partial h_2}{\partial y_2} \end{vmatrix},$$

概率密度函数

$$l(y_1, y_2) = f(h_1(y_1, y_2), h_2(y_1, y_2)) |J(y_1, y_2)|.$$

## 2.4.3 随机变量和的密度函数

设  $(X_1, X_2)$  的联合密度函数为  $f(x_1, x_2)$ , 则  $Y = X_1 + X_2$  的密度函数为

$$l(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y-x, x) dx.$$

- 法一: 固定  $y$  后积分得分布函数, 再对  $y$  求得上式.
- 法二: 补充  $Y_2 = X_1$ , 利用 2.4.2.2

- 
- 二维正态分布的边缘分布的和仍为正态分布

若  $(X_1, X_2) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ , 则  $Y = X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2)$ .

- 相互独立的正态分布的和仍为正态分布

若  $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ , 则  $X_1 + \cdots + X_n \sim N(\mu_1 + \cdots + \mu_n, \sigma_1^2 + \cdots + \sigma_n^2)$ .

- 若  $Y = X_1 + X_2$  服从正态分布,  $X_1, X_2$  独立, 则  $X_1, X_2$  也是正态分布.
- 

自由度为  $n$  的皮尔逊卡方密度与 **卡方分布**  $X \sim \chi_n^2$

$$k_n(x) = \begin{cases} \frac{e^{-x/2} x^{(n-2)/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) 2^{n/2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

- 若  $X_1, X_2, \cdots, X_n$  相互独立, 且有公共分布  $N(0, 1)$  (**独立同分布 iid**), 则  $Y = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2 \sim \chi_n^2$ .

- 若  $X_1 \sim \chi_m^2$  与  $X_2 \sim \chi_n^2$  独立, 则  $X_1 + X_2 \sim \chi_{m+n}^2$ .
- 若  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立, 且都服从指数分布  $E(\lambda)$ , 则  $X = 2\lambda(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \sim \chi_{2n}^2$ .
- $E(\chi_n^2) = n$ .
- $E(\chi_n^2)^{-1} = \frac{1}{n-2}$ .
- $E(\chi_n^2)^k = \frac{2^k \Gamma\left(\frac{n}{2} + k\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \quad (k \in \mathbb{Z})$ .
- $\text{Var}(\chi_n^2) = 2n$ .

注意到方差是均值的两倍, 可以以此检验是否为卡方分布. 🌙

## 2.4.4 随机变量商的密度函数

设  $(X_1, X_2)$  的联合密度函数为  $f(x_1, x_2)$ , 则  $Y = X_1/X_2$  的密度函数为

$$l(y) = \int_0^{+\infty} x f(xy, x) dx.$$

- 法一: 固定  $y$  后积分得分布函数, 再对  $y$  求得上式.
- 法二: 补充  $Y_2 = X_2$ , 利用 2.4.2.2

设  $X_1, X_2$  独立,  $X_1 \sim \chi_n^2$ ,  $X_2 \sim N(0, 1)$ ,  $Y = X_2/\sqrt{X_1/n}$ , 则  $Y$  的概率函数为

$$t_n(y) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{n\pi} \Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{y^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}.$$

称为自由度为  $n$  的  $t$  分布.

- $E(t_n) = 0 \quad (n > 1)$ .
- $\text{Var}(t_n) = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2)$ .

设  $X_1, X_2$  独立,  $X_1 \sim \chi_n^2$ ,  $X_2 \sim \chi_m^2$ ,  $Y = \frac{X_2}{m} / \frac{X_1}{n}$ , 则  $Y$  的概率密度函数为

$$f_{m,n}(y) = m^{m/2} n^{n/2} \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} y^{m/2-1} (my+n)^{-(m+n)/2} \quad (y > 0)$$

称为自由度为  $(m, n)$  的  $F$  分布.

- $E(f_{m,n}) = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2)$ .
- $\text{Var}(f_{m,n}) = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$ .

## 2.4.5 多个随机变量的最值

★ 若  $X_1, X_2, \dots, X_n$  独立同分布, 且有分布函数  $F(x)$  和密度函数  $f(x)$ , 则

$$Y = \max(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim nF^{n-1}(x)f(x),$$

$$Z = \min(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim n[1 - F(x)]^{n-1}f(x).$$

## 注意事项

- 概率密度函数在某点的取值必为 0. 如果非零, 则不存在这样的概率密度函数. 即混合型随机变量没有概率密度函数.
- 计算随机变量的函数的概率分布时, 注意[单调性](#), [值域](#)和[值域是否重叠](#).



## 第 3 章 随机变量的数字特征

### 3.1 数学期望与中位数

#### 3.1.1 数学期望的定义

#### 3.1.2 数学期望的性质

##### 基本性质

- 随机变量之和的期望

$$E(X_1 + X_2 + \cdots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \cdots + E(X_n).$$

- 独立的随机变量之积的期望

$$E(X_1 X_2 \cdots X_n) = E(X_1) E(X_2) \cdots E(X_n).$$

- 随机变量函数的期望

$$E(g(X)) = \sum_i g(a_i) p_i \text{ 或 } \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx \quad (\text{若求和或极限存在.})$$

##### 用分布函数计算期望

🍌 设随机变量  $X$  只取非负值, 其分布函数为  $F(x)$ , 则在以下两种情况下都有

$$E(X) = \int_0^{+\infty} [1 - F(x)] dx.$$

1.  $X$  为连续性, 有概率密度函数  $f(x)$ .
2.  $X$  为离散型, 有分布  $P(X = k) = p_k$  ( $k = 0, 1, 2, \cdots$ ).

##### 证明

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} [1 - F(x)] dx &= \int_0^{+\infty} \left[ \int_0^{+\infty} f(y) dy - \int_0^x f(y) dy \right] dx \\ &= \int_0^{+\infty} \int_x^{+\infty} f(y) dy dx = \int_0^{+\infty} y f(y) dy = E(X) \\ \int_0^{+\infty} [1 - F(x)] dx &= \sum_{i=0}^{\infty} \int_i^{i+1} [1 - F(x)] dx = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=i+1}^{\infty} p_j \\ &= p_1 + 2p_2 + 3p_3 + \cdots = E(X) \end{aligned}$$

**注** 上式对任何非负随机变量都成立, 但证明超出初等方法.

##### 期望的不等式

若  $X, Y$  独立同分布且只取正值, 则

1.  $E(X)E(X^{-1}) \geq 1$ .
2.  $E(X/Y) \geq 1, E(Y/X) \geq 1$ .

**证明** (1) 式由施瓦茨不等式  $E(X^2)E(Y^2) \geq [E(XY)]^2$  即得, (2) 式由 (1) 式即得.

##### 期望的等式

若  $X_1, X_2, \cdots, X_n$  独立同分布且只取正值, 则

$$E\left(\frac{X_1}{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}\right) = \frac{1}{n}.$$



### 3.1.3 条件数学期望 (条件均值)

条件期望  $E(Y | x)$  称为  $Y$  对  $X$  的回归函数.

$$E(Y | x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y | x) dy.$$

期望等于条件期望的期望

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} E(Y | x) f_1(x) dx \\ &= E[E(Y | X)] \end{aligned}$$

### 3.1.4 中位数

- 中位数总是存在, 均值则不然.
- 中位数可以不唯一 (有无穷多个).
- $E|X - a| \geq E|X - m|$ , 其中  $m$  为中位数.

## 3.2 方差与矩

### 3.2.1 方差和标准差

符号说明  $\text{Var}(X) \equiv D(X) \equiv E[(X - \bar{X})^2]$ .

基本性质

1.  $\text{Var}(X) = E(X - EX)^2 = E(X^2) - (EX)^2$ .
2.  $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ .
3. 独立随机变量:  $\text{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = \text{Var}(X_1) + \cdots + \text{Var}(X_n)$ .

注意 比较  $\text{Var}(nX_1) = n^2 \text{Var}(X_1)$ , 而独立同分布时  $\text{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = n \text{Var}(X_1)$ .

其它性质

1.  $E[(X - c)^2] = \text{Var}(X) + (EX - c)^2$ .
  - 由此可知  $\text{Var}(X) \leq E[(X - c)^2]$ , 当且仅当  $c = EX$  时取等.
  - 注: 令  $c = 0$  即得基本性质 (1) 式.

2. 若  $X \in [a, b]$ , 则  $\text{Var}(X) \leq \frac{(b - a)^2}{4}$ .

证明: 令  $Y = \frac{X - a}{b - a} \in [0, 1]$ , 则  $\text{Var}(Y) = E(Y^2) - E(Y)^2 \leq E(Y) - E(Y)^2 \leq \frac{1}{4}$ .

### 3.2.2 原点矩与中心矩

矩又被称为动差 (Moment).

定义

1.  $X$  关于  $c$  点的  $k$  阶矩:  $E[(X - c)^k]$ .
2.  $k$  阶原点矩:  $\alpha_k = E(X^k)$ .
3.  $k$  阶中心矩:  $\mu_k = E[(X - EX)^k]$ .

特例

1.  $E(X) = \mu = \alpha_1$ .
2.  $\text{Var}(X) = \sigma^2 = \mu_2$ .

关系

$$\begin{aligned}\mu_0 &= 1 = \alpha_0 \\ \mu_1 &= 0 \neq \alpha_1 = \mu, \\ \mu_2 &= \sigma^2 = \alpha_2 - \mu^2, \\ \mu_3 &= \alpha_3 - 3\mu\alpha_2 + 2\mu^3, \\ \mu_4 &= \alpha_4 - 4\mu\alpha_3 + 6\mu^2\alpha_2 - 3\mu^4, \\ \mu_k &= \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} \alpha_1^i \alpha_{k-i}.\end{aligned}$$

性质

1.  $\mu_k(aX + b) = a^k \mu_k(X)$ .
2. 独立随机变量:  $\mu_k(X_1 + \cdots + X_n) = \mu_k(X_1) + \cdots + \mu_k(X_n)$ .
3.  $\alpha_k(aX + b) = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^i b^{k-i} \alpha_i(X)$ .

### 3.2.3 基于矩的系数

偏度系数  $\beta_1 = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}}$ .

峰度系数  $\beta_2 = \frac{\mu_4}{\mu_2^2}$ .

- 正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$  的峰度系数为 3, 故有时定义峰度系数为  $\mu_4 / \mu_2^2 - 3$ .

变异系数  $c_v \equiv V_\sigma \equiv \frac{\sigma}{\mu}$ .

- 备注
  - 也称为**标准差系数**, **标准离差率** 或 **单位风险**.
  - 有时使用记号  $C.V = \frac{SD}{MN} \times 100\%$ .
- 优缺点
  - 无量纲参数, 用于比较两组数据的离散程度.
  - 当期望接近 0 时, 变异系数的精确度会下降.
  - 编译系数无法发展处类似均值的置信区间的工具.

## 3.3 协方差与相关系数

### 3.3.1 协方差

基本性质

1.  $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)]$ .
2.  $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$ .
3.  $\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$ .
4.  $\text{Cov}(a_1X + b_1, a_2Y + b_2) = a_1a_2 \text{Cov}(X, Y)$ .
5.  $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ . ★
6.  $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$ . ★
7. 若  $X, Y$  独立, 则  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ .
8.  $[\text{Cov}(X, Y)]^2 \leq \sigma_1^2 \sigma_2^2$ , 且当且仅当  $Y = a + bX$  时取等.

**施瓦茨不等式**  $E(X^2)E(Y^2) \geq [E(XY)]^2$ , 当且仅当具有线性关系即  $aX + bY = 0$  时取等.

- 由  $E[(Y + tX)^2] \geq 0$  的判别式小于零即得.

**协方差矩阵** 设  $n$  维随机变量  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  中  $X_i$  与  $X_j$  的协方差都存在, 且记作  $c_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$ ,  $i, j = 1, 2, \dots, n$ , 则协方差矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}.$$

其中  $c_{ii} = \text{Var}(X_i)$ . [多元正态分布中的应用](#)

### 3.3.2 相关系数

符号说明  $\text{Corr}(X, Y) = R(X, Y) = \rho_{XY}$ .

基本性质

1.  $\text{Corr}(X, Y) \equiv \text{Cov}(X, Y) / (\sigma_1 \sigma_2)$ .

- 相关系数也可以记作

$$\rho(X, Y) = E \left[ \left( \frac{X - E(X)}{\sqrt{\text{Var}(X)}} \right) \left( \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{\text{Var}(Y)}} \right) \right].$$

2.  $\text{Corr}(X, Y) = \text{Corr}(Y, X)$ .

- 相关系数矩阵是对称阵.

3.  $\text{Corr}(a_1 X + b_1, a_2 Y + b_2) = \text{Corr}(X, Y)$ .

- 相关系数不受单位影响.

4. 若  $X, Y$  独立, 则  $\text{Corr}(X, Y) = 0$ .

- 若  $\text{Corr}(X, Y) = 0$  则称  $X$  与  $Y$  **不相关**.

5.  $|\text{Corr}(X, Y)| \leq 1$ , 且当且仅当  $X$  和  $Y$  有严格线性关系时取等.

- 相关系数又称为线性相关系数.

6. 最小二乘及其均方误差.

$$\begin{aligned} E[(Y - a - bX)^2] &\equiv E[(Y - m_2) - b(X - m_1) - c]^2 \\ &= \sigma_2^2 + b^2 \sigma_1^2 - 2b \text{Cov}(X, Y) + c^2 \\ &\geq \sigma_2^2 + b^2 \sigma_1^2 - 2b \text{Cov}(X, Y) \end{aligned}$$

$$b = \text{Cov}(X, Y) / \sigma_1^2 = \sigma_1^{-1} \sigma_2 \text{Corr}(X, Y) \equiv \sigma_1^{-1} \sigma_2 \rho$$

$$L(X) = m_2 - \sigma_1^{-1} \sigma_2 \rho m_1 + \sigma_1^{-1} \sigma_2 \rho X$$

$$\begin{aligned} E[(Y - L(X))^2] &= \sigma_2^2 + b^2 \sigma_1^2 - 2b \text{Cov}(X, Y) \quad (\text{由最上式}) \\ &= \sigma_2^2 (1 - \rho^2) \end{aligned}$$

### 二维正态分布

若  $(X, Y) \sim N(a, b, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ , 则

- 即使允许用任何函数  $M(X)$  逼近  $Y$ , 则所得到的最佳逼近仍是  $L(X)$ , 故只需考虑线性逼近已足够.
- 对于二维正态分布,  $\text{Corr}(X, Y) = \rho$ , 即  $\text{Corr}(X, Y) = 0$  可推出二者独立.

## 3.4 大数定理和中心极限定理

### 3.4.1 大数定理

依概率收敛  $Y_n \xrightarrow{P} a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| < \varepsilon\} = 1$ .

- $X_n \xrightarrow{P} a \Rightarrow g(X_n) \xrightarrow{P} g(a)$ . (其中  $X_n$  可为向量)

马尔科夫不等式 若  $Y$  为只取非负值的随机变量, 则对  $\forall \varepsilon > 0$ , 有

$$P(Y \geq \varepsilon) \leq E(Y) / \varepsilon.$$

切比雪夫不等式 若  $\text{Var}(Y)$  存在, 则

$$P(|Y - EY| \geq \varepsilon) \leq \text{Var}(Y) / \varepsilon^2.$$

- 切比雪夫不等式在参数估计的相合性判断中的[应用](#).

大数定理 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是独立同分布的随机变量, 记它们的公共均值为  $a$ , 方差存在并记为  $\sigma^2$ , 则对  $\forall \varepsilon > 0$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - a| \geq \varepsilon) = 0.$$

伯努利大数定理 即大数定理的特例 (频率收敛于概率)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|p_n - p| \geq \varepsilon) = 0.$$

- 大数定理中无需假定  $X_i$  的方差存在也可以证明 (即 **辛钦大数定理**), 不必同分布, 甚至可以不独立.

### 3.4.2 中心极限定理

#### 应用

**林德伯格—莱维定理** 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为独立同分布的随机变量,  $E(X_i) = a$ ,  $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$  ( $0 < \sigma^2 < \infty$ ), 则对任何实数  $x$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{1}{\sqrt{n}\sigma}(X_1 + X_2 + \dots + X_n - na) \leq x\right) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{e^{-\frac{t^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dt.$$

- 因此, 任何独立同分布的大量随机变量之和近似服从正态分布.

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \dot{\sim} N(0, 1) \Rightarrow \bar{X} \dot{\sim} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

- 误区: 变量本身的分布并未改变. 可以将大量随机变量分为若干组大量随机变量, 分别计算其和, 并验证其符合正态分布. 这个性质可用于参数估计等, 但不可用于检验随机变量的值是否被篡改.

**棣莫弗—拉普拉斯定理** 上式的特例, 当  $P(X_i = 1) = p$ ,  $P(X_i = 0) = 1 - p$  ( $0 < p < 1$ ) 时, 对任何实数  $x$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{1}{\sqrt{np(1-p)}}(X_1 + X_2 + \dots + X_n - np) \leq x\right) = \Phi(x).$$

- 或者说, 若随机变量  $\eta_n \sim B(n, p)$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 则对任何实数  $x$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \Phi(x).$$

#### 估值公式

$$P(t_1 \leq X_1 + X_2 + \dots + X_n \leq t_2) \approx \Phi(y_2) - \Phi(y_1).$$

其中  $y_i = (t_i - np) / \sqrt{np(1-p)}$ , 或修正为

$$\begin{cases} y_1 = \left(t_1 - \frac{1}{2} - np\right) / \sqrt{np(1-p)}, \\ y_2 = \left(t_2 + \frac{1}{2} - np\right) / \sqrt{np(1-p)}. \end{cases}$$

## 3.5 母函数

### 3.5.1 母函数的定义

**整值随机变量** 即只取非负整值的随机变量.

若整值随机变量的概率分布为  $P\{X = k\} = p_k$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots$ , 则其**母函数**为

$$G(s) := E(s^X) = \sum_{k=0}^{+\infty} p_k s^k.$$

- $G(1)$  收敛且为 1 (而不是书中说的因为某种方式的计算结果为 1 而收敛), 且  $G(-1)$  绝对收敛, 故  $G(s)$  至少在  $[-1, 1]$  上绝对收敛.

### 3.5.2 常见分布的母函数

- 对于  $X \sim B(n, p)$ , 有

$$G(s) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} s^k = (ps + q)^n, \quad s \in (-\infty, +\infty).$$

- 对于  $X \sim P(\lambda)$ , 有

$$G(s) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \cdot s^k = e^{\lambda(s-1)}, \quad s \in (-\infty, +\infty).$$

- 对于  $X \sim G(p)$ , 有

$$G(s) = \sum_{k=1}^{+\infty} pq^{k-1}s^k = \frac{ps}{1-qs}, \quad s \in \left(-\frac{1}{q}, \frac{1}{q}\right).$$

### 3.5.3 母函数的性质

- $p_k = \frac{G^{(k)}(0)}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots$ .
- $E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} kp_k = G'(1)$ .
- $E(X_{(n)}) = G^{(n)}(1)$ . (前者下标表示下降阶乘幂, 后者上标表示高阶导数)
- $\text{Var}(X) = G''(1) + G'(1) - [G'(1)]^2$ .

若  $X$  的  $k$  阶矩存在, 则有

- $G^{(0)}(1) = 1$ .
- $G^{(1)}(1) = E(X)$ .
- $G^{(2)}(1) = E(X^2) - E(X)$ .
- $G^{(3)}(1) = E(X^3) - 3E(X^2) + 2E(X)$ .
- $G^{(4)}(1) = E(X^4 - 6X^3 + 11X^2 - 6X)$ .

### 3.5.4 母函数的定理

对于可数集合  $\mathcal{A}$  及其大小函数  $f: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{N}$ , 简记  $f(p) = |p|_{\mathcal{A}} = |p|$ , 定义

$$a_n := |\{p \mid p \in \mathcal{A}, |p| = n\}|$$

$$|(a_1, a_2, \dots, a_n)| := \sum_{i=1}^n |a_i|$$

**加法定理** 如果  $\mathcal{A}$  与  $\mathcal{B}$  互斥, 则其无交并的母函数为  $C(x) = A(x) + B(x)$ .

或者说, 若满足 (或定义) 了

1.  $\mathcal{A} \cap \mathcal{B} = \emptyset$ .
2.  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} = \mathcal{C}$ .
3.  $|p|_{\mathcal{C}} = \begin{cases} |p|_{\mathcal{A}}, & p \in \mathcal{A}, \\ |p|_{\mathcal{B}}, & p \in \mathcal{B}, \end{cases}$

则有  $C(x) = A(x) + B(x)$ .

**乘法定理** 如果有  $\mathcal{A} \times \mathcal{B} = \mathcal{C}$ , 则有  $C(x) = A(x)B(x)$ .

**序列构造** 若  $\mathcal{B} = \text{SEQ}(\mathcal{A}) := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{A}^n$ , 则有形式幂级数  $B(x) = \frac{1}{1 - A(x)}$ .

设整值随机变量  $X \sim P\{X = k\} = a_k$  和  $Y \sim P\{Y = k\} = b_k$  相互独立, 且母函数分别为  $A(s), B(s)$ , 则  $Z = X + Y$  的母函数为

$$G(s) = A(s)B(s) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} s^n.$$

若  $n$  个整值随机变量独立同分布, 则  $G(s) = [G_1(s)]^n$ .

## 3.6 特征函数

### 3.6.1 特征函数的定义

设  $X, Y$  为实随机变量, 则称  $Z = X + iY$  为 **复随机变量**.

设  $X$  是实随机变量, 则  $X$  的 **(一维) 特征函数** 为

$$\begin{aligned}
g(t) &= E(e^{itX}) \quad (-\infty < t < +\infty) \\
&= \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx, & \text{连续型随机变量,} \\ \sum p_k e^{itx_k} = G(e^{it}), & \text{离散性随机变量.} \end{cases} \\
&= \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos tx dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin tx dx, & \text{连续型随机变量,} \\ \sum p_k \cos tx_k + i \sum p_k \sin tx_k, & \text{离散性随机变量.} \end{cases}
\end{aligned}$$

- 上述级数与广义积分绝对收敛.

### 3.6.2 常见分布的特征函数

常见分布	特征函数
$X \sim B(n, p)$	$g(t) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} e^{itk} = (pe^{it} + q)^n$
$X \sim P(\lambda)$	$g(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} e^{itk} = e^{\lambda(e^{it}-1)}$
$X \sim G(p)$	$g(t) = \sum_{k=1}^{+\infty} p q^{k-1} e^{itk} = \frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}}$
$X \sim U(a, b)$	$g(t) = \int_a^b \frac{e^{itx}}{b-a} dx = \begin{cases} \frac{e^{ibt} - e^{iat}}{it(b-a)}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}$
$X \sim E(\lambda)$	$g(t) = \int_0^{+\infty} e^{itx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda}{\lambda - it}$
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$g(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = e^{i\mu t} = e^{i\mu t - \frac{\sigma^2}{2} t^2}$

### 3.6.3 特征函数的性质

1.  $g(0) = 1$ .
2.  $|g(t)| \leq 1$ .
3.  $g(-t) = \overline{g(t)}$ .
4.  $g(t)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续.
5.  $\forall n \in \mathbb{N}^+, \forall t_i \in \mathbb{R}, \forall z_i \in \mathbb{C}$  :

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n g(t_j - t_k) z_j \bar{z}_k \geq 0.$$

6. 如果  $X$  的  $n$  阶原点矩存在, 则它的特征函数 的  $n$  阶导数存在, 且

$$g^{(k)}(0) = i^k E(X^k), \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

7. 若  $X$  的特征函数为  $g_X(t)$ , 且  $Y = aX + b$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ), 则

$$g_Y(t) = e^{ibt} g_X(at).$$

8. 如果  $X_1$  和  $X_2$  相互独立, 且特征函数分别为  $g_1(t), g_2(t)$ , 则  $Y = X_1 + X_2$  的特征函数为

$$g_Y(t) = g_1(t) g_2(t).$$

9. 如果两个随机变量有相同的特征函数, 那么它们具有相同的概率分布, 反之亦然.

类似的, 由性质 6 可得到  $k$  阶原点矩.

## 3.7 矩量母函数

矩量母函数又称动差生成函数 (MGF, Moment, Generating Function).

3.7.1 相关定义

对于任意随机变量  $\xi$ , 若下述数学期望存在, 即求和或积分存在, 则矩量母函数 (mgf) 为

$$m_{\xi}(t) := E(e^{t\xi}) = \begin{cases} \sum e^{tx} P(X = x), & \text{离散性随机变量,} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f(x) \mathrm{d}x, & \text{连续性随机变量.} \end{cases}$$

其对数称为 **累积量生成函数**

$$R_{\xi}(t) := \ln m_{\xi}(t).$$

3.7.2 常见分布的矩量母函数

常见分布	矩量母函数
$\xi \sim \Gamma(\alpha, \beta)$	$m_{\xi}(t) = \frac{1}{(1 - \beta t)^{\alpha}}, \quad t < \frac{1}{\beta}.$
$X \sim \text{Ga}(\alpha, \beta)$	$m_X(t) = \left(1 - \frac{t}{\beta}\right)^{-\alpha}, \quad t < \beta.$
$\xi \sim \chi_n^2$	$m_{\xi}(t) = \frac{1}{(1 - 2t)^{\frac{n}{2}}}, \quad t < \frac{1}{2}.$
$\xi \sim E(\lambda)$	$m_{\xi}(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad t < \lambda.$

3.7.3 矩量母函数的性质

1. 矩量性质

$$\begin{aligned} m_{\xi}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ 1 + tx + \frac{(tx)^2}{2!} + \cdots + \frac{(tx)^n}{n!} + \cdots \right] f(x) \mathrm{d}x \\ &= 1 + \mu_1 t + \frac{\mu_2}{2!} t^2 + \cdots + \frac{\mu_n}{n!} t^n + \cdots \end{aligned}$$

2. 求随机变量的原点矩

$$E(X^k) = \mu_k = \left. \frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}t^k} m_X(t) \right|_{t=0} = m_X^{(k)}(0).$$

1.  $E(X) = m_X'(0).$
2.  $\text{Var}(X) = m_X''(0) - m_X'(0)^2.$
3. 双边 Laplace 变换  $m_{\xi}(-t) = \mathcal{B}[f(x)](t).$
4. 无论概率密度函数是否连续, 都有

$$m_{\xi}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} \mathrm{d}F(x).$$

5. 如果两个随机变量具有相同的矩量母函数, 则它们具有相同的概率分布; 反之亦然.
6. 如果  $X_1$  和  $X_2$  相互独立, 且矩量母函数分别为  $m_{X_1}(t)$  和  $m_{X_2}(t)$ , 则  $Y = X_1 + X_2$  的矩量母函数为

$$m_Y(t) = m_{X_1}(t)m_{X_2}(t).$$

例题

1. 分鞋问题

将  $X$  分为若干个同分布但不相互独立  $X_i$  相加, 则  $E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i).$

由于不独立, 不可单独计算方差后相加, 但可以利用  $E(X^2) = \sum_{i,j=1}^n E(X_i X_j).$

2. 装盒问题

将  $r$  个球随机地放入  $n$  个盒子中, 以  $X$  记空盒个数,

设恰有  $k$  个空盒的概率为  $p_k(r, n)$ , 均值记为  $m(r, n)$ , 则

$$\begin{aligned} p_k(r+1, n) &= p_k(r, n) \frac{n-k}{n} + p_{k+1}(r, n) \frac{k+1}{n} \\ m(r+1, n) &= \sum_{k=0}^n k p_k(r, n) + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n [(k+1)^2 p_{k+1} - k^2 p_k] - \sum_{k=0}^n \frac{k+1}{n} p_{k+1} \\ &= \left(1 - \frac{1}{n}\right) m(r, n) = n \left(1 - \frac{1}{n}\right)^r. \end{aligned}$$