

Let $g \in C^1(\mathbb{R})$.

Problem 1:

Consider $u_t - 2u_x = x$ for $x \in \mathbb{R}$, $t > 0$, with $u(x, 0) = g(x)$.

Fix $x \in \mathbb{R}$, $t > 0$. Define $z(s) = u(x + 2s, t + s)$. Then $\frac{d}{ds}z(s) = 2u_x(x + 2s, t + s) + u_t(x + 2s, t + s) = x + 2s$.

$$\text{Also, } u(x, t) - g(x + 2t) = u(x, t) - u(x + 2t, 0) = z(0) - z(-t) = \int_{-t}^0 \frac{d}{ds}z(s)ds = \int_0^t (x + 2(s - t))ds.$$

$$\text{Therefore, } u(x, t) = g(x + 2t) + \int_0^t (x + 2(s - t))ds = g(x + 2t) + xt + t^2 - 2t^2 = g(x + 2t) + xt - t^2.$$

Problem 2:

Consider $u_t - 2u_x = u$ for $x \in \mathbb{R}$, $t > 0$, with $u(x, 0) = g(x)$.

Fix $x \in \mathbb{R}$, $t > 0$. Define $z(s) = u(x + 2s, t + s)$. Then $\frac{d}{ds}z(s) = 2u_x(x + 2s, t + s) + u_t(x + 2s, t + s) = u(x + 2s, t + s) = z(s)$. That is, $z(s) = \frac{d}{ds}z(s)$, so $z(s) = Ce^s$ for some $C \in \mathbb{R}$ (this is elementary differential equations). Because $z(-t) = u(x - 2t, 0) = g(x - 2t)$, we determine that $z(s) = g(x - 2t)e^t e^s$.

$$\text{Also, } u(x, t) - g(x - 2t) = u(x, t) - u(x + 2t, 0) = z(0) - z(-t) = g(x - 2t)e^t - g(x - 2t).$$

$$\text{So } u(x, t) = g(x - 2t)e^t.$$

Problem 3:

Consider $u_t - 2u_x = u^2$ for $x \in \mathbb{R}$, $t > 0$, with $u(x, 0) = g(x)$.

Fix $x \in \mathbb{R}$, $t > 0$. Define $z(s) = u(x + 2s, t + s)$. Then $\frac{d}{ds}z(s) = 2u_x(x + 2s, t + s) + u_t(x + 2s, t + s) = (u(x + 2s, t + s))^2 = z(s)^2$. That is, $z(s)^2 = \frac{d}{ds}z(s)$, so $z(s) = \frac{-1}{s+C}$ for some $C \in \mathbb{R}$ (this is elementary differential equations). Because $z(-t) = u(x - 2t, 0) = g(x - 2t)$, we determine that $C = \frac{-1}{g(x - 2t)} - t$ so that $z(s) = \frac{-1}{s - t + \frac{-1}{g(x - 2t)}}$.

$$\text{Also, } u(x, t) - g(x - 2t) = z(0) - z(-t) = u(x, t) - u(x + 2t, 0) = z(0) - z(-t) = \frac{-1}{-t + \frac{-1}{g(x - 2t)}} - \frac{-1}{-2t + \frac{-1}{g(x - 2t)}}.$$

$$\text{By simplifying, } u(x, t) = g(x - 2t) + \frac{-1}{-t + \frac{-1}{g(x - 2t)}} - \frac{-1}{-2t + \frac{-1}{g(x - 2t)}} = g(x - 2t) +$$

$$\frac{t}{2t^2 + 3\frac{t}{g(x-2t)} + \frac{1}{g(x-2t)^2}} = g(x-2t) + \frac{tg(x-2t)^2}{2t^2g(x-2t)^2 + 3tg(x-2t) + 1}.$$