



## ПАМЯТКА

### Надевание и снятие стерильных перчаток\_010 М

**Нормативная база:**

1.МР 3.5.1.0113-16. «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».

**Цель:** для профилактики профессионального заражения; профилактики передачи инфекции от пациента к пациенту, возникновения ИСМП.

**Кто должен выполнять:**

Медицинская сестра

**Функциональное назначение:** профилактическое

**Показания:** выполнение асептических процедур

**ВИДЫ СТЕРИЛЬНЫХ ПЕРЧАТОК:**

- перчатки латексные хирургические
- перчатки сверхтонкие особо чувствительные, микротекстурированные
- перчатки гинекологические
- перчатки хирургические, стойкие к натяжению и проколам, химикатам и спиртам
- перчатки хирургические, «кольчужные»
- перчатки с индикацией прокола и другие.

Перчатки необходимо надевать во всех случаях, когда возможен контакт с кровью или другими биологическими субстратами, потенциально или явно загрязненными: микроорганизмами, слизистыми оболочками, поврежденной кожей.


**Не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте (для ухода) с двумя и более пациентами, при переходе одного пациента к другому или от загрязненного микроорганизмами участка тела – к чистому.**

### Оснащение:

1. перчатки стерильные в упаковке
2. диспенсер с одноразовым полотенцем
3. дозатор с жидким мылом
4. дозатор с антисептиком.

### Выполнение процедуры

1. Откройте внешнюю упаковку перчаток перед тем, как начать обработку рук.
2. Разверните упаковку и приступайте к гигиенической обработке рук.
3. Проведите гигиеническую обработку рук.
4. Дождитесь высыхания антисептика. Надевать стерильные перчатки можно только на сухие люди.
5. Отвернуть край 1-й перчатки наружу, держа за внутреннюю часть перчатки. Держа перчатку большим и указательным пальцем одной рукой за отворот манжеты изнутри, собрать пальцы второй руки вместе, ввести руку в перчатку.
6. Разомкнуть пальцы и натянуть перчатку на руку. Расправить край перчатки.
7. Также надеть 2-ю перчатку.
8. Руки в стерильных перчатках следует держать согнутыми в локтевых суставах и приподнятыми вверх на уровне выше пояса.



## Снятие стерильных перчаток:

