



ПАМЯТКА
Генеральная уборка помещения
при помощи дезинфицирующего средства «ИНДИБАК СОФТ»_003

Нормативная база:

1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
2. Инструкция по применению дезинфицирующего средства «ИНДИБАК СОФТ».

Цель: снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, путем надлежащего проведения текущей уборки помещений

Кто должен выполнять:

Сиделка, санитарка

Оснащение:

1. Уборочная тележка
2. Мопы с соответствующей цветной кодировкой
3. Перчатки одноразовые
4. Маска одноразовая
5. Одноразовый халат для уборки
6. Емкость 1 л и 10 л
7. Мерная емкость на 10 мл и 100 мл
8. Дезинфицирующее средство «ИНДИБАК СОФТ»
9. Дезинфицирующее средство «Миродез –спрей» для труднодоступных мест
10. Моющие средства
11. Одноразовые протирачные салфетки

Приготовление рабочего раствора:

Таблица 1

Концентрация рабочего раствора(по препарату)	Количество средства «ИНДИБАК СОФТ» и воды необходимые для приготовления рабочего раствора объемом:			
	1 л		10 л	
	Средство, мл	Вода, мл	Средство, мл	Вода, мл
0,5	5,0	995,0	50,0	9950,0

Последовательность действий:

1. Вымыть руки, надеть одноразовый халат, маску, перчатки.
2. Приготовить дезинфицирующий раствор «ИНДИБАК СОФТ» (согласно Таблице 1) для мытья поверхностей и мытья пола.
3. Подготовить помещения к уборке
 - Освободите помещение от мебели.
 - Сдвиньте мебель и оборудование от стен к центру помещения для уборки стен и пола за ними.
 - Выключите из сети электрооборудование и приборы.
 - Установите предупредительные знаки.
4. Протереть одноразовыми протирающими салфетками, смоченными в дезинфицирующем средстве с моющим свойством стены. Меняйте моющую сторону салфетки на чистую по мере ее загрязнения на новую.
5. Приготовленным раствором для мытья поверхностей обработать подоконники, индивидуальные столики, прикроватные осветительные приборы, оборудование, тумбочки, спинки кроватей и ручки дверей.\
6. Собрать мусор в пакет и вынести из помещения.
7. Вымыть раковину, душевую, санузел (если они имеются в комнате).
8. Труднодоступные места обработать дезинфицирующим средством «Мирорез – спрей» с экспозицией 30 секунд.
9. Вымыть пол.
10. Включить бактерицидный облучатель, согласно инструкции.
11. Проветрить помещение в течение 20 минут.
12. Снять перчатки, маску, халат.
13. Вымыть руки.
14. Сделать запись в журнал учета генеральных уборок.
15. Обработать многоразовый уборочный инвентарь.

Важно:

Генеральная уборка комнат и помещений проводится 1 раз в месяц!

Генеральная уборка кабинета для хранения лекарственных препаратов проводится 1 раз в 7 дней!

- средство не требует смывания;
- срок годности рабочего раствора 1 сутки!
- раствор хранить в емкости с плотно закрывающейся крышкой;
- рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны;
- средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

1. Средство мало опасно, но при применении способом орошения и при неосторожном приготовлении его растворов при несоблюдении мер предосторожности возможны случаи отравления, которые выражаются в явлениях раздражения органов дыхания (сухость, першение в горле, кашель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, отечность).
2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 мин., затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. При необходимости обратиться к врачу.
3. При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды.
4. При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой; в последующем назначить полоскание или тепло- влажные ингаляции 2% раствором гидрокарбоната натрия; при нарушении носового дыхания рекомендуется использовать 2% раствор эфедрина; при поражении гортани – режим молчания и питье теплого молока с содой, боржоми. При необходимости обратиться к врачу.
5. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.