



ПАМЯТКА

Текущая уборка помещения при помощи дезинфицирующего средства «Дезитабс»_001

Нормативная база:

1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
2. Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Дезитабс».

Цель: снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, путем надлежащего проведения текущей уборки помещений

Кто должен выполнять:

Сиделка, санитарка

Оснащение:

1. Уборочная тележка
2. Мопы с соответствующей цветной кодировкой
3. Перчатки одноразовые
4. Маска одноразовая
5. Одноразовый халат для уборки
6. Емкость 10 л или 20 л – 2 шт
7. Дезинфицирующее средство «Дезитабс» в таблетках
8. Дезинфицирующее средство «Миродез –спрей» для труднодоступных мест
9. Моющие средства
10. Одноразовые протирачные салфетки.

Приготовление рабочего раствора:

Таблица 1

Концентрация рабочего раствора по активному хлору %	Количество таблеток (шт) необходимых для приготовления рабочего раствора объемом:		
	1 л	10 л	20 л
<i>Таблетки массой в среднем 1,0 г и содержанием хлора 0,45 г</i>			
0,015	-	3	7
0,03	-	7	13
0,1	2	22	44

Последовательность действий:

1. Вымыть руки, надеть одноразовый халат, маску, перчатки.
2. Приготовить дезинфицирующий раствор «Дезитабс» (согласно Таблице 1) для мытья поверхностей и мытья пола.
3. Приготовленным раствором для мытья поверхностей обработать подоконники, индивидуальные столики, прикроватные осветительные приборы, оборудование, тумбочки, спинки кроватей и ручки дверей.
4. Собрать мусор в пакет и вынести из помещения.
5. Вымыть раковину, душевую, санузел (если они имеются в комнате).
6. Труднодоступные места обработать дезинфицирующим средством «Мирорез – спрей» с экспозицией 30 секунд.
7. Вымыть пол.
8. Включить бактерицидный облучатель, согласно инструкции.
9. Проветрить помещение в течение 20 минут.
10. Снять перчатки, маску, халат
11. Вымыть руки.
12. Сделать запись в лист контроля санитарного состояния помещения.
13. Обработать многоразовый уборочный инвентарь.

Важно: срок годности рабочего раствора 1 сутки!

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

1. При несоблюдении мер предосторожности и в аварийных ситуациях возможны случаи острого отравления средством, которое проявляется в раздражении слизистых оболочек глаз (слезотечение, резь в глазах), органов дыхания (насморк, першение в горле, носу, кашель) и кожных покровов (гиперемия, отечность).
2. При появлении первых признаков острого отравления средством пострадавшего следует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, дать теплое питье, молоко с пищевой содой (1 чайная ложка соды на стакан молока), провести ингаляцию 2% водно-содовым раствором (1 чайная ложка пищевой соды на стакан воды). При необходимости следует обратиться к врачу.
3. При случайном попадании средства на кожу необходимо обильно промыть пораженное место водой с мылом. Кожу смазать смягчающим кремом.
4. При случайном попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их под струей воды в течение нескольких минут (не менее 10 – 15 минут) и закапать (20 – 30)% раствор сульфацила натрия. Обратиться к врачу.
5. При попадании средства или его растворов в рот или в желудок, тщательно промыть рот водой, выпить несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля или другого адсорбента. Желудок не промывать! Обратиться к врачу.