

	Стандартная операционная процедура		№ 001
	Текущая уборка помещения при помощи дезинфицирующего средства «АЛМАДЕЗ»		
ДЕЙСТВУЕТ с “01.01.2025 г.”	Заменяет/ вводится впервые	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:
Утвердил: <div style="text-align: right;">Генеральный директор _____ /А.В. Попов /</div>			

Нормативная база:

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- Инструкция по применению дезинфицирующего средства «АЛМАДЕЗ».

Цель: снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, путем надлежащего проведения текущей уборки помещений

Кто должен выполнять:

- Специалист по уходу, санитарка

Оснащение:

- Уборочная тележка;
- Мопы с соответствующей цветной кодировкой;
- Перчатки одноразовые;
- Маска одноразовая;
- Одноразовый халат для уборки;
- Емкость 10 л или 20 л – 2шт;
- Дезинфицирующее средство «АЛМАДЕЗ» в таблетках;
- Моющие средства;
- Одноразовые протирающие салфетки.

Приготовление рабочего раствора:

Таблица 1

Концентрация рабочего раствора по активному хлору %	Количество таблеток (шт) необходимых для приготовления рабочего раствора объемом:		
	1 л	10 л	20 л
<i>Таблетки массой в среднем 3,4 г и содержанием хлора 1,5 -0,2 г</i>			
0,030 %	-	2	4

Алгоритм:

1. Вымыть руки, надеть одноразовый халат, маску, перчатки.
2. Приготовить дезинфицирующий раствор «АЛМАДЕЗ» (согласно Таблице 1) для мытья поверхностей и мытья пола;
3. Приготовленным раствором для мытья поверхностей обработать подоконники, индивидуальные столики, прикроватные осветительные приборы, оборудование, тумбочки, спинки кроватей и ручки дверей;
4. Собрать мусор в пакет и вынести из помещения;
5. Вымыть раковину, душевую, санузел (если они имеются в комнате)
6. Вымыть пол;
7. Включить бактерицидный облучатель, согласно инструкции;
8. Проветрить помещение в течение 20 минут;
9. Снять перчатки, маску, халат;
10. Вымыть руки;
11. Сделать запись в лист контроля санитарного состояния помещения.
12. Обработать многоразовый уборочный инвентарь.

Важно: срок годности рабочего раствора 1 сутки!

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

1. При несоблюдении мер предосторожности и в аварийных ситуациях возможны случаи острого отравления средством, которое проявляется в раздражении слизистых оболочек глаз (слезотечение, резь в глазах), органов дыхания (насморк, першение в горле, носу, кашель) и кожных покровов (гиперемия, отечность).
2. При появлении первых признаков острого отравления средством пострадавшего следует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, дать теплое питье, молоко с питьевой содой (1 чайная ложка соды на стакан молока), провести ингаляцию 2% водно-содовым раствором (1 чайная ложка пищевой соды на стакан воды). При необходимости следует обратиться к врачу.

3. При случайном попадании средства на кожу необходимо обильно промыть пораженное место водой с мылом. Кожу смазать смягчающим кремом.
4. При случайном попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их под струей воды в течение нескольких минут (не менее 10 – 15 минут) и закапать (20 – 30)% раствор сульфацила натрия. Обратиться к врачу.
5. При попадании средства или его растворов в рот или в желудок, тщательно промыть рот водой, выпить несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля или другого адсорбента. Желудок не промывать! Обратиться к врачу.

[illegible]

