



**ПАМЯТКА**  
**Генеральная уборка помещения**  
**при помощи дезинфицирующего средства «Дезитабс»\_004**

**Нормативная база:**

1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
2. Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Дезитабс».

**Цель:** генеральная уборка осуществляется с целью удаления загрязнений и снижения микробной обсемененности в помещениях организаций.

**Кто должен выполнять:**

Сиделка, санитарка

**Оснащение:**

1. Уборочная тележка
2. Мопы с соответствующей цветной кодировкой
3. Перчатки одноразовые
4. Маска одноразовая
5. Одноразовый халат для уборки
6. Емкость 10 л или 20 л – 2 шт
7. Дезинфицирующее средство «Дезитабс» в таблетках
8. Дезинфицирующее средство «Миродез –спрей» для труднодоступных мест
9. Моющие средства
10. Одноразовые протирачные салфетки.

## Приготовление рабочего раствора:

Таблица 1

Концентрация рабочего раствора по активному хлору %	Количество таблеток (шт) необходимых для приготовления рабочего раствора объемом:		
	1 л	10 л	20 л
<i>Таблетки массой в среднем 1,0 г и содержанием хлора 0,45 г</i>			
0,03	-	7	13
0,1	2	22	44

## Последовательность действий:

1. Вымыть руки, надеть одноразовый халат, маску, перчатки.
2. Приготовить дезинфицирующий раствор «ДЕЗИТАБС» (согласно Таблице 1) для мытья поверхностей и мытья пола,
3. Подготовить помещения к уборке
  - Освободите помещение от мебели.
  - Сдвиньте мебель и оборудование от стен к центру помещения для уборки стен и пола за ними.
  - Выключите из сети электрооборудование и приборы.
  - Установите предупредительные знаки.
4. Протереть одноразовыми протирающими салфетками, смоченными в дезинфицирующем средстве с моющим свойством стены. Меняйте моющую сторону салфетки на чистую по мере ее загрязнения на новую.
5. Приготовленным раствором для мытья поверхностей обработать подоконники, индивидуальные столики, прикроватные осветительные приборы, оборудование, тумбочки, спинки кроватей и ручки дверей.
6. Собрать мусор в пакет и вынести из помещения.
7. Вымыть раковину, душевую, санузел (если они имеются в комнате).
8. Труднодоступные места обработать дезинфицирующим средством «Миродез – спрей» с экспозицией 30 секунд.
9. Вымыть пол.
10. Включить бактерицидный облучатель, согласно инструкции.
11. Проветрить помещение в течение 20 минут.
12. Снять перчатки, маску, халат.
13. Вымыть руки.
14. Сделать запись в журнал учета генеральных уборок.
15. Обработать многоразовый уборочный инвентарь.

**Важно:** срок годности рабочего раствора 1 сутки!

## **МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ**

1. При несоблюдении мер предосторожности и в аварийных ситуациях возможны случаи острого отравления средством, которое проявляется в раздражении слизистых оболочек глаз (слезотечение, резь в глазах), органов дыхания (насморк, першение в горле, носу, кашель) и кожных покровов (гиперемия, отечность).
2. При появлении первых признаков острого отравления средством пострадавшего следует вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, дать теплое питье, молоко с пищевой содой (1 чайная ложка соды на стакан молока), провести ингаляцию 2% водно-содовым раствором (1 чайная ложка пищевой соды на стакан воды). При необходимости следует обратиться к врачу.
3. При случайном попадании средства на кожу необходимо обильно промыть пораженное место водой с мылом. Кожу смазать смягчающим кремом.
4. При случайном попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их под струей воды в течение нескольких минут (не менее 10 – 15 минут) и закапать (20 – 30)% раствор сульфацила натрия. Обратиться к врачу.
5. При попадании средства или его растворов в рот или в желудок, тщательно промыть рот водой, выпить несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля или другого адсорбента. Желудок не промывать! Обратиться к врачу.