

	Стандартная операционная процедура		№ 008
	Надевание и снятие стерильных перчаток		
ДЕЙСТВУЕТ с “01.01.2025 г.”	Заменяет/ вводится впервые	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:
Генеральный директор _____			Утвердил: /А.В. Попов /

Нормативная база:

1.МР 3.5.1.0113-16. «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».

Цель: для профилактики профессионального заражения; профилактики передачи инфекции от пациента к пациенту, возникновения ИСМП.

Кто должен выполнять:

1. медицинская сестра.

Функциональное назначение: профилактическое.

Показания: выполнение асептических процедур.

ВИДЫ СТЕРИЛЬНЫХ ПЕРЧАТОК:

перчатки латексные хирургические.

перчатки сверхтонкие особо чувствительные, микротекстурированные.

перчатки гинекологические.

перчатки хирургические, стойкие к натяжению и проколам, химикатам и спиртам.

перчатки хирургические, «кольчужные».

перчатки с индикацией прокола и другие.

Перчатки необходимо надевать во всех случаях, когда возможен контакт с кровью или другими биологическими субстратами, потенциально или явно контаминированными: микроорганизмами, слизистыми оболочками, поврежденной кожей.


Не допускается использование одной и той же пары перчаток при контакте (для ухода) с двумя и более пациентами, при переходе одного пациента к другому или от контаминированного микроорганизмами участка тела – к чистому.

Оснащение:


1. перчатки стерильные в упаковке;
2. диспенсер с одноразовым полотенцем;
3. дозатор с жидким мылом;
4. дозатор с антисептиком.

Выполнение процедуры

1. Откройте внешнюю упаковку перчаток перед тем, как начать обработку рук.
2. Разверните упаковку и приступайте к гигиенической обработке рук.
3. Проведите гигиеническую обработку рук.
4. Дождитесь высыхания антисептика. Надевать стерильные перчатки можно только на сухие люди.
5. Отвернуть край 1-й перчатки наружу, держа за внутреннюю часть перчатки. Держа перчатку большим и указательным пальцем одной рукой за отворот манжеты изнутри, собрать пальцы второй руки вместе, ввести руку в перчатку.
6. Разомкнуть пальцы и натянуть перчатку на руку. Расправить край перчатки.
7. Также надеть 2-ю перчатку.
8. Руки в стерильных перчатках следует держать согнутыми в локтевых суставах и приподнятыми вверх на уровне выше пояса.



Снятие стерильных перчаток:



Ознакомлен

Дата	ФИО	Должность	Подпись