

Sprawozdanie
Metody numeryczne 2
Temat 3, Zadanie nr 1

Mateusz Śliwakowski, F4

20/11/2018

1 Treść zadania

Obliczanie całek $\iint_D f(x, y) dx dy$, gdzie $D = [a, b] \times [c, d]$ złożonymi kwadraturami trapezów ze względu na każdą zmienną.

2 Opis metody

Zacniemy od rozpisania ogólnego przypadku liczenia całki na prostokącie, a następnie zastosujemy kwadraturę trapezów ze względu na każdą zmienną.

Mamy dane: $f(x, y)$, $D = [a, b] \times [c, d]$, gdzie $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ oraz $n, m \in \mathbb{R}$ - ilość podziałów wzdłuż osi odpowiednio OX , OY . Zdefiniujmy podziały:

$$x_i = a + h_1 i, \text{ gdzie } h_1 = \frac{b-a}{n}, i = 0, \dots, n$$

$$y_j = c + h_2 j, \text{ gdzie } h_2 = \frac{d-c}{m}, j = 0, \dots, m$$

Założmy, że S_1 i S_2 są danymi kwadraturami dla funkcji jednej zmiennej g .

$$S_1(g) = \sum_{i=0}^n A_i g(x_i) = \int_a^b g(x) dx$$

$$S_2(g) = \sum_{j=0}^m B_j g(y_j) = \int_c^d g(y) dy$$

Zastosujemy S_1 do funkcji $f = f(x, y)$, ze względu na x .

$$S_1(f)(y) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i, y)$$

a następnie S_2 , ze względu na y

$$S_2(S_1(f)) = \sum_{j=0}^m B_j (\sum_{i=0}^n A_i f(x_i, y_j)) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m \underbrace{A_i B_j}_{C_{ij}} f(x_i, y_j)$$

Kwadratura złożona trapezów ma postać:

$$S_1(g) = \frac{h_1}{2} [g(a) + g(b) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} g(x_i)]$$

Stosując kwadraturę trapezów ze względu na każdą ze zmiennych otrzymamy macierz współczynników:

$$\{C_{ij}\} = \{A_i B_j\} = \frac{h_1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ \vdots \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{h_2}{2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & \dots & 2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{h_1 h_2}{4} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & \dots & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 4 & \dots & 4 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 4 & 4 & \dots & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & \dots & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

3 Warunki i założenia

1. $f(x, y)$ jest całkowalna na obszarze D .
2. Podany obszar D jest poprawny, tj. $a < b$ oraz $c < d$.
3. Liczba podziałów jest poprawna, tj. $n > 0$ oraz $m > 0$.

4 Implementacja metody

```
function result = trapezeInterpolation(fun, a, b, c, d  
    , n, m)
```

Parametry wejściowe:

- fun - Uchwyt do funkcji dwóch zmiennych, z której ma być policzona całka,
- a, b, c, d - liczby rzeczywiste, definiujące obszar D ,
- n, m - ilość podziałów odpowiednio wzdłuż osi OX i OY .

Parametry wyjściowe:

- $result$ - zadana całka.

Na początku definiujemy szerokości pojedynczych podziałów, oraz wyznaczamy wektor punktów podziału. Obliczenie całki następuje w podwójnej pętli *for* jak w rozdziale *Opis metody*. Jako że macierz C nie ma skomplikowanej postaci, to poszczególne elementy dostajemy przy użyciu pomocniczej funkcji *getCoefficient* przyjmującej indeksy x, y oraz liczbę podziałów wzdłuż osi OX oraz OY .

5 Przykłady i wnioski