แบบประเมินอาการเคลื่อนไหวผิดปกติจากยารักษาโรคจิต

Modified Simpson-Angus Rating Scale (Mod-SAS) สำหรับ Parkinsonism และ EPS อื่นๆ

HN .....ชื่อผู้ป่วย-นามสกุล ..... ☐ OPD ☐ WARD.....

การทดสอบ	คะแนน				
	0	1	2	3	4
1. การเดิน (gait) สังเกตผู้ป่วยเมื่อเดินเข้ามาในห้องตรวจ, ดูท่าทางการเดิน การแกว่งแขน, ลักษณะทั่วไป, การเดินทุกแบบถูกนับเป็นคะแนนรวมสำหรับข้อนี้	☐ปกติ	☐การแกว่งแขนลดลง ขณะที่ผู้ป่วยกำลังเดิน	☐การแกว่งแขนลดลงชัดเจน ร่วมกับมีการเกร็งที่แขนอย่างชัดเจน	☐ท่าเดินแข็งทื่อ ร่วมกับแขนเกร็งค้างอยู่หน้าลำตัว	☐โน้มตัวไปข้างหน้า เดินลากขา ร่วมกับ เดินเด้งไปด้านหลัง
2.การปล่อยให้แขนตกลงข้างลำตัว (arm dropping) ผู้ตรวจยกแขนผู้ป่วยขึ้นสูงระดับไหล่และปล่อยให้แขนตกลงข้างลำตัว ในคนปกติ จะได้ยินเสียงแขนกระแทกกับข้างลำตัวเสียงดังและแขนเด้งกลับ ในผู้ป่วยที่มีอาการ parkinsonism ระดับรุนแรง แขนจะตกลงช้ามาก	☐ ปกติ แขนตกลงมาอย่างอิสระ กระทบกับข้างลำตัวเสียงดังและมีเด้งกลับ	☐แขนตกช้าลง เล็กน้อย ได้ยินเสียงกระทบกับข้างลำตัว นิดหน่อย มีเด้งกลับเล็กน้อย	☐แขนตกช้า ไม่มีการเด้งกลับ	☐แขนตกช้ามาก ไม่มีเสียงกระทบกับลำตัวเลย	☐แขนตกช้าเหมือนผ่านแรงต้าน หรือเหมือนผ่านกาวเหนียวๆ
3.การเกร็งของข้อศอก (elbow rigidity) ให้ผู้ป่วยงอข้อศอกตั้งฉาก และผู้ตรวจข้อมือผู้ป่วยยืดออก (extension) และ งอเข้า (flex) คอยสังเกตและคลำดูกล้ามเนื้อไบเซ็พส์ของผู้ป่วยขณะตรวจ	☐ปกติ	☐มีความแข็งเกร็งและความต้านทานเล็กน้อย	☐มีความแข็งเกร็งและความต้านทานปานกลาง	☐ แข็งเกร็งมากอย่างเห็นได้ชัด และเคลื่อนไหวลำบาก	☐มีการแข็งเกร็งมากที่สุด จนแทบจะเป็นข้อติดแข็ง
4.การเกร็งของข้อมือ (wrist rigidity) จับข้อมือผู้ป่วยไว้ มืออีกข้างจับที่นิ้วมือของผู้ป่วย ขยับข้อมือผู้ป่วยยืดออก (extension) และ งอเข้า (flex) และบิดออกนอก-เข้าใน	☐ปกติ	☐มีความแข็งเกร็งและความต้านทานเล็กน้อย	☐มีความแข็งเกร็งและความต้านทานปานกลาง	☐ แข็งเกร็งมากอย่างเห็นได้ชัด และเคลื่อนไหวลำบาก	☐มีการแข็งเกร็งมากที่สุด จนแทบจะเป็นข้อติดแข็ง
5.การสั่น (tremor) สังเกตผู้ป่วยขณะเดินเข้ามาในห้องตรวจ พูดคุยโต้ตอบ (การสั่นขณะพัก) และสังเกตการสั่นอีกครั้งเมื่อขอให้ผู้ป่วยเหยียดแขนตรงระดับไหล่ทั้งสองข้าง นิ้วมือแยกกัน	☐ปกติ	☐นิ้วมือสั่นเล็กน้อย มองเห็นและสัมผัสได้อย่างชัดเจน	☐มีการสั่นของมือหรือแขนเป็นพักๆ	☐มีการสั่นตลอดเวลาของแขน หรือ ขา อย่างน้อย 1 อย่าง	☐มีการสั่นทั้งตัวรวมทั้งศีรษะ
6.น้ำลายไหล (salivation) สังเกตผู้ป่วยขณะพูดคุย จากนั้นขอให้ผู้ป่วยอ้าปาก และกระดกลิ้นขึ้น ให้คะแนนดังหัวข้อต่อไปนี้	☐ปกติ	☐มีน้ำลายเป็นแอ่งอยู่ในปาก ถ้าผู้ป่วยอ้าปากและกระดกลิ้นขึ้นไม่มีพูดลำบาก	☐แสดงให้เห็นว่ามีน้ำลายมากและอาจทำให้พูดได้ลำบากบางครั้ง	☐พูดได้ลำบาก เพราะมีน้ำลายอยู่จำนวนมาก	☐น้ำลายไหลยืดอย่างชัดเจน

การแปลผล

แปลผลตามข้อที่มีคะแนนมากที่สุดเพียงข้อเดียว **ผู้ประเมิน/วันที่ประเมิน ..... (...../...../.....)**

คะแนน	ระดับความรุนแรง	แนวทางปฏิบัติ
1	Mild	- สังเกตอาการต่ออีก 1-2 สัปดาห์ หากมีอาการเพิ่มขึ้น ควร consult แพทย์ - กรณีผู้ป่วย/ญาติมีความกังวล หรือรู้สึกทุกข์ทรมาน ไม่ต้องรอสังเกตอาการ สามารถ consult แพทย์ เพื่อปรับแผนการรักษาได้
2	Moderate	- ควร consult แพทย์เพื่อปรับแผนการรักษา
3-4	Severe	- ควร consult แพทย์เพื่อปรับแผนการรักษาทันที