

	Mouvement circulaire car trajectoire en cercle Mouvement accéléré car vitesse augmente
	Mouvement curviligne car trajectoire courbe Mouvement accéléré car vitesse augmente
	Mouvement curviligne car trajectoire courbe Mouvement uniforme car vitesse constante
	Mouvement curviligne car trajectoire courbe Mouvement décéléré car vitesse diminue

4.Télémétrie : mesure de distances avec les ondes

a. Ondes sonores : Les sonars sont des dispositifs très utilisés dans la marine pour mesurer des distances à l'aide des ondes ultrasonores. (Dans l'eau v_{son} = 1500 m/s)

Exemple :

Le temps mesuré **pour un aller-retour** de l'ultrason est égal à 0,2s. La profondeur du banc de poissons est donc :



$$d = \frac{v \times t}{2}$$

$$d = \frac{1500 \times 0,2}{2}$$

$$d = 150 \text{ m}$$

b. Ondes lumineuses : Les lasers sont des dispositifs très utilisés en astronomie pour mesurer la distance Terre-Lune. La lumière se reflète sur des miroirs installés sur la Lune.

(Dans l'air ou le vide $v_{lumière}$ = 300 000 km/s)

Exemple : La distance Terre-Lune est :

$$d = \frac{v \times t}{2} = \frac{300\,000 \times 2,56}{2} = 384\,000 \text{ km}$$

