

Devoir 7 IFT 3655 A23

Cíntia Dalila Soares

20 nov 2023

Question 1a

Montrez que $E_g[X_{is}] = p$.

On a que :

$$\begin{aligned} E_g[X_{is}] &= E_g[(1 - F_3(b - X_2 - X_1))L] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - F_3(b - x_2 - x_1)) \frac{\pi_1(x_1)}{g_1(x_1)} \frac{\pi_2(x_2)}{g_2(x_2)} g_1(x_1) g_2(x_2) dx_1 dx_2 \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - F_3(b - x_2 - x_1)) \pi_1(x_1) \pi_2(x_2) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

si $g_i(x)$ sont non nulles. On a également que :

$$\begin{aligned} p &= P[Y > b] \\ &= P[X_3 > b - X_1 - X_2] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - F_3(b - x_2 - x_1)) \pi_1(x_1) \pi_2(x_2) dx_1 dx_2 \end{aligned}$$

Question 1b

Réponse.

On a ici que les densités sont données par :

$$g_j(x) = 1/5e^{-1/5x}$$

pour $j = 1, 2$ et que

$$\pi_j(x) = 1/2e^{-1/2x}$$

pour $j = 1, 2, 3$. Alors,

$$\frac{\pi_j(x_j)}{g_j(x_j)} = \frac{5}{2}e^{-3/10x}$$

pour $j = 1, 2$ et pourtant :

$$\begin{aligned} L &= \frac{\pi_1(X_1)}{g_1(X_1)} \frac{\pi_2(X_2)}{g_2(X_2)} \\ &= \frac{5}{2}e^{-3/10X_1} \frac{5}{2}e^{-3/10X_2} \\ &= \frac{25}{4}e^{-3/10(X_1+X_2)} \end{aligned}$$

Et on a également que

$$F_3(b - X_1 - X_2) = 1 - e^{-1/2(b-X_1-X_2)}.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} X_{is} &= (1 - F_3(b - X_1 - X_2))L \\ &= e^{-1/2(b-X_1-X_2)} \frac{25}{4}e^{-3/10(X_1+X_2)} \\ &= \frac{25}{4}e^{-1/2b+1/5(X_1+X_2)} \\ &= \frac{25}{4}e^{-15/2+1/5(X_1+X_2)} \end{aligned}$$

J'ai utilisé la bibliothèque suggérée et j'ai obtenu le rapport suivant :

Total CPU time 0:0:0.5

```
REPORT on Tally stat. collector ==> Statistic
num. obs.      min      max      average      variance      standard dev.
    1000      3.5E-3    0.150    9.4E-3      9.7E-5      9.8E-3
95.0\% conf. interval for the mean (Student approx.): ( 8.8E-3, 0.010 )
}
```

J'ai obtenu $p = 9.4E - 3$ avec l'intervalle de confiance $(8.8E - 3, 0.010)$.

Question 2a

Réponse. Avec MC, j'obtiens que pour tous les valeurs générés, la valeur du déplacement est inférieur à 5, alors l'estimateur donne toujours égale à 1. Je pense qu'il y a un erreur dans le code car avec CMC, j'obtiens une moyenne plus proche de 0 que de 1.

Avec CMC, j'ai obtenu $\mu = 0.029$ avec l'intervalle de confiance de (0.019, 0.039).

Voici les rapports :

Total CPU time 0:0:0.5

REPORT on Tally stat. collector ==> Statistic MC

num. obs.	min	max	average	variance	standard dev.
1000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000
95.0% conf. interval for the mean (Student approx.): (1.000, 1.000)					

Total CPU time 0:0:0.0

REPORT on Tally stat. collector ==> Statistic CMC

num. obs.	min	max	average	variance	standard dev.
1000	0.000	1.000	0.029	0.027	0.165
95.0% conf. interval for the mean (Student approx.): (0.019, 0.039)					

Question 2b

Réponse.

On veut estimer la dérivée de μ par rapport à σ_3 avec les différences finies en utilisant des valeurs aléatoires communes, avec $\delta = 1$.

On simule à $\sigma_3 = 100$ pour obtenir un estimateur X_1 . Ensuite, on simule à $\sigma_3 = 101$ pour obtenir un estimateur X_2 .

Et on estime la dérivée $\mu'(\sigma_3)$ par

$$\frac{\Delta}{\delta} = \frac{X_2 - X_1}{\delta}$$

Dans tous les cas, j'ai obtenu X_2 en utilisant $\sigma_3 = 101$ et X_1 avec $\sigma_3 = 100$. Pour les cas avec les variables aléatoires indépendantes, j'ai utilisé deux `randomstream` et pour les cas des variables aléatoires communes seulement un.

1. Différences finies avec MC et des variables aléatoires indépendantes (IRN), avec $\delta = 1$;

Total CPU time 0:0:0.5

```
REPORT on Tally stat. collector ==> Statistic Diff finies MC v. a. ind.
num. obs.   min      max      average   variance   standard dev.
    1000    1.000    1.000    1.000    0.000    0.000
95.0% conf. interval for the mean (Student approx.): ( 1.000, 1.000 )
```

Avec MC, j'obtiens que pour tous les valeurs générés, la valeur du déplacement est inférieur à 5, alors l'estimateur donne toujours égale à 1. Je pense qu'il y a un erreur dans le code.

2. Différences finies avec CMC et des variables aléatoires indépendantes (IRN), avec $\delta = 1$;

Total CPU time 0:0:0.0

```
REPORT on Tally stat. collector ==> Statistic Diff finies CMC v. a. ind.
num. obs.   min      max      average   variance   standard dev.
    1000    -0.199    0.026    -3.4E-4    6.7E-5    8.2E-3
95.0% conf. interval for the mean (Student approx.): (-8.4E-4, 1.7E-4)
```

Dans ce cas, j'ai obtenu un intervalle de confiance de (-8.4E-4, 1.7E-4) et une variance de 6.7E-5. C'est le meilleur résultat que j'ai obtenu. Ce qui n'est pas attendu, car avec les variables aléatoires communes, je devrais obtenir une variance plus petite.

3. Différences finies avec CMC et des variables aléatoires communes (CRN), avec $\delta = 1$;

Total CPU time 0:0:0.0

REPORT on Tally stat. collector \implies Statistic Diff finies CMC v. a. communes

num. obs.	min	max	average	variance	standard dev.
1000	-0.264	1.9E-5	-1.0E-3	1.3E-4	0.011

95.0% conf. interval for the mean (Student approx.): (-1.7E-3, -3.3E-4)

Dans ce cas, j'ai obtenu un intervalle de confiance de (-1.7E-3, -3.3E-4)
et une variance de 1.3E-4. C'est un résultat moins bon qu'avec des variables
aléatoire indépendantes.