

Nome: _____ N.USP: _____

1) Assinale a alternativa **VERDADEIRO** ou **FALSO**:

- (V) O cingulo escapular, formado pela escápula e clavícula, conecta a parte livre do membro superior ao esqueleto axial, especificamente, com o esterno.
- (V) O cingulo pélvico, formado pelo quadril, conecta a parte livre do membro inferior ao esqueleto axial, especificamente, com o sacro.
- (V) As articulações sinoviais do tipo esferoideas ocorrem somente nas regiões de conexão dos cingulos escapular e pélvico as porções livres do esqueleto apendicular.
- (F) A pelve óssea é sinônimo de cingulo pélvico.
- (V) Todos os ossos envolvidos nos cingulos pélvico e escapular são formados por ossificação endocondral e originários do mesoderma.

2) Quais tipos de articulações podem sofrer sinostose?

- (A) Fibrosas, cartilagíneas e sinoviais.
- (B) Cartilagíneas (sincondroses e sínfises).
- (C) Sinoviais.
- (D) Fibrosas (suturas) e cartilagíneas primárias (sincondroses).
- (E) Cartilagíneas secundárias (sínfises) e fibrosas (sindesmose e membrana interóssea).

1 – V/F pq há variação em algumas escapulas

- (A) O músculo tem fascículos em diagonal em relação a linha mediana e está superior ao seu correspondente inferior.
- (B) O músculo tem fascículos transversos em relação a linha mediana e está superior ao seu correspondente inferior.
- (C) O músculo tem fascículos retos em relação a linha mediana e está anterior ao seu correspondente posterior.
- (D) O músculo tem fascículos em diagonal em relação a linha mediana e está lateral ao seu correspondente medial.
- (E) O músculo tem a ação de elevação de uma estrutura.

4) A fáscia muscular tem por função, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Proteção dos tendões.
- (B) Revestimento externo dos músculos esqueléticos e compartimentalização de grupos musculares (septos intermusculares).
- (C) Fixação dos músculos aos ossos.
- (D) Revestimentos externo dos ossos.
- (E) Proteção das articulações e tendões por ser formada de membrana sinovial.

5) Correlacione: origem embrionária – tipo de ossificação – região. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

(A) Células da crista neural – ossificação intramembranosa – esqueleto axial

(B) Células da crista neural – ossificação endocondral – esqueleto axial

(C) Mesoderma – ossificação endocondral – esqueleto apendicular

(D) Mesoderma – ossificação endocondral – esqueleto axial

(E) Mesoderma – ossificação intramembranosa – esqueleto apendicular

6) Quais estruturas acessórias estão dentro da cavidade sinovial? Assinale a alternativa **CORRETA**:

(A) Bursas sinoviais

(B) Meniscos, discos articulares, lábios articulares e ligamentos

(C) Tendões musculares, retináculos e bainhas sinoviais

(D) Ligamentos

(E) Membrana sinovial, líquido sinovial e cartilagem articular

7) Assinale a alternativa **VERDADEIRO** ou **FALSO**:

(V) A inserção é o local onde o tendão se fixa na peça óssea móvel

(V) Os músculos se fixam aos ossos através dos tendões e perióstio

(V) Os músculos classificados, quanto ao número de tendões na origem, são chamados de bíceps, tríceps ou quadríceps

(V) Os músculos classificados, quanto ao número de tendões na inserção, são chamados de bicaudados, tricaudados e policaudados

(V) Os músculos classificados, quanto ao número de ventres musculares

Fernanda Ortis
Dúvida sobre como foi formulado, deu a entender que seria ligado aos dois

Fernanda Ortis
Não lembram de ter falado dos tricaudados

795 palavras | Português (Brasil) | Foco | 170%

5- erro ossificação intramembranosa, não há essa ossificação no esqueleto apendicular

- 7) Assinale a alternativa **VERDADEIRO** ou **FALSO**:
- (V) A inserção é o local onde o tendão se fixa na peça óssea móvel
- (V) Os músculos se fixam aos ossos através dos tendões e perióstio
- (V) Os músculos classificados, quanto ao número de tendões na origem, são chamados de bíceps, tríceps ou quadríceps
- (V) Os músculos classificados, quanto ao número de tendões na inserção, são chamados de bicaudados, tricaudados e policaudados
- (V) Os músculos classificados, quanto ao número de ventres musculares separados pelos tendões, são chamados de digástrico e poligástrico
- 8) Correlacione: tipo de articulação sinovial – quantidade de eixos – movimento. Assinale a alternativa **INCORRETA**:
- (A) elipsoidea – biaxial - flexão/extensão e adução/abdução
- (B) trocoidea – uniaxial – rotação medial/rotação lateral
- (C) selar – biaxial - flexão/extensão e adução/abdução
- (D) esferoidea – uniaxial - rotação medial/rotação lateral
- (E) gínglimo – uniaxial – flexão/extensão
- 9) Assinale a alternativa **VERDADEIRO** ou **FALSO**:
- (V) A musculatura lisa está presente em vasos sanguíneos, pele, olho, sistema respiratório e vísceras ocas
- (F) A peristalse é um movimento que ocorre no interior de órgãos ocos revestidos por musculatura estriada esquelética
- (F) A musculatura lisa se fixa aos ossos através de aponeuroses

7 – V – mais correto tendões ao perióstio

9) Assinale a alternativa **VERDADEIRO** ou **FALSO**:

- (V) A musculatura lisa está presente em vasos sanguíneos, pele, olho, sistema respiratório e vísceras ocas
- (F) A peristalse é um movimento que ocorre no interior de órgãos ocos revestidos por musculatura estriada esquelética
- (F) A musculatura lisa se fixa aos ossos através de aponeuroses
- (F) Os esfincters são estruturas formadas por músculo estriado esquelético
- (V) A musculatura lisa é involuntária e controlada pelo sistema nervoso e endócrino

10) Correlacione: morfologia óssea – arquitetura óssea predominante. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Ossos planos – 2 camadas finas de osso cortical com osso trabecular discreto
- (B) Ossos curtos – 2 camadas finas de osso cortical com osso trabecular proeminente
- (C) Ossos planos – 2 camadas finas de osso cortical com osso trabecular proeminente (díploe)
- (D) Ossos irregulares – 2 camadas finas de osso cortical com quantidades variáveis de osso trabecular
- (E) Ossos longos – osso cortical trabecular proeminente na diáfise

11) Correlacione: classificação anatômica – tipo – classificação funcional das articulações. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) Cartilágnea – sincondrose – sinartrose
- (B) Sinovial – plana – sinartrose
- (C) Cartilágnea – sínfise – anfiartrose
- (D) Fibrosa – sutura – anfiartrose (sinartrose?)
- (E) Fibrosa – sindesmose – sinartrose

10 – pouco trabecular, as vezes nem tem na diáfise

11 – B incorreta, D depende da idade (antes dos 25 anos anfiartrose, depois sinartrose)

12) Assinale a alternativa **INCORRETA**:

- (A) As alavancas anatômicas do tipo 2 têm vantagem mecânica e os músculos envolvidos apresentam ventre muscular abundante, imprimindo mais força
- (B) As alavancas anatômicas do tipo 3 têm desvantagem mecânica e os músculos envolvidos apresentam fibras musculares mais longas, tendo amplitude articular
- (C) A contração muscular tônica promove movimento
- (D) A contração muscular fásica pode ser isométrica e isotônica
- (E) O músculo agonista realiza o movimento através de contração muscular isotônica concêntrica

