

MOTILIDADE DO TGI

AULA -1

Fran Goulart da Silva

Departamento de Fisiologia e Biofísica – ICB/USP

TGI

MÚSCULO ESQUELÉTICO (1/3)

INVERVAÇÃO INTRÍNSECA VS EXTRÍNSECA

MÚSCULO LISO (2/3)

SNE

PLEXO SUBMUCOSO
-secreção-

SNA


PARASSIMPÁTICO
(estimulação)


SIMPÁTICO
(inibição)

PLEXO MIOENTÉRICO
-mm circular e longitudinal-
-mm tônico e fásico-
-contração / relaxamento-

INGESTÃO

MOTILIDADE
SECREÇÕES
VASODILATAÇÃO






O *Trypanosoma cruzi* destrói o plexo mioentérico causando a dilatação do tubo, principalmente megaesôfago e megacólon

INTEGRAÇÃO DA INERVAÇÃO INTRÍNSECA COM A EXTRÍNSECA

Outros neuromediadores:


- Serotonina
- Catecolaminas
- ATP
- GABA
- NO

Contração fásica



A


Contração tônica



B

Koeppen & Stanton: Berne and Levy Physiology, 6th Edition.
Copyright © 2008 by Mosby, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

Distensão do tubo = relaxamento dos esfíncteres



Piloro:

Regulação antral-antegrada (relaxamento)

Regulação duodenal-retrógrada (contração)




Figura 9-17 O papel do Ca^{2+} no desencadeamento da contração do músculo liso.

