

AMBER-advies

Opdrachtgever : Stad Genk

Contactpersoon : Bernd Bormans (bernd.bormans@genk.be)

Locatie : Bedrijventerreinen te Genk

Adviesverlener : Centrum Duurzaam Groen vzw, Troisdorflaan 19, 3600 Genk

AMBER-adviseur : Toon Maes, 0470 21 08 67 (toon.maes@centrumduurzaamgroen.be)

Datum advies : 07/03/2024

Inleiding

Centrum Duurzaam Groen biedt alle Limburgse gemeenten en Diest gratis advies op maat aan voor probleemsituaties in het openbaar groen.

De adviezen worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van Limburg.net.

Elk advies heeft tot doel om te komen tot een verbetering van de groenkwaliteit. Daarbij zijn onderhoudsvriendelijk, afvalarm, esthetiek en biodiversiteit de sleutelwoorden.

AMBER staat voor een verzameling van vijf ECO-waarden met een gemeenschappelijk doel: het herstellen en behouden van een gezonde leefomgeving. Deze ECO-waarden zijn: kringloop, biodiversiteit, duurzaamheid, evenwicht en klimaat. Ze vormen de basis voor een duurzaam ecologisch groenadvies voor openbaar groen en natuurlijke tuinen.

Openbare besturen kunnen aan de Amberadviseur advies vragen voor wijken, parken, begraafplaatsen, school- en werkomgevingen,... Bij een planscreening screent de Amberadviseur uw plannen in de voorontwerpfase zodat deze nog bijgestuurd kunnen worden.

Een AMBER-advies wordt steeds op maat gemaakt. Het advies is enkel van toepassing op de locatie zoals aangegeven in de hoofding van het advies. Een AMBER-advies mag dus nooit toegepast worden op een andere locatie daar de Ausgangssituatie anders kan zijn.

AMBER-adviezen mogen niet doorgegeven worden aan derden.

Toelichting

Stad Genk wenst een AMBER-advies/screening van hun huidige, gedateerde (1997) plantenlijst van streekeigen bomen en heesters in kader van een bouwverordening m.b.t. bescherming van houtkanten, houtwallen en waardevolle inheemse bomen. Deze lijst wordt toegepast bij een subsidie voor het inrichten van groen op bedrijventerreinen te Genk, waarbij 80% van de beplanting soorten uit deze lijst dienen te zijn (conform de mail van 21/02/2024). Dit Amber-advies bevat volgende zaken:

- Screening en analyse bestaande plantenlijst van streekeigen, inheemse bomen en heesters (+ in bijlage: onze Klimaatbomenlijst met variëteiten en ook uitheemse soorten, allen met parameters)
- Analyse lokale beplanting t.h.v. Zuid-Oost Genk (Ecodistrict 15: Oost-Kempische puinwaaierdistrict)
- Voorstel klimaatrobuuste plantenlijst van streekeigen, inheemse bomen en heesters voor Zuid-Oost Genk
- Klimaatrobuuste, streekeigen, inheemse klimplanten
- Klimaatrobuuste, streekeigen, inheemse vaste planten
- Klimaatrobuuste, streekeigen, inheemse bloembollen
- Klimaatrobuuste, biodiverse gazons met streekeigen, inheemse bloemen/kruiden
- Klimaatrobuuste, streekeigen, inheemse bloemenweiden en bloemenrijke graslanden (met plantenfiches)
- Algemene plantenkeuzeadvieslijstjes vaste planten, sierheesters en gemengde hagen

Dit AMBER-advies geeft enkele tips aan de hand van streekeigen, inheemse plantenlijsten van verschillende vegetatietypes voor het inrichten van bedrijventerreinen. Inrichten richt zich niet alleen tot wat moet, 'pesticidenvrij beheren', maar vertelt ook hoe deze plaatsen kunnen transformeren naar een aangename en groene leefomgeving. Een groene leefomgeving met streekeigen, inheemse beplanting, die bijdraagt aan de lokale, biodiverse fauna en flora van onze natuur.

Indien het gaat om natuurgebieden, dienen er andere richtlijnen en plantenlijsten gevolgd te worden en kan u meer info verschaffen bij o.a. Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt.

Advies d.m.v. plantenlijsten

Screening en analyse van bestaande plantenlijst van streekeigen (inheemse) bomen en heesters

LIJST 1 : WAARDEVOLLE INHEEMSE BOOMSOORTEN.

Latijnse naam	Nederlandse naam
Carpinus betulus	haagbeuk
X Fagus sylvatica	beuk (zonnebrand stam)
X Fraxinus excelsior	gewone es (essenziekte)
Ilex aquifolium	hulst
Quercus petraea	wintereik
Quercus robur	zomereik
Tilia cordata	winterlinde of kleinbladige linde
Tilia platyphyllos	zomerlinde of grootbladige linde
Tilia vulgaris	Hollandse linde
X Ulmus glabra	ruwe iep (iepenziekte gevoelig)
X Ulmus minor	gewone iep of gladde iep of veldiep (iepenziekte gevoelig)

Zoals u ziet zitten er enkele soorten bij die het tegenwoordig niet meer goed doen bij ons wegens ziekten en klimaatveranderingen. In deze lijst staan er enkele van zulke gevallen. Wat betreft de ziekten zijn er wel wat variëteiten van de soorten beschikbaar, die resistent zijn (zie onze Klimaatbomenlijst voor Limburgse gemeenten/steden in bijlage). Best altijd deze variëteiten vermelden indien u ze in de lijst wil laten staan. De beuk kan u beter uit de lijst weghalen, tenzij deze op een schaduwrijke plaats kan aangeplant kan worden, wat zeer zeldzaam is bij bedrijventerreinen en straten (wel nog mogelijk in dichte bossen of als beveerde haag).

Advies d.m.v. plantenlijsten

Screening en analyse van bestaande plantenlijst van streekeigen (inheemse) bomen en heesters

1.

LIJST 2 : STREEKEIGEN BOMEN EN HEESTERS.

Naalddhoutsoorten :

Juniperus communis	gewone jeneverbes
Pinus sylvestris	grove den (max 5 % van het totaal)
Taxus baccata	gewone taxus

Loofhoutsoorten :

Acer campestre	veldesdoorn of Spaanse aak
Acer pseudoplatanus	gewone esdoorn
X Alnus glutinosa	zwarte els (droogtegevoelig zomer)
(syn. Alnus vulgaris)	
X Betula pendula	ruwe berk of witte berk (droogtegevoelig zomer)
(syn. Betula verrucosa,	
Betula alba)	
X Betula pubescens	zachte berk (droogtegevoelig zomer)
Carpinus betulus	haagbeuk
Cornus sanguinea	rode kornoelje
(syn. Thelycrania sanguinea)	
Corylus avellana	hazelaar
Crataegus laevigata	tweestijlige meidoorn
Crataegus monogyna	eenstijlige meidoorn
(syn. Crataegus oxyacantha)	
Euonymus europaeus	kardinaalsmuts
X Fagus sylvatica	beuk (zonnebrand stam)
X Fagus sylvatica 'Purpurea'	bruine beuk (zonnebrand stam)
X Fraxinus excelsior	gewone es (essenziekte gevoelig)
Ilex aquifolium	hulst
Ligustrum vulgare	gewone liguster
Lonicera periclymenum	wilde kamperfoelie
X Prunus avium	zoete kers (droogtegevoelig zomer)
X Prunus padus	inlandse vogelkers (droogtegevoelig zomer)
(syn. Cerasus padus)	
Prunus spinosa	sleedoorn
Quercus petraea	wintereik
(syn. Quercus sessilis,	
Quercus sessiflora)	
Quercus robur	zomereik
(syn. Quercus pendunculata)	
Rhamnus catharticus	wegedoorn
Rhamnus frangula	gewone vuilboom of sporkehout
(syn. Frangula alnus)	
Rosa canina	hondsroos
(syn. Rosa sepium)	

Advies d.m.v. plantenlijsten

Screening en analyse van bestaande plantenlijst van streekeigen (inheemse) bomen en heesters

Salix alba	schietwilg
Salix aurita	geoorde wilg
Salix caprea	waterwilg of boswilg
Salix cinerea	grauwe wilg
Salix fragilis	kraakwilg
Salix repens	kruipwilg
Salix viminalis	katwilg
Sambucus nigra	gewone vlier
Sambucus racemosa	trosvlier
x Sorbus aucuparia	lijsterbes (bacterievuur gevoelig)
Tilia cordata	winterlinde of kleinbladige linde
Tilia platyphyllos	zomerlinde of grootbladige linde
Tilia vulgaris	Hollandse linde
Ulex europaeus	gaspeldoorn
x Ulmus glabra	ruwe iep (iepenziekte gevoelig)
(syn. Ulmus scabra, Ulmus montana)	
x Ulmus minor	gewone of gladde iep of veldiep
(syn. Ulmus campestris, Ulmus vulgaris, Ulmus carpinifolia)	(iepenziekte gevoelig)
Viburnum opulus	Gelderse roos

Zoals u ziet zijn er in deze lijst ook verscheidene soorten aanwezig met ziekten en zonnebrandgevoeligheid. Hier geldt voor de resistente variëteiten ook hetzelfde als bij de vorige paragraaf (zie Klimaatbomenlijst voor Limburgse gemeenten/steden in bijlage). U zult zien dat er in die lijst geen soorten staan voor langdurige, zeer natte gebieden (zoals Salix), omdat deze lijst een bomenlijst is voor (zeer) droge tot vochtige stadcentrumsituaties. De aangeduide, droogtegevoelige soorten hebben het ook moeilijk buiten deze stadcentrumsituaties en kunnen dus best vermeden worden bij nieuwe aanplantingen. Bij de vele parameters staan o.a. de bodemeisen, maar ook de kolom 'inheems (semi-inheems)'. Dus jullie huidige lijst zou ik niet toepassen voor toekomstige aanplantingen. **U kan gerust onze Klimaatbomenlijst voor Limburgse gemeenten/steden gebruiken om zelf een lijst op te maken. Deze mag origineel niet verspreid worden in andere campagnes/subsidies dan onze Klimaatbomencampagne.**

Advies d.m.v. plantenlijsten

Analyse lokale beplanting t.h.v. Zuid-Oost Genk (ecodistrict 15: Oost-Kempische puinwaaierdistrict)

Als we kijken naar de lokale beplanting t.h.v. Zuid/Oost Genk kunnen we vaststellen dat vooral de volgende inheemse loofhout- en naaldhoutsoorten van het ecodistrict 15: Oost-Kempische puinwaaierdistrict aanwezig zijn ([Ecodistricten | Vlaanderen.be](#), [Verspreiding en standplaats van inheemse bomen en struiken in Vlaanderen | Vlaanderen.be](#), p. 319):

Naaldhoutsoorten:

- Juniperus communis (Jeneverbes)

Loofhoutsoorten:

- *Alnus glutinosa* (Zwarte els) **droogtegevoelig zomer**
- *Alnus incana* (Witte els) **droogtegevoelig zomer**
- *Betula pendula* (Ruwe berk) **droogtegevoelig zomer**
- *Betula pubescens* (Zachte berk) **droogtegevoelig zomer**
- *Carpinus betulus* (Haagbeuk)
- *Corylus avellana* (Hazelaar)
- *Crataegus monogyna* (Eénstijlige meidoorn)
- *Fagus sylvatica* (Beuk) **zonnebrand stam**
- *Fraxinus excelsior* (Es) **essenziekte gevoelig**
- *Ilex aquifolium* (Hulst)
- *Mespilus germanica* (Mispel)
- *Myrica gale* (Wilde gagel)
- *Prunus avium* (Zoete kers) **droogtegevoelig zomer**
- *Prunus padus* (Vogelkers) **droogtegevoelig zomer**
- *Prunus spinosa* (Sleedoorn)
- *Quercus petraea* (Wintereik)
- *Quercus robur* (Zomereik)
- *Rhamnus cathartica* (Wegedoorn)
- *Rhamnus frangula* (Sporkehout)
- *Rosa pseudosabariensis* (Viltroos complex)
- *Rosa canina* (Hondsroos)
- *Salix aurita* (Geoorde wilg)
- *Salix caprea* (Boswilg)
- *Salix cinerea* (Gauwe en Rossige wilg)
- *Salix repens* (Kruipwilg)
- *Sambucus nigra* (Gewone vlier)
- *Sorbus aucuparia* (Wilde lijsterbes) **bacterievuur gevoelig**
- *Tilia cordata* (Winterlinde)
- *Viburnum opulus* (Gelderse roos)

Advies d.m.v. plantenlijsten

Voorstel klimaatrobuuste plantenlijst van streekeigen, inheemse bomen en heesters voor Zuid-Oost Genk

Na deze analyse kan je vaststellen dat de inheemse, lokale soortenlijst een beetje beperkter is dan jullie voorgestelde inheemse soortenlijst. Dit heeft ook te maken met de lokale bodemsoort, een droge (Zbg), voornamelijk matig natte (Zdg) en natte zandbodem (Zeg):

Naalddhoutsoorten:

- Juniperus communis (Jeneverbes)

Loofhoutsoorten:

- Carpinus betulus (Haagbeuk)
- Corylus avellana (Hazelaar)
- Crataegus monogyna (Eénstijlige meidoorn)
- Ilex aquifolium (Hulst)
- Mespilus germanica (Mispel)
- Myrica gale (Wilde gagel)
- Prunus spinosa (Sleedoorn)
- Quercus petraea (Wintereik)
- Quercus robur (Zomereik)
- Rhamnus cathartica (Wegedoorn)
- Rhamnus frangula (Sporkehout)
- Rosa pseudosabruscula/tomentosa (Viltroos complex)
- Rosa canina (Hondsroos)
- Salix aurita (Goorde wilg)
- Salix caprea (Boswilg)
- Salix cinerea (Gauwe en Rossige wilg)
- Salix repens (Kruipwilg)
- Sambucus nigra (Gewone vlier)
- Tilia cordata (Winterlinde)
- Viburnum opulus (Gelderse roos)

Deze lijst kan aangevuld worden met uitheemse, ziekte- en droogteresistente, (gelijkende,) klimaatboomsoorten uit onze Klimaatbomenlijst, met voorkeur voor een droge tot matig natte zandbodem (zie parameters). Bijvoorbeeld: Sorbus aria, Sorbus domestica, Sorbus intermedia, Sorbus latifolia, Sorbus torminalis, Sorbus x thuringiaca Fraxinus americana, Fraxinus mandshurica, Fraxinus ornus, Fraxinus pennsylvanica, enzovoort.

Advies d.m.v. plantenlijsten

Klimaatrobuuste plantenlijst van streekeigen, inheemse klimplanten

Wat betreft klimplanten kan men ook rekening houden met inheemse soorten, daar deze zeer belangrijke waardplanten en voedselplanten zijn voor lokale insecten. Deze lijst bevat zulke, klimaatrobuuste klimplantsoorten (sommigen zijn ook bodembedekkend of giftig), die elk hun eigen standplaats (licht, bodemsoort, water) verkiezen en specifieke eigenschappen hebben:

- Bryonia dioica (Heggenrank)
- Calystegia sepium (Haagwinde)
- Clematis vitalba (Bosrank)
- Fallopia convolvulus (Zwaluwtong)
- Hedera helix (Klimop)
- Humulus lupulus (Wilde hop)
- Lathyrus sylvestris (Boslathyrus)
- Lathyrus tuberosus (Aardaker)
- Lonicera periclymenum (Wilde kamperfoelie)
- Rosa arvensis (Bosroos)
- Rosa canina (Hondsroos)
- Rosa rubiginosa (Egelantier)
- Solanum dulcamara (Bitterzoet)

Zie volgende links met parameters/filters:

[Plantenlijsten voor een tuin vol leven | Ecopedia](#)

[Inheemse bomen en struiken voor haag en vogelbos | Cruydt-Hoeck \(cruydhoeck.nl\)](#)

Centrum Duurzaam Groen heeft ook meegewerkt aan de plantenfiches van de [Campagne Limburgse Groendaken en -gevels: vergroen je dak of \(duurzaam\) limburgsegemeenten.be](#) Hier kan u naast de inheemse klimplantsoorten ook andere, uitheemse soorten terugvinden met parameters. Alsook vindt u hier inheemse en uitheemse plantensoorten voor op verschillende types groendaken terug.

Advies d.m.v. plantenlijsten

Klimaatrobuuste plantenlijst van streekeigen, inheemse vaste planten

Wat betreft vaste planten kan men ook rekening houden met inheemse soorten, daar deze zeer belangrijke waardplanten en voedselplanten zijn voor lokale insecten. Deze lijst bevat zulke, klimaatrobuuste vaste plantensoorten (sommigen zijn bodembedekkend of giftig), die elk hun eigen standplaats (licht, bodemsoort, water) verkiezen en specifieke eigenschappen hebben:

Adderwortel - *Polygonum bistorta*
 Akkerdistel - *Cirsium arvense*
 Avondkoekoeksbloem - *Silene latifolia*
 Beemdkroon - *Knautia arvensis*
 Betonie - *Stachys officinalis*
 Blaassilene - *Silene vulgaris*
 Blauwe knoop - *Succisa pratensis*
 Blauwe monnikskap - *conitum napellus*
 Bochtige smeile - *Deschampsia flexuosa*
 Bosaardbei - *Fragaria vesca*
 Bosanemoon - *Anemone nemorosa*
 Boterbloem - *Ranunculus* sp.
 Brandnetel - *Urtica* sp.
 Breed klokje - *Campanula latifolia*
 Christoffelkruid - *Actaea spicata*
 Dagkoekoeksbloem - *Silene dioica*
 Dalkruid - *Maianthemum bifolium*
 Daslook - *Allium ursinum*
 Donkere ooievaarsbek - *Geranium phaeum*
 Duifkruid - *Scabiosa columbaria*
 Duizendblad - *Achillea millefolium*
 Echte guldenroede - *Solidago Virgaurea*
 Echte kamille - *Chamomilla recutita*
 Echte koekoeksbloem - *Lychnis flos-cuculi*
 Esparcette - *Onobrychis vicifolia*
 Fluitekruid - *Anthriscus sylvestris*
 Fraaie vrouwenmantel - *Alchemilla mollis*
 Geel nagelkruid - *Geum urbanum*
 Gele dovenetel - *Lamium galeobdolon*
 Gele ganzebloem - *Chrysanthemum segetum*
 Gele lis - *Iris pseudacorus*
 Gele monnikskap - *Aconitum septentrionale*
 Gevlekt longkruid - *Pulmonaria officinalis*
 Gevlekte aronskelk - *Arum maculatum*
 Gevlekte dovenetel - *Lamium maculatum*
 Gewone agrimonie - *Agrimonia eupatoria*
 Gewone brunel - *Prunella vulgaris*
 Gewone eikvaren - *Polypodium vulgare*

Gewone engelwortel - *Angelica sylvestris*
 Gewone kattestaart - *Lythrum salicaria*
 Gewone salomonszegel - *Polygonatum multiflorum*
 Gewone smeewortel - *Symphytum officinale*
 Gewone vogelmelk - *Ornithogalum umbellatum*
 Gewoon knoopkruid - *Centaurea jacea*
 Gewoon vingerhoedskruid - *digitalis purpurea*
 Grasklokje - *Campanula rotundifolia*
 Groot hoefblad - *Petasites hybridus*
 Groot kaasjeskruid - *Malva sylvestris*
 Grote brandnetel - *Urtica dioica*
 Grote brunel - *Prunella grandiflora*
 Grote kaardebol - *Dipsacus fullonum*
 Grote maagdenpalm - *Vinca major*
 Grote muur - *Stellaria holostea*
 Grote vossestaart - *Alopecurus pratensis*
 Hemelsleutel - *Sedum telephium*
 Herderstasje - *Capsella bursa-pastoris*
 Herik - *Sinapis arvensis*
 Hondsdraf - *Glechoma hederacea*
 Honingklaver - *Melilotus* sp.
 Ijzerhard - *Verbena officinalis*
 Jacobskruiskruid - *Senecio jacobaea*
 Katuizer anjer - *Dianthus carthusianorum*
 Klaproos - *Papaver* sp.
 Klein timotheegras - *Phleum bertelonii*
 Kleine kaardenbol - *Dipsacus pilosus*
 Kleine maagdenpalm - *Vinca minor*
 Kleine pimpernel - *Sanguisorba minor*
 Koninginnekruid - *Eupatorium cannabinum*
 Korenbloem - *Centaurea cyanus*
 Kruipend zenegroen - *Ajuga reptans*
 Lange ereprijs - *Veronica longifolia*
 Lelietje-van-dalen - *Convallaria majalis*
 Lievevrouwebedstro - *Gallium odoratum*
 Maarts viooltje - *Viola odorata*
 Madeliefje - *Bellis perennis*
 Mannetjesereprijs - *Veronica officinalis*

Advies d.m.v. plantenlijsten

Klimaatrobuuste plantenlijst van streekeigen, inheemse vaste planten

Mannetjesvaren - *Dryopteris filix-mas*
Mansoor - *Asarum europeum*
Margriet - *Leucanthemum vulgare*
Middelste teunisbloem - *Oenothera biennis*
Moerasspirea - *Filipendula ulmaria*
Mottenkruid - *Verbascum blattaria*
Munt - *Mentha* sp.
Naaldvaren - *Polystichum setiferum*
Oranje havikskruid - *Hieracium auranthiacum*
Penningkruid - *Lysimachia nummularia*
Perzikkruid - *Polygonum persicaria*
Pijpenstrootje - *Molinia caerulea*
Pinksterbloem - *Cardamine pratensis*
Prachtklokje - *Campanula persicifolia*
Ridderzuring - *Rumex obtusifolius*
Robertskruid - *Geranium robertianum*
Rode spoorbloem - *Centranthus ruber*
Rolklaver - *Lotus corniculatus*
Roomse kervel - *Myrrhis odorata*
Ruig klokje - *Campanula trachelium*
Sint-Janskruid - *Hypericum perforatum*
Slangekruid - *Echium vulgare*
Steenanjer - *Dianthus deltoïdes*
Stinkend nieskruid - *Helleborus foetidus*
Stinkende gouwe - *Chelidonium majus*

Teunisbloem - *Oenothera* sp.
Tijm - *Thymus* sp.
Toorts - *Verbascum* sp.
Valse salie - *Teucrium scorodonia*
Veldblies - *Luzula nivea*
Veldereprijs - *Veronica arvensis*
Vlasbekje - *Linaria vulgaris*
Wilde akelei - *Aquilegia vulgaris*
Wilde bertram - *Achillea ptarmica*
Wilde boshyacint - *Hyacinthoides non-scripta*
Wilde hyacint - *Hyacinthoides non-scripta*
Wilde marjolein - *Origanum vulgare*
Wilde peen - *Daucus carota*
Winde - *Calystegia* sp.
Wolverlei - *Arnica montana*
Wrangwortel - *Helleborus viridis*
Zeepkruid - *Saponaria officinalis*
Zevenblad - *Aegopodium podagraria*

Zie volgende links met parameters/filters:

[Plantenlijsten voor een tuin vol leven | Ecopedia](#)

[Inheemse zaden en planten voor tuin en openbaar groen | Cruydt-Hoeck \(cruydt hoeck.nl\)](#)

[Inheemse wilde grassen | Cruydt-Hoeck \(cruydt hoeck.nl\)](#)

Advies d.m.v. plantenlijsten

Klimaatrobuuste streekeigen, inheemse bloembollen

Een biodivers gazon of een bloemenweide kan verder aangevuld worden met meerjarige **voor- en/of najaarsbloembollen** zodat er voor en na het maaiseizoen ook nog bloeiende planten te zien zullen zijn. Zo kan men de 'bloeiboog' verlengen vanaf februari t.e.m. november.

In het voorjaar kan men een ecologisch assortiment van **kleurrijke, inheemse verwilderingsbloembollen (stinzenbollen)** toepassen, want dit is een zeer belangrijke, ecologische ingreep. Dit is namelijk het eerste voedsel voor wilde bijen en andere insecten na de winter (zie [Ecoflora: BB9 Inheems stinzenmengsel](#), voorjaar). Verder kan men ook zelf een assortiment samenstellen met vele andere (semi-) inheemse soorten die in het voorjaar bloeien: [Ecoflora - lentebloeiende bloembollen](#)

Voor het najaar zijn de inheemse soorten heel wat beperkter, namelijk enkel Colchicum autumnale (Herfsttijloos) en de ingeburgerde, semi-inheemse Cyclamen hederifolium (Napolitaanse cyclamen): [Ecoflora - herfstbloeiende bloembollen](#)

Alle bloembollen(mengsels) van o.a. [Ecoflora](#), [Cruydhoeck](#), [Natuurpunt](#) en [Biozaadgoed](#) zijn ecologisch en bevatten geen spoeistoffen (zoals wel het geval is bij vele firma's!), waardoor de bijen niet vergiftigd doodvallen enkele dagen na hun bezoek aan de nieuwe bloembollen! Check bij aankoop dus altijd of het wel degelijk bio-bloembollen zijn.

Advies d.m.v. plantenlijsten

Klimaatrobuuste biodiverse gazons met streekeigen, inheemse bloemen/kruiden

Een **biodivers gazon** (extensief beheer, maandelijks maaien in groeiseizoen)
(zie **Ecoflora**, E1 Biodivers gazon of E2 Biodivers gazon extra laagblijvend)



(E1) Mengsel bestaande uit 95% grassen en 5% inheemse bloemen

Dit mengsel is bedoeld om ecologische gazons te ontwikkelen. De soorten in dit mengsel verdragen regelmatig maaien.

Naast minder zwaar beheer (gedifferentieerd beheer), is dit mengsel een bron van voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten.

Bloeiperiode: mei - september

Zaadichtheid: 25 g/m²

Zaaiperiode: bij voorkeur nazomer of vroege voorjaar

Maaibeheer: Maaien gebeurt in het voorjaar (tot half juli) om de twee tot drie weken, op een hoogte van minimaal 8 cm. Daarna kan minder worden gemaaid of niet gemaaid tot midden september. Steeds afvoeren van het maaisel!

(E2) Dit mengsel is ontwikkeld om gangpaden te vergroenen en zo het gebruik van herbiciden of veelvuldig wieden te voorkomen. Dit mengsel wordt onder-meer toegepast in gangpaden van kerkhoven (verdraagt vele betredingen).

Mengsel bestaande uit 95% grassen en 5% inheemse bloemenzaden.

De soorten in het mengsel zijn laagblijvend en bestand tegen betreding, dit voor een vlotte betreding.

Naast minder zwaar beheer (gedifferentieerd beheer), is dit mengsel een bron van voedsel voor bijen, vlinders en andere insecten.

Zaadichtheid: 30 g/m²

Zaaiperiode: bij voorkeur nazomer of vroege voorjaar

Maaibeheer: Maaien gebeurt 5 tot 8 keren per jaar (extensief beheer, maandelijks in het groeiseizoen). Steeds afvoeren van het maaisel!

Advies d.m.v. plantenlijsten

Klimaatrobuuste, streekeigen, inheemse bloemenweiden en bloemenrijke graslanden

Inheemse bloemenweiden en bloemenrijke graslanden zijn een zeer belangrijke vegetaties die veel voedsel aan lokale insecten verschaffen. Deze zijn ook zeer dynamisch qua groei en bloei door hun jaarlijks, afwisselende aanwezigheden/hoeveelheden van de ingezaaide soorten (zie zich ook elk jaar met afgevallen zaad weer verspreiden). Belangrijk hierbij is een extensief maaibeheer (2 tot 3x maaien per jaar en steeds het maaisel afvoeren). Men kan ook een synusbeheer toepassen zodat er steeds een afwisselend stukje ongemaaid blijft in de winter voor de lokale insecten.

Op de volgende pagina's vindt u enkele bloemenweide- en bloemenrijke graslandmengsels terug (plantfiches). U vindt er nog meer op onderstaande links.

Zie volgende links met vele, verschillende inheemse mengsels:

[Ecoflora - bloemenweiden](#)

[Bloemenmengsels voor wilde bloemenweides | Cruydt-Hoeck \(cruydhoeck.nl\)](#)

Plantenfiche

Eénjarige bloemenweide **ZONDER** grassen (niet zo makkelijk betreedbaar)

(zie [Ecoflora](#): A2 Akkerbloemen voor matig vochtig en matig droge gronden)

- Autochtoon mengsel: de bronzaden van dit mengsel zijn verzameld in de natuur in België en hier geproduceerd. Heel bloemrijk, dit mengsel geeft het kleurrijkste en snelste resultaat.
- In het voorjaar ingezaaid geeft dit mengsel reeds na 6 tot 8 weken bloei.
- Geschikt voor de meeste gronden (behalve heel vochtige en heel schrale (arme) gronden).
- **Jaarlijkse grondbewerking (en eventueel bijzaaien) nodig voor bloei in de volgende jaren.**
- Bij combinatie met andere mengsels niet te dicht inzaaien, maximaal 20% van de hoeveelheid.
- Geschikt als tijdelijke oplossing.
- Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels.
- Bloeiperiode: mei tot September
- Hoogte: 60-100 cm
- Standplaats: zoning
- Zaaidichtheid: 2,5 g/m²
Zaaiperiode: bij voorkeur nazomer of vroege voorjaar, niet zaaien tussen half juli en eind augustus
- Maaibeheer: 1 maal maaien per jaar in oktober



Samenstelling:

Agrostemma githago (bolderik)
Anthemis cotula (stinkende kamil)
Centaurea cyanus (korenbloem) Syn. Cyanus segetum
Glebionis segetum (gele ganzebloem)
Legousia speculum-veneris (groot spiegelklokje)
Papaver rhoeas (grote klaproos)
Vaccaria hispanica (koekruid)

Plantenfiche

Meerjarige bloemenweide ZONDER grassen (niet zo makkelijk betreedbaar)

(zie [Ecoflora](#): B1 Leem- en zandleemgronden)

- Het eerste jaar weinig bloei, daarna ingetogen bloei van vaste planten.
- Voor kleur en bloei in het eerste seizoen kan het éénjarig akkerbloemenmengsel A2 mee ingezaaid worden (maximaal 20%)
- Voor leem- en lemige zandgronden (meest voorkomende grondsoort in België).
- Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels
- Voor een zonnige plek
- De grond niet verstoren na aanleg
- Bloeiperiode: mei tot september
- Hoogte: 50-100cm
- Zaaïdichtheid: 1,5-2 gr/m²
Inzaaiperiode: bij voorkeur nazomer of vroeg najaar
- Maairegime: jaarlijks 1 tot 2 maal, aan het begin van de zomer en het aan het einde van de herfst (extensief beheer). Steeds afvoeren van het maaisel!



Samenstelling:

Achillea millefolium (gewoon duizendblad)

Barbarea vulgaris (barbarakruid)

Centaurea jacea (echt knoepkruid)

Crepis biennis (groot streepzaad)

Daucus carota (wilde peen)

Echium vulgare (slangenkruid)

Erodium cicutarium (gewone reigersbek)

Galium mollugo (glad walstro)

Hieracium laevigatum (stijf havikskruid)

Hieracium umbellatum (schermhavikskruid)

Hypericum perforatum (Sint-Janskruid)

Hypochaeris radicata (gewoon biggekruid)

Jasione montana (zandblauwtje)

Leontodon autumnalis (herfstleeuwetand) Syn. *Scorzoneroides autumnalis*

Leucanthemum vulgare (wilde margriet)

Luzula campestris (gewone veldbies)

Malva moschata (muskuskaasjeskruid)

Oenothera biennis (middelste teunisbloem)

Plantago lanceolata (smalle weegbree)

Prunella vulgaris (brunel)

Ranunculus acris (scherpe boterbloem)

Rhinanthus minor (kleine ratelaar)

Silene dioica (dagkoekoeksbloem)

Tragopogon pratensis pratensis (gele morgenster)

Trifolium arvense (hazepootje)

Plantenfiche

Meerjarige bloemenweide ZONDER grassen (niet zo makkelijk betreedbaar)

(zie [Ecoflora](#): B2 Rijke en zware kleigronden)

- Het eerste jaar weinig bloei, daarna ingetogen bloei van vaste planten.
- Voor heel voedselrijke gronden en zware kleigronden (bv. poldergrond)
- Voor een zonnige plek
- De grond niet verstoren na aanleg
- Zaaidichtheid: 1 à 2 gr/m²
Inzaaiperiode: midden maart tot midden juni en vanaf eind augustus
- Maairegime: jaarlijks 1 tot 2 maal, aan het begin van de zomer en het aan het einde van de herfst (extensief beheer).
Steeds afvoeren van het maaisel!



Samenstelling:

Achillea millefolium (gewoon duizendblad)
Anthriscus sylvestris (fluitekruid)
Barbarea vulgaris (barbarakruid)
Centaurea jacea (echt knoopkruid)
Crepis capillaris (klein streepzaad)
Daucus carota (peen)
Heracleum sphondylium (bereklaauw)
Leontodon autumnalis (herfstleeuwetand)
Leucanthemum vulgare (margriet)
Pastinaca sativa (pasitnaak)
Plantago lanceolata (smalle weegbree)
Prunella vulgaris (brunel)
Ranunculus acris (scherpe boterbloem)
Rhinanthus minor (kleine ratelaar)
Silene latifolia alba (avondkoekoeksbloem)
Tanacetum vulgare (boerenwormkruid)
Tragopogon pratensis pratensis (gele morgenster)
Trifolium pratense (rode klaver)
Vicia cracca (vogelwikke)
Vicia sativa nigra (voederwikke)

Plantenfiche

Meerjarige bloemenweide ZONDER grassen (niet zo makkelijk betreedbaar)

(zie [Ecoflora](#): B3 Natte of moerassige grond)

- Het eerste jaar weinig bloei, daarna ingetogen bloei van vaste planten.
- Voor jaarrond natte tot vochtige gronden. Ook in de zomermaanden moet deze grond steeds vochtig blijven!
- Voor een zonnige plek
- De grond niet verstoren na aanleg
- Zaaidichtheid: 1 à 2 gr/m²
Inzaaiperiode: midden maart tot midden juni en vanaf eind augustus
- Maairegime: jaarlijks 1 tot 2 maal, aan het begin van de zomer en het aan het einde van de herfst (extensief beheer). Steeds afvoeren van het maaisel!



Samenstelling:

Achillea ptarmica (wilde bertram)
Angelica sylvestris (gewone engelwortel)
Barbarea vulgaris (barbarakruid)
Caltha palustris (dotterbloem)
Cardamine pratensis (pinksterbloem)
Cirsium palustre (kale jonker)
Dactylorhiza fistulosa (brede orchis)
Epipactis palustris (moeraswespenorchis)
Filipendula ulmaria (moerasspirea)
Hypericum maculatum obtusiusculum (gevekt hertshooi)
Hypericum tetrapterum (geveugeld hertshooi)
Iris pseudacorus (gele iris)
Lotus pendunculatus (moerasrolklaver)
Luzula campestris (gewone veldbies)
Lycopus euroaeus (wolfspoot)
Lysimachia vulgaris (grote wederik)
Lythrum salicaria (kattestaart)
Mentha aquatica (watermunt)
Prunella vulgaris (brunel)
Pulicaria dysenterica (heelblaadjes)

Ranunculus acris (scherpe boterbloem)
Rhinanthus minor (kleine ratelaar)
Silene flos-cuculi (echte koekoeksbloem)
Thalictrum flavum (poelruit)
Valeriana officinalis (valeriaan)

Plantenfiche

Meerjarige bloemenweide ZONDER grassen (niet zo makkelijk betreedbaar)

(zie [Ecoflora](#): B4 schrale, droge neutrale of kalkrijke grond)

- Weinig bloei in het eerste jaar. Voor een kleurrijk resultaat vanaf het eerste jaar kan het mengsel A2 akkerbloemen mee ingezaaid worden (20 tot 30 %).
- Voor schrale, zanderige, liefst kalkrijke grond. Neutrale gronden kunnen ook, maar zeker niet op zure grond!
- Voor een zonnige plek
- De grond niet verstoren na aanleg
- Zaaidichtheid: 1 à 2 gr/m²
Inzaaiperiode: midden maart tot midden juni en vanaf eind augustus
- Maairegime: jaarlijks 1 tot 2 maal, aan het begin van de zomer en het aan het einde van de herfst (extensief beheer). Steeds afvoeren van het maaisel!



Samenstelling:

Agrimonia eupatoria (gewone agrimonie)
Agrimonia procera (welriekende agrimonie)
Anchusa officinalis (gewone ossentong)
Anthyllis vulneraria (wondklaver)
Barbarea vulgaris (barbarakruid)
Briza media (bevertjes)
Campanula persicifolia (prachtklokje)
Campanula rapunculoides (akkerklokje)
Campanula rapunculus (rapunzelklokje)
Campanula rotundifolia (grasklokje)
Campanula trachelium (ruig klokje)
Centaurea scabiosa (grote centaurie)
Cichorium intybus (wilde chicorei)
Crepis biennis (groot streepzaad)
Dianthus deltoides (steenanjer)
Galium verum (echt walstro)
Geranium pratense (beemdooievaarsbek)

Isatis tinctoria (wede)
Knautia arvensis (beemdkroon)
Leontodon hispidus (ruige leeuwetand)
Origanum vulgare (wilde marjolein)
Plantago media (ruige weegbree)
Reseda lutea (wilde reseda)
Reseda luteola (wouw)
Rhinanthus minor (kleine ratelaar)
Salvia pratensis (veldsalie)
Sanguisorba minor (kleine pimpernel)
Saxifraga granulata (knolsteenbreek)
Scabiosa columbaria (duifkruid)
Silene vulgaris (blaassilene)
Stachys officinalis (betonie)
Tragopogon porrifolius (paarse morgenster)
Tragopogon pratensis pratensis (gele morgenster)
Verbascum nigrum (zwarte toorts)
Verbena officinalis (ijzerhard)

Andere specifieke bloemenweidetypen zonder grassen kan u ook terugvinden op de website van [Ecoflora](#).

Plantenfiche

Eén- en meerjarige bloemenweide ZONDER grassen (niet zo makkelijk betreedbaar)

(zie [Ecoflora](#): B5 Boomgaardmengsel)

- Bloemrijk vanaf het eerste jaar
- Mengsel met éénjarigen, tweejarigen en vaste planten
- De soorten in dit mengsel zijn waardplanten voor nuttige insecten
- Dit mengsel is samengesteld om geïntegreerde plaagbestrijding in boomgaarden te bevorderen
- Voor stroken tussen de fruitbomen
- Duurzaamheid van maximum 5 jaar, daarna opnieuw in te zaaien
- Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels
- Bloeiperiode: mei - september
- Standplaats: zonnig, verdraagt lichte schaduw
- Zaaidichtheid: 2,5 g/m²
- Zaaiperiode: bij voorkeur nazomer of vroege voorjaar
- Maaibeheer: Eerste jaar enkel maaien in oktober, daarna 1 tot 2 keer per jaar
Steeds met afvoeren van het maaisel!



Samenstelling:

Achillea millefolium (duizendblad)
 Agrostemma githago (bolderik)
 Campanula rapunculoides (akkerklokje)
 Centaurea cyanus (korenbloem)
 Centaurea jacea (echt knoopkruid)
 Cichorium intybus (wilde chicorei)
 Coriandrum sativum (koriander)
 Daucus carota (wilde peen)
 Echium vulgare (slangenkruid)
 Foeniculum vulgare (venkel)
 Geranium pyrenaicum (bermoovievaarsbek)
 Glebionis segetum (gele ganzebloem)
 Leontodon hispidus (ruige leeuwentand)
 Leucanthemum vulgare (wilde margriet)

Malva moschata (muskuskaasjeskruid)
 Malva sylvestris (groot kaasjeskruid)
 Matricaria recutita (echte kamille)
 Origanum vulgare (wilde marjolein)
 Papaver rhoeas (grote klaproos)
 Reseda lutea (wilde reseda)
 Silene flos-cuculi (echte koekoeksbloem)
 Silene latifolia alba (avondkoekoeksbloem)
 Silene vulgaris (blaassilene)
 Tragopogon pratensis (gele morgenster)
 Verbascum thapsus (koningskaars)

Plantenfiche

Meerjarige bloemenweide MET grassen (makkelijker betreedbaar)

(zie [Ecoflora](#): D1 Bloemrijk grasland 50/50)

- Mengsel bestaande uit 50% grassen en 50% inheemse bloemen (vooral vaste planten). Gedeelte van het mengsel zijn éénjarige bloemen, dit zorgt ervoor dat er het eerste jaar na zaaien ook al bloei is.
- Duurzaamheid van dit mengsel is ruim groter dan 5 jaar (bij goede aanleg en goed beheer)
- Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels
- Bloeiperiode: mei - September
- Hoogte: ca. 60cm
- Standplaats: zoning tot halfschaduw
- Zaaidichtheid: 5 g/m²
Zaaiperiode: bij voorkeur nazomer of vroege voorjaar
- Maaibeheer: eerste jaar enkel in oktober, daarna 1 tot 2 keer: aan het begin van de zomer en aan het einde van de herfst. Steeds afvoeren van het maaisel!



Samenstelling:

Agrostis capillaris (gewoon struisgras)
Cynosurus cristatus (kamgras)
Festuca rubra commutata (gewoon rood zwenkgras)
Poa pratensis (veldbeemdgras)
Rhinanthus minor (kleine ratelaar)
Achillea millefolium (duizendblad)
Agrimonia eupatoria (gewone agrimonie)
Agrostemma githago (bolderik)
Centaurea cyanus (korenbloem) Syn. Cyanus segetum
Centaurea jacea (echt knoopkruid)
Clinopodium vulgare (borstelkrans)
Crepis biennis (groot streepzaad)
Daucus carota (wilde peen)
Galium mollugo (glad walstro)
Geranium pyrenaicum (bermoovievaarsbek)
Glebionis segetum (gele ganzebloem)
Hypericum perforatum (Sint-Janskruid)

Leucanthemum vulgare (wilde margriet)
Lotus corniculatus (gewone rolklaver)
Malva moschata (muskuskaasjeskruid)
Origanum vulgare (wilde marjolein)
Papaver rhoeas (grote klaproos)
Prunella vulgaris (gewone brunel)
Ranunculus acris (scherpe boterbloem)
Rumex acetosa (veldzuring)
Silene flos-cuculi (echte koekoeksbloem)
Silene latifolia alba (avondkoekoeksbloem)
Silene vulgare (blaassilene)
Trifolium pratense (rode klaver)

Plantenfiche

Meerjarige bloemenweide MET grassen (makkelijker betreedbaar)

(zie [Ecoflora](#): D2 Bloemrijk grasland voor droge gronden 50/50)

- Mengsel bestaande uit 50% grassen en 50% inheemse bloemen (vooral vaste planten). Gedeelte van het mengsel zijn éénjarige bloemen, dit zorgt ervoor dat er het eerste jaar na zaaien ook al bloei is.
- Duurzaamheid van dit mengsel is ruim groter dan 5 jaar (bij goede aanleg en goed beheer)
- Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels
- Bloeiperiode: mei - september
- Zaaidichtheid: 5 g/m²
Zaaiperiode: bij voorkeur nazomer of vroege voorjaar
- Maaibeheer: eerste jaar enkel in oktober, daarna 1 tot 2 keer: aan het begin van de zomer en aan het einde van de herfst. Steeds afvoeren van het maaisel!



Samenstelling:

Festuca ovina (schapengras)	Galium verum (geel walstro)
Festuca rubra commutata (roodzwenkgras)	Hypericum perforatum (Sint-Janskruid)
Poa pratensis (veldbeemdgras)	Leontodon hispidus (ruige leeuwentand)
Rhinanthus minor (kleine ratelaar)	Leucanthemum vulgare (wilde margriet)
Achillea millefolium (duizendblad)	Malva moschata (muskuskaasjeskruid)
Agrimonia eupatoria (gewone agromonie)	Onobrychis viciifolia (esparcette)
Agrostemma githago (bolderik)	Origanum vulgare (wilde marjolein)
Anthyllis vulneraria (wondklaver)	Papaver rhoeas (grote klaproos)
Centaurea cyanus (korenbloem)	Primula veris (gulden sleutelbloem)
Centaurea jacea (knoopkruid)	Reseda luteola (wouw)
Centaurea scabiosa (grote centaurie)	Sanguisorba minor (kleine pimpernel)
Clinopodium vulgare (borstelkrans)	Saponaria officinalis (zeepkruid)
Daucus carota (wilde peen)	Silene latifolia alba (avondkoekoeksbloem)
Dianthus armeria (ruige anjer)	Silene vulgare (blaassilene)
Echinops sphaerocephalus (beklierde kogeldistel)	Stachys officinalis (betonie)
Echium vulgare (slangekruid)	Verbascum nigrum (zwarte toorts)

Plantenfiche

Meerjarige bloemenweide MET grassen (makkelijker betreedbaar)

(zie [Ecoflora](#): D3 Bloemrijk grasland voor natte gronden 70/30)

- Mengsel bestaande uit 70% grassen en 30% inheemse bloemen (vooral vaste planten) aanbevolen voor natte bodems en aan de rand van waterlopen. Gedeelte van het mengsel zijn éénjarige bloemen, dit zorgt ervoor dat er het eerste jaar na zaaien ook al bloei is.
- Duurzaamheid van dit mengsel is ruim groter dan 5 jaar (bij goede aanleg en goed beheer)
- Aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels
- Bloeiperiode: mei - September
- Zaaïdichtheid: 5 g/m²



Zaaiperiode: bij voorkeur nazomer of vroege voorjaar

- Maaibeheer: eerste jaar enkel in oktober, daarna 1 tot 2 keer: aan het begin van de zomer en aan het einde van de herfst. Steeds afvoeren van het maaisel!

Samenstelling:

Alopecurus pratensis (grote vossenstaart)

Festuca arundinacea (rietzwenkgras)

Holcus lanatus (gestreepte witbol)

Phalaris arundinacea (rietgras)

Poa trivialis (ruw beemdgras)

Achillea ptarmica (wilde bertram)

Angelica sylvestris (gewone engelwortel)

Anthriscus sylvestris (fluitenkruid)

Centaurea cyanus (korenbloem) Syn. *Cyanus segetum*

Centaurea jacea (knoopkruid)

Eupatorium cannabinum (koninginnekruid)

Filipendula ulmaria (moerasspirea)

Galium mollugo (geel walstro)

Heracleum sphondylium (gewone berenklauw)

Leucanthemum vulgare (wilde margriet)

Lythrum salicaria (grote kattenstaart)

Papaver rhoeas (grote klaproos)

Ranunculus acris (scherpe boterbloem)

Silene dioica (dagkoekoeksbloem)

Silene flos-cuculi (echte koekoeksbloem)

Succisa pratensis (blauwe knoop)

Tragopogon pratensis (gele morgenster)

Valeriana officinalis (echte valeriaan)

Andere specifieke bloemenweidetypes met grassen kan u ook terugvinden op de website van [Ecoflora](#).

Algemeen plantenkeuzeadvies

Enkele **lage, (half)groenblijvende, bodembedekkende vaste planten** (30-60cm):

- Alchemilla mollis - Vrouwenmantel (inheems)
- Calunna vulgaris - Struikheide (inheems)
- Geranium endressii - Ooievaarsbek (semi-inheems)
- Lamium maculatum - Gevlekte dovenetel (inheems)
- Lavendula angustifolia - Lavendel (semi-inheems)
- Pulmonaria longifolia - Longkruid (semi-inheems)
- ...
- *Bergenia cordifolia* - Schoenlappersplant (uitheems, beter niet toepassen)
- *Tiarella cordifolia* - Schuimbloem (uitheems, beter niet toepassen)
- ...

Enkele **zeer lage, (half)groenblijvende bodembedekkende vaste planten** (5-30cm):

- Ajuga reptans - Kruipend zenegroen (inheems)
- Campanula poscharskyana - Kruipklokje (semi-inheems)
- C2 voegenmengsel van Ecoflora (inheems en semi-inheems mix)
- Fragaria vesca - Bosaardbei (inheems)
- Geranium macrorrhizum - Ooievaarsbek (semi-inheems)
- Geranium renardii (semi-inheems)
- Helianthemum - Zonneroosje (semi-inheems)
- Iberis sempervirens - Scheefkelk (semi-inheems)
- Lamium maculatum 'Roseum' - Gevlekte dovenetel (inheems)
- Pulmonaria officinalis - Gevlekt longkruid (inheems)
- Saponaria ocymoides - Muurzeepkruid (semi-inheems)
- Sedum acre - Muurpeper (inheems)
- Sedum album - Wit vetkruid (inheems)
- Sedum hybridum 'Immergrünchen' - Vetkruid
- Sedum reflexum - Tripmadam (inheems)
- Sedum sexangulare - Zacht vetkruid (inheems)
- Sedum spurium - Roze vetkruid (semi-inheems)
- Sedum-matten (inheems en semi-inheems mix)
- Thymus vulgaris - Echte tijm (semi-inheems)
- Thymus praecox - Kruiptijm (semi-inheems)
- Vinca minor - Kleine paarse maagdenplam (inheems)
- Vinca minor 'Gertrude Jekyll' - Kleine witte maagdenpalm (inheems)
- ...
- *Epimedium* - Elfenbloem (uitheems, beter niet toepassen)
- *Pachysandra terminalis* - Schaduwkruid (uitheems, beter niet toepassen)
- *Viola labradorica* - Labradorviooltje (uitheems, beter niet toepassen)
- *Waldsteinia ternata* - Goudaardbei (uitheems, beter niet toepassen)
- ...

Algemeen plantenkeuzeadvies

Wat betreft de **sierheesters** zijn er verschillende, **inheemse**, **ecologische**, **winterharde**, **onderhoudsvriendelijke** (5 jaarlijks verjongen en jaarlijks eventueel dood hout verwijderen), **bloeiende** (voor lokale insecten), **bessendragende** (voor lokale vogels) **struikplantsoorten** mogelijk:

- Acer campestre - Veldsedoorn
- Amelanchier ovalis - Europees krentenboompje
- Cornus mas - Gele kornoelje
- Cornus sanguinea - Rode kornoelje
- Corylus avellana - Gewone hazelaar
- Crataegus monogyna - Eénstijlige meidoorn
- Euonymus europaeus - Gewone kardinaalsmuts
- Ilex aquifolium - Hulst **wintergroen**
- Ligustrum vulgare - Wilde liguster **halfwintergroen**
- Prunus padus - Europese vogelkers
- Prunus spinosa - Sleedoorn
- Rosa canina - Hondсроos
- Rosa rubiginosa - Egelantier
- Sambucus nigra - Gewone vlierbes
- Taxus baccata - Venijnboom **wintergroen**
- Viburnum opulus - Gelderse roos
- ...

Deze soorten kunnen ook toegepast worden in een **inheemse, gemengde haag** (3 tot 4 planten per lopende meter, 1 rij en eenmaal scheren uit het vogelbroedseizoen!) of in een **inheemse, gemengde heg** (1 plant per lopende meter, 1 of meerdere rijen in halfverband en zelfde onderhoud als sierheesters hierboven). Deze soorten plant je best in groepjes vanaf 5 stuks vanwege concurrentie onderling.

*Voor de **gemengde haag** kan je best de volgende, bovengenoemde soorten vermijden wegens **te grote vertakkingen om te scheren**: Amelanchier ovalis, Corylus avellana, Prunus padus en Sambucus nigra.*

Alle bovenvermelde plantensoorten kan je op **Ebben**, **Ecopedia**, **Willaert** of **Velt** terugvinden met al hun gedetailleerde en ecologische eigenschappen en voorwaarden (zoals o.a. bodemsoort, standplaats, bloemkleur, bloeiperiode, enz. ...)

Een Amber-advies is een advies op maat. Dit document mag niet doorgegeven worden aan derden en op geen enkele wijze gepubliceerd worden.

Een AMBER-advies is slechts een beperkt advies. Het is echter niet mogelijk om binnen onze gratis adviezen beplantingsplannen uit te werken, daar ontwerpen en beplantingsplannen onder onze betalende opdrachten vallen. Indien u een ontwerp of beplantingsplan wenst, kunnen wij voor u een gepaste offerte maken.