

# Линейная алгебра

## Урок 4. Системы линейных уравнений. Часть 1

### Практическое задание

1. Решить систему уравнений методом Гаусса:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = -2, \\ x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 4. \end{cases}$$

2. Проверить на совместность и выяснить, сколько решений будет иметь система линейных уравнений:

а)  $\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 4, \\ 2x_1 - 5x_2 - 3x_3 = -17, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0; \end{cases}$

б)  $\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 6x_3 = 1, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -2, \\ 3x_1 - 6x_2 + 9x_3 = 5; \end{cases}$

в)  $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 4, \\ 3x_1 + x_2 - 8x_3 = -2. \end{cases}$

3. Проверить на совместность и выяснить, сколько решений будет иметь система линейных уравнений, заданная расширенной матрицей

$$\tilde{A} = \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 5 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right).$$

4. Дана система линейных уравнений, заданная расширенной матрицей

$$\tilde{A} = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & a \\ 4 & 5 & 6 & b \\ 7 & 8 & 9 & c \end{array} \right).$$

Найти соотношение между параметрами  $a$ ,  $b$  и  $c$ , при которых система является несовместной.

```
В [1]: import numpy as np
```

### Задача 1

Решить систему уравнений методом Гаусса:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = -2, \\ x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 = 4. \end{cases}$$

#### Решение

Запишем расширенную матрицу системы:

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -3 & 1 & 4 \end{array} \right).$$

Приведём матрицу к ступенчатому виду

Вычтем из второй строки первую, умноженную на 2:

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 5 & -2 \\ 1 & 1 & -3 & 1 & 4 \end{array} \right).$$

Вычтем из третьей строке первую:

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & 4 \end{array} \right).$$

В итоге после преобразований мы получили матрицу треугольного вида, которая представляет следующую систему:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4 = 0, \\ -x_2 + x_3 + 5x_4 = -2, \\ -2x_3 + 3x_4 = 4, \end{cases}$$

Необходимо переменную  $x_4$  принять в качестве свободной переменной и через нее выразить остальные переменные.

$$x_4 = c$$

Из 3-ой строки выражаем  $x_3$

$$x_3 = \frac{3}{2}c - 2$$

Подставим  $x_3$  во второе уравнение:

$$-x_2 + \frac{3}{2} \cdot c - 2 + 5 \cdot c = -2 \Rightarrow x_2 = \frac{13}{2} \cdot c,$$

а затем полученные  $x_2$  и  $x_3$  — в первое уравнение:

$$x_1 + \frac{13}{2} \cdot c + 2 - \frac{3}{2} \cdot c + 2 \cdot c = 0 \Rightarrow x_1 = -2 - 3 \cdot c.$$

Получаем решение

$$\begin{aligned} x_1 &= -2 - 3 \cdot c, \\ x_2 &= \frac{13}{2} \cdot c, \\ x_3 &= \frac{3}{2}c - 2, \\ x_4 &= c. \end{aligned}$$

Для получения **частного решения**, приравняем переменную  $x_4$  к 0:

$$\begin{aligned} x_4 &= 0 \\ x_3 &= -2 \\ x_2 &= 0 \\ x_1 &= -2 \end{aligned}$$

В [ ]:

В [ ]:

## Теорема Кронекера — Капелли¶

Вернемся к матричному виду систем линейных уравнений

$$Ax = b.$$

### Теорема

Необходимым и достаточным условием совместности системы из  $m$  уравнений с  $n$  неизвестными является равенство между собой рангов матрицы коэффициентов  $A$  и расширенной матрицы  $\tilde{A}$

$$\text{rank} A = \text{rank} \tilde{A}.$$

Причем:

- 1) если  $\text{rank} A = \text{rank} \tilde{A} = n$ , где  $n$  — число неизвестных, то система определена, т. е. имеет единственное решение;
- 2) если  $\text{rank} A = \text{rank} \tilde{A} < n$ , то система имеет бесконечное количество решений;
- 3) если  $\text{rank} A < \text{rank} \tilde{A}$ , то система несовместна.

A-матрица коэффициентов

## Задача 2

Проверить на совместность и выяснить, сколько решений будет иметь система линейных уравнений:

$$\text{а) } \begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 = 4, \\ 2x_1 - 5x_2 - 3x_3 = -17, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0; \end{cases}$$

Запишем матрицу A в виде

```
В [2]: a = np.array([[2, -5, -3], [1, 1, -1], [3, -1, 1] ])
print(f'Матрица A:\n{a}')
r = np.linalg.matrix_rank(a)
print(f'Ранг матрицы A: {r}')
```

Матрица A:  
[[ 2 -5 -3]  
[ 1 1 -1]  
[ 3 -1 1]]  
Ранг матрицы A: 3

```
В [3]: # Вектор свободный членов
b = np.array([4, -17, 0])
print(f'Вектор b: {b}')
```

Вектор b: [ 4 -17 0]

Расширенная матрицы A\_t

$$\tilde{A} = \left( \begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 1 & 4 \\ 2 & -5 & -3 & -17 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right).$$

```
B [4]: A_t = np.array([[1, 1, -1, 0], [3, -1, 1, 4], [2, -5, -3, -17]])
print(f'Расширенная матрица A_t:\n{A_t}')
r = np.linalg.matrix_rank(A_t)
print(f'Ранг матрицы A_t: {r}')
```

Расширенная матрица A\_t:

```
[[ 1  1 -1  0]
 [ 3 -1  1  4]
 [ 2 -5 -3 -17]]
```

Ранг матрицы A\_t: 3

Число неизвестных **n=3**

Из теоремы Кронекера — Капелли следует, что то **система а) определена**, т. е. имеет единственное решение так как  $rank A = rank \tilde{A} = n$ , ( $rank A = 3, rank \tilde{A} = 3, n = 3$ )

B [ ]:

B [ ]:

$$б) \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 6x_3 = 1, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 = -2, \\ 3x_1 - 6x_2 + 9x_3 = 5; \end{cases}$$

```
B [5]: a = np.array([[2, -4, 6], [1, -2, 3], [3, -6, 9] ])
print(f'Матрица A:\n{a}')
r = np.linalg.matrix_rank(a)
print(f'Ранг матрицы A: {r}')
```

Матрица A:

```
[[ 2 -4  6]
 [ 1 -2  3]
 [ 3 -6  9]]
```

Ранг матрицы A: 1

```
B [6]: # Вектор свободный членов
b = np.array([1, -2, 5])
print(f'Вектор b: {b}')
```

Вектор b: [ 1 -2 5]

Расширенная матрицы A\_t

$$\tilde{A} = \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & 6 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & -2 \\ 3 & -6 & 9 & 5 \end{array} \right).$$

```
B [7]: A_t = np.array([[2, -4, 6, 1], [1, -2, 3, -2], [3, -6, 9, 5]])
print(f'Расширенная матрица A_t:\n{A_t}')
r = np.linalg.matrix_rank(A_t)
print(f'Ранг матрицы A_t: {r}')
```

Расширенная матрица A\_t:

```
[[ 2 -4  6  1]
 [ 1 -2  3 -2]
 [ 3 -6  9  5]]
```

Ранг матрицы A\_t: 2

Число неизвестных **n=3**

Из теоремы Кронекера — Капелли следует, что **система (б) несовместна**, так как  $rank A < rank \tilde{A}$ , ( $rank A = 1, rank \tilde{A} = 2$ )

B [ ]:

B [ ]:

$$в) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 4, \\ 3x_1 + x_2 - 8x_3 = -2. \end{cases}$$

```
B [8]: a = np.array([[1, 2, 5], [3, 1, -8]])
print(f'Матрица A:\n{a}')
r = np.linalg.matrix_rank(a)
print(f'Ранг матрицы A: {r}')
```

Матрица A:

```
[[ 1  2  5]
 [ 3  1 -8]]
```

Ранг матрицы A: 2

```
В [9]: # Вектор свободный членов
b = np.array([4, -2])
print(f'Вектор b: {b}')
```

Вектор b: [ 4 -2]

```
В [10]: A_t = np.array([[1, 2, 5, 4], [3, 1, -8, -2]])
print(f'Расширенная матрица A_t:\n{A_t}')
r = np.linalg.matrix_rank(A_t)
print(f'Ранг матрицы A_t: {r}')
```

Расширенная матрица A\_t:  
[[ 1 2 5 4]  
[ 3 1 -8 -2]]  
Ранг матрицы A\_t: 2

Число неизвестных **n=3**

Из теоремы Кронекера — Капелли следует, что то **система (в) имеет бесконечное количество решений**, так как  $rank A = rank \tilde{A} < n, (rank A = 2, rank \tilde{A} = 2, n = 3)$

### Задача 3

Проверить на совместность и выяснить, сколько решений будет иметь система линейных уравнений, заданная расширенной матрицей

$$\tilde{A} = \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & -2 & 4 & 3 \\ 0 & 5 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right).$$

```
В [11]: a = np.array([[1, 3, -2, 4], [0, 5, 0, 0], [0, 0, 3, 0], [0, 0, 0, 2]])
print(f'Матрица A:\n{a}')
r = np.linalg.matrix_rank(a)
print(f'Ранг матрицы A: {r}')
```

Матрица A:  
[[ 1 3 -2 4]  
[ 0 5 0 0]  
[ 0 0 3 0]  
[ 0 0 0 2]]  
Ранг матрицы A: 4

```
В [12]: A_t = np.array([[1, 3, -2, 4, 3], [0, 5, 0, 0, 2], [0, 0, 3, 0, 4], [0, 0, 0, 2, 1]])

print(f'Расширенная матрица A_t:\n{A_t}')
r = np.linalg.matrix_rank(A_t)
print(f'Ранг матрицы A_t: {r}')
```

Расширенная матрица A\_t:  
[[ 1 3 -2 4 3]  
[ 0 5 0 0 2]  
[ 0 0 3 0 4]  
[ 0 0 0 2 1]]  
Ранг матрицы A\_t: 4

Число неизвестных **n=4**

Из теоремы Кронекера — Капелли следует, что то система а) определена, т. е. имеет единственное решение так как  $rank A = rank \tilde{A} = n, (rank A = 4, rank \tilde{A} = 4, n = 4)$

### Задача 4

Дана система линейных уравнений, заданная расширенной матрицей

$$\tilde{A} = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & a \\ 4 & 5 & 6 & b \\ 7 & 8 & 9 & c \end{array} \right).$$

Найти соотношение между параметрами  $a, b$  и  $c$ , при которых система является несовместной.

Из теоремы Кронекера — Капелли следует, что **система (б) несовместна** тогда, когда  $rank A < rank \tilde{A}$ .

```
В [13]: A = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
print(f'Матрица A:\n{A}')
r = np.linalg.matrix_rank(A)
print(f'Ранг матрицы A: {r}')
```

Матрица A:  
[[1 2 3]  
[4 5 6]  
[7 8 9]]  
Ранг матрицы A: 2

Следовательно, для того чтобы система была несовместной, требуется, чтобы ранг матрицы  $\tilde{A}$  был равен 3.

Преобразуем расширенную матрицу к ступенчатой форме

- 1. Умножим 1-ю строку на 2 и вычтем из 2-й строки.
- 2. Умножим 1-ю строку на 3 и вычтем из 3-й строки.

В результате получим матрицу

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & a \\ 2 & 1 & 0 & b - 2a \\ 4 & 2 & 0 & c - 3a \end{array} \right).$$

- 3. Умножим 2-ю строку на 2 и вычтем из 3-й строки.

В результате получим матрицу

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & a \\ 2 & 1 & 0 & b - 2a \\ 0 & 0 & 0 & c + a - 2b \end{array} \right).$$

Если ,  $c + a - 2b \neq 0$  то система является несовместной. В противном случае одна из неизвестных является свободной переменной и, следовательно, система имеет бесконечное множество решений.

В [ ]: