Дискретная математика

Sokolnikov Alex

2025 — 2026

Содержание

1. Информация **3**
1.1. Преподаватель 3
1.2. Оценка 3
Промежуточная аттестация 3
Итоговая оценка 3

2. Математическая индукция **4**
2.1. Что это такое? 4
2.2. Полная индукция 5
2.3. Эквивалентность различных принципов индукции 5

3. Множества **7**
3.1. Операции с множествами 7
3.2. Парадокс Рассела 8
3.3. Базовые тождества 8

4. Функции **10**
4.1. Композиция функций 11
4.2. Критерий биективности 11

5. Булевы функции **13**
5.1. Определение 13
5.2. Свойства 13
5.3. Дизъюнктивная нормальная форма 14
5.4. Многочлен Жегалкина 15
5.5. Замыкание системы связок 16
5.6. Замкнутые классы 17
5.6.1. Класс L 17

5.6.2. Класс S 18
5.6.3. Классы T_0, T_1 20
5.6.4. Класс M 20
5.7. Предполные классы 22

6. Формула включений-исключений 24

7. Опять множества 24
7.1. Несчетные множества 26

1. Информация

1.1. Преподаватель

Максаев Артем Максимович
amaksaev@hse.ru
@artmak95

1.2. Оценка

По ДЗ можно получить 3 отсрочки.

Промежуточная аттестация

ДЗ: 25%
КР: 15%
КОЛЛ-1: 25%
ЛАБ-1: 5%
ЭКЗ: 30%

Итоговая оценка

ДЗ: 25%
КОЛЛ-1: 10%
КОЛЛ-2: 20%
ЛАБ-2: 5%
ЭКЗ-1: 15%
ЭКЗ-2: 25%

2. Математическая индукция

2.1. Что это такое?

Пример 2.1

Докажите, что если на плоскости проведены n прямых, то можно раскрасить полученные области в два цвета так, что никакие две соседних не покрашены в один цвет.

Выкинем прямую, покрасим для $n-1$, потом добавим прямую обратно и инвертируем полуплоскость.

Что необходимо для индукции?

1. База: $A(1)$ — истинно
2. Переход: $\forall n(A(n) \Rightarrow A(n+1))$

По принципу математической индукции $\forall n\ A(n)$ — истинно

Пример 2.2

$1+2+\ldots+n=\frac{n(n+1)}{2}$

База:

$$1=\frac{1\cdot 2}{2}$$

Переход:

$$\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)=(n+1)(\frac{n}{2}+1)=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Пример 2.3

$1+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{100^2}<2$

$A(n)=1+\frac{1}{2^2}+\ldots\frac{1}{n^2}\leq 2-\frac{1}{n}$

База:

$$1\leq 1$$

Переход:

$$1+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}\leq 2-\frac{1}{n}+\frac{1}{(n+1)^2}\leq$$
$$\leq 2-\frac{1}{n}+\frac{1}{n(n+1)}=2-\frac{1}{n+1}$$

Что нужно делать аккуратно:

- Не забыть проверить базу
- Убедиться, что переход работает для всех n (не забыть всякие крайние случаи $1 \to 2$ и т.п.)
- Не надо добавлять объект к конструкции на n элементах, надо выкинуть один из $n+1$

2.2. Полная индукция

Есть $A(1), A(2), \ldots, A(n), \ldots$
Главное отличие в переходе: $(\forall k < n\ A(k)) \Rightarrow A(n)$

Пример 2.4

Докажите, что выпуклый многоугольник можно триангулировать, причем всего будет $n-2$ треугольника.

2.3. Эквивалентность различных принципов индукции

1. Принцип математической индукции:

$$\left.\begin{array}{l} A(1) \\ \forall n\ A(n) \Rightarrow A(n+1) \end{array}\right\} \Rightarrow \forall n\ A(n)$$

2. Полная индукция:

$$((\forall k < n\ A(k)) \Rightarrow A(n)) \Rightarrow \forall n\ A(n)$$

3. Принцип наименьшего числа $\forall S \subseteq \mathbb{N}, S \neq \varnothing$ Тогда в S. есть наименьший элемент: $\exists s \in S : \forall t \in S\ s \leq t$

Теорема 2.5

Три вышеуказанных принципа индукции эквивалентны.

- $3 \to 1$

  Имеем $A(1), A(2), \ldots, A(n), \ldots$ и $A(n) \Rightarrow A(n+1)$

  $S = \{n \in N \mid A(n) - \text{ложно}\}$

  Либо S пустое, либо в нем есть минимальный элемент s. Но тогда либо $s = 1$ и неверна база, либо неверен переход $A(s-1) \Rightarrow A(s)$. Значит S пустое и все $A(n)$ верны.

- $2 \to 3$

  Есть $S \neq \varnothing$. Пусть S не имеет наименьшего элемента.

  $A(n) = n \notin S$

  $\forall k < n \ A(k) \Rightarrow A(n)$

  $\forall k < n \ k \notin S \Rightarrow n \notin S$ — иначе в S есть минимальный элемент.

  Тогда $\forall n \ n \notin S \Rightarrow S = \varnothing$

- $1 \to 2$

  $B(n) = A(1) \wedge A(2) \wedge \ldots \wedge A(n)$

$$\left.\begin{array}{l} B(1) = A(1) \\ B(n) \Rightarrow A(n) \Rightarrow A(n+1) \Rightarrow B(n+1) \end{array}\right\} \Rightarrow \forall n \ B(n)$$

3. Множества

$$X = \{a, b, c\}$$

Принятно, что множества упорядочены, а их элементы не повторяются, то есть

$$\{a, b, c\} = \{a, b, a, c, c, b\} = \{b, c, a\}$$

- $a \in X$ — a принадлежит X

  $a \notin X$ — a не принадлежит X

- $X \subseteq Y$ — X является подмножеством Y

  $\forall x\ (x \in X \Rightarrow x \in Y)$

- $X = Y \Leftrightarrow (X \subseteq Y \wedge Y \subseteq X)$

Пример 3.1

Примеры множеств:

- $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \ldots$
- $\{1, 2, 3, 5, 7\}$
- $\varnothing$ — пустое множество

Пример 3.2

Определение натуральных чисел через множества:

$$0 = \varnothing$$
$$n + 1 = n \cup \{n\}$$

3.1. Операции с множествами

1. Выделение условием

   X — множество

   $Y = \{x \in X \mid \phi(x)\}$

2. Объединение

   A, B — множества

   $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

3. Пересечение

   A, B — множества

   $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

4. Разность множеств

   A, B — множества

   $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

5. Симметрическая разность

   A, B — множества

   $A \oplus B = \{x \mid x$ лежит в ровно одном из $A, B\}$

6. Взятие всех подмножеств X

   $2^X = \{Y \mid Y \subseteq X\}$

7. Дополнение

   $\overline{A} = U \setminus A$

3.2. Парадокс Рассела

$R = \{x \mid x \notin x\}$
Лежит ли R в R

- $R \in R \Rightarrow R \notin R$
- $R \notin R \Rightarrow R \in R$

Получили парадокс.

Мы использовали выделение условием, но мы можем выделять только из другого множества. Но на самом деле “множество” всех множеств не является множеством.

Чтобы такого не происходило, существует аксиоматика Цермело-Френкеля — ZF или ZFC (с аксиомой выбора)

3.3. Базовые тождества

1. $A \cup B = B \cup A$
2. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
3. $A \cap \varnothing = \varnothing$
4. $A \cup \varnothing = A$

5. $A \cap B = B \cap A$
6. $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$

4. Функции

Определение 4.1: Упорядоченная пара

$(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$

Определение 4.2: Декартово произведение

Декартово произведение множеств A и B обозначается $A \times B$ и является множеством всех упорядоченных пар (a, b), где $a \in A, b \in B$.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Определение 4.3: Функция

Подмножество f декартова произведения $X \times Y$ называется функцией из X в Y ($f : X \to Y$), если $\forall x \in X \; \exists! \; (x, y) \in f$

$y = f(x)$.
x — прообраз y, y — образ x.
X — область определения, Y — область значений.

Когда пишут $f : X \to Y$ обычно считают, что X — полная область определения, то есть f определена на всем X. Тогда f — тотальная функция.

Определение 4.4: Инъекция

f — инъекция (вложение) множества X на множество Y, если

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Определение 4.5: Сюръекция

f — сюръекция (накрытие) множества X на множество Y, если

$$\forall y \in Y \; \exists x \in X : f(x) = y$$

Определение 4.6: Биекция

f — биекция множества X на множество Y, если она является и сюръекцией, и инъекцией.

4.1. Композиция функций

Определение 4.7: Композиция

Пусть есть тотальные $f : A \to B, g : B \to C$
Определим функцию $g \circ f : A \to C$
$(g \circ f)(a) = g(f(a))$

Теорема 4.8: Ассоциативность композиции

Пусть есть тотальные $f : A \to B, g : B \to C, h : C \to D$
$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$

Доказательство:

$$h \circ (g \circ f) : A \to D$$
$$(h \circ (g \circ f))(a) = h((g \circ f)(a)) = h(g(f(a)))$$
$$(h \circ g) \circ f : A \to D$$
$$((h \circ g) \circ f)(a) = (h \circ g)(f(a)) = h(g(f(a)))$$

4.2. Критерий биективности

Определение 4.9: Тождественная на X функция

Определим на множестве X функцию $id_X : X \to X$

$$\forall x \in X \; id_X(x) = x$$

Замечание. $f \circ id_A = f$

Замечание. $id_B \circ f = f$

Теорема 4.10: Критерий биективности функций

Пусть $f : A \to B$.
Тогда f — биекция $\Leftrightarrow \exists g : B \to A : f \circ g = id_B, g \circ f = id_A$

Доказательство:

- $\Rightarrow$

  Построим $g : B \to A$

  $g(b) \in f^{-1}(b)$

  Тогда $f(g(b)) = b \Rightarrow f \circ g = id_B$.

  $g(f(a)) \in f^{-1}(f(a)) = fa \Rightarrow g(f(a)) = a \Rightarrow g \circ f = id_A$

- $\Leftarrow$

  $\exists g : B \to A : f \circ g = id_A, g \circ f = id_B$

  1. Покажем, что f — инъекция
     $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow g(f(a_1)) = g(f(a_2)) \Rightarrow id_A(a_1) = id_A(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$
  2. Покажем, что f — сюръекция
     Рассмотрим $b \in B$. Найдем $a \in A : f(a) = b$.

$$(f \circ g)(b) = b$$
$$f(g(b)) = b$$
$$a = g(b) \in A - \text{подходит}$$

  f — сюръекция и инъекция, а значит f — биекция.

Определение 4.11: Обратная функция

Пусть $f : A \to B$ — биекция
Тогда $g : B \to A$, для которой $f \circ g = id_B$ и $g \circ f = id_A$, называют обратной к f и обозначают f^{-1}

Упражнение 4.12

Если f — биекция, то f^{-1} единственна

Лемма 4.13

Пусть $f : A \to B, g : B \to C$ — биекции
Тогда

- $g \circ f$ биективна
- $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

Доказательство:
Просто проверим критерий биективности, используя две эти функции.

Упражнение 4.14

$f : A \to B, g : B \to C$

1. если f, g — инъекции, то $g \circ f$ — инъекция
2. если f, g — сюръекции, то $g \circ f$ — сюръекция

5. Булевы функции

5.1. Определение

Определение 5.1: Булева функция

$\mathbb{B} = \{0, 1\}$
Булева функция — это $f : \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}$

Пример 5.2

x	y	$x \vee y$	$x \wedge y$	$\neg x$	$x \oplus y$	$x \to y$	$x \equiv y$
0	0	0	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	1	1

Количество булевых функций от n переменных равно 2^{2^n}

5.2. Свойства

Упражнение 5.3

- $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z,\ x \wedge y = y \wedge x,\ x \wedge 0 = 0,\ x \wedge 1 = x$
- $x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z,\ x \vee y = y \vee x,\ x \vee 0 = x,\ x \vee 1 = 1$
- $x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z,\ x \oplus y = y \oplus x,\ x \oplus 0 = x,\ x \oplus 1 = \neg x$
- $x \wedge (y \oplus z) = (x \wedge y) \oplus (x \wedge z)$
- $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z),\ x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$
- $\neg(\neg x) = x$ — закон двойного отрицания
- $x \to y = \neg y \to \neg x$ — контрапозиция
- $\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y,\ \neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$ — законы де Моргана

5.3. Дизъюнктивная нормальная форма

$\neg x = \overline{x}$

Для $\alpha \in \{0, 1\}$ $x^\alpha = \begin{cases} x, \text{при } \alpha = 1 \\ \overline{x}, \text{при } \alpha = 0 \end{cases}$ — литерал

Определение 5.4: Конъюнкт

$$x_{i_1}^{\alpha_1} \wedge x_{i_2}^{\alpha_2} \wedge \ldots \wedge x_{i_k}^{\alpha_k} = K$$

Определение 5.5: Дизъюнктивная нормальная форма

ДНФ — дизъюнкция конъюнктов

$$K_1 \vee K_2 \vee \ldots \vee K_n$$

Теорема 5.6

Каждая булева функция $f : \mathbb{B}^n \to \mathbb{B}$ может быть представлена в виде ДНФ

Доказательство:

Пусть $f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \not\equiv 0$

Если $f(\sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n) = 1$, возьмем конъюнкт $K = x_1^{\sigma_1} \wedge x_2^{\sigma_2} \wedge \ldots \wedge x_n^{\sigma_n}$. Очевидно, он принимает значение 1 только на наборе своих степеней.

Возьмем произведение этих конъюнктов по всем наборам f, где она равна 1

Это представление называется совершенное ДНФ (СДНФ).

Определение 5.7: Дизъюнкт

$$x_{i_1}^{\alpha_1} \vee x_{i_2}^{\alpha_2} \vee \ldots \vee x_{i_k}^{\alpha_k} = K$$

Определение 5.8: Конъюктивная нормальная форма

КНФ — конъюнкция дизъюнктов

$$D_1 \vee D_2 \vee \ldots \vee D_n$$

Упражнение 5.9

Любая булева функция имеет КНФ

5.4. Многочлен Жегалкина

Определение 5.10: Многочлен Жегалкина

$$\bigoplus_{\substack{I=\{i_1,i_2,\ldots,i_k\}\subseteq\{1,2,\ldots,n\} \\ a_i \in \{0,1\}}} a_i \wedge x_{i_1} \wedge x_{i_2} \wedge \ldots \wedge x_{i_k}$$

По сути каждый возможный моном либо входит в сумму, либо нет.

Пример 5.11

$$x \vee y = x \oplus y \oplus (x \wedge y) = x + y + xy$$

Теорема 5.12

Каждая булева функция $f : \mathbb{B}^n \to B$ имеет представление в виде многочлена Жегалкина (от n переменных), и притом единственное с точностью до перестановки мономов

Доказательство:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = (x_n \wedge f(x_1, \ldots, x_{n-1}, 1)) \oplus ((x_n \oplus 1) \wedge f(x_1, \ldots, x_{n-1}, 0)$$

Теперь докажем по индукции, что всякая функция представима в виде многочлена Жегалкина:

База $n = 1$: очевидно

Переход $n \to n + 1$:

$$f_0(x_1, \ldots, x_{n-1}) = f(x_1, \ldots, x_{n-1}, 0),\ f_1(x_1, \ldots, x_{n-1}) = f(x_1, \ldots, x_{n-1}, 1)$$

По формуле выше:

$$f(x_1, \ldots, x_n) = (x_n \wedge f_1(x_1, \ldots, x_{n-1})) \oplus ((x_n \oplus 1) \wedge f_0(x_1, \ldots, x_{n-1}))$$

По индукции f_0, f_1 представимы в виде многочлена Жегалкина, остается просто раскрыть скобки.

Покажем единственность:

Всего 2^{2^n} различных булевых функций. Также всего различных 2^{2^n} различных многочленов Жегалкина. Значит каждой функции сопоставлен уникальный многочлен Жегалкина.

5.5. Замыкание системы связок

Определение 5.13

P_2 — множество всех булевых функций
$P_2(n)$ — множество всех булевых функций от $x_1, \ldots, x_n$
$\mathcal{F} \subseteq P_2$ — систему связок

Пример 5.14

- $\{\vee, \wedge, \neg\}$
- $\{\vee, \oplus, 1\}$

Определение 5.15

Замыкание $\mathcal{F}$ — это $[\mathcal{F}]$, равное следующему:

$$\mathcal{F}_0 = \mathcal{F} \cup \{x_1, x_2, \ldots\}$$

$$\mathcal{F}_k \to \mathcal{F}_{k+1} : \begin{cases} F_k \subseteq F_{k+1} \\ g = h(f_1(y_1^{(1)}, \ldots y_{l_1}^{(1)}), \ldots, f_s(y_1^{(s)}, \ldots y_{l_s}^{(s)})) \in F_{k+1} \end{cases}$$

$$[\mathcal{F}] = \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathcal{F}_k$$

Пример 5.16

- $[\{\wedge, \vee, \neg\}] = P_2$ (ДНФ)
- $[\{\wedge, \oplus, 1\}] = P_2$ (многочлены Жегалкина)

Определение 5.17

$\mathcal{F} \subseteq P_2$ — полная система связок, если $[\mathcal{F}] = P_2$

Упражнение 5.18

- $\mathcal{F} \subseteq [\mathcal{F}]$
- $A \subseteq B \Rightarrow [A] \subseteq [B]$
- $[[\mathcal{F}]] = [\mathcal{F}]$

Лемма 5.19: Достаточное условие полноты системы

Пусть $A \subseteq P_2$ — полная система и $\forall f \in A$ верно, что $f \in [B]$
Тогда B — полная система.

Доказательство:

$$A \subseteq [B] \Rightarrow [A] \subseteq [[B]] = B \Rightarrow P_2 \subseteq [B] \Rightarrow [B] = P_2$$

Следствие 5.20

$\{\wedge, \neg\}, \{\vee, \neg\}$ — полные системы

Доказательство:
$B = \{\wedge, \neg\}$
$A = \{\wedge, \vee, \neg\},\ [A] = P_2$
$x \vee y = \neg(\neg x \wedge \neg y) \in [B]$
Для второй системы аналогично

5.6. Замкнутые классы

Определение 5.21

Пусть $F \subseteq P_2$. F называется замкнутым классом, если $[F] = F$

Пример 5.22

- $F = P_2$
- $F = [A],\ A \in P_2, A \neq \varnothing$
- $F = L$

5.6.1. Класс L

Определение 5.23: Класс L

$f(x_1, \ldots, x_n)$ — линейная, если

$$f(x_1, \ldots, x_n) = a_0 \oplus (a_1 \oplus x_1) \oplus \ldots \oplus (a_n \oplus x_n)$$

Определение 5.24

L — все линейные функций.

Замечание. $[L] = L$

Лемма 5.25: Лемма о нелинейной функции

Из любой нелинейной функции $f(x_1, \dots x_n), n > 1$ подстановкой вместо переменных $0, x, y$ можно получить $g(x, y) \notin L$

Доказательство:

Рассмотрим полином Жегалкина для f и выберем моном наименьшей длины, большей 1.

Не умаляя общности, это моном $x_1 x_2 \dots x_r, r > 1$.

Рассмотрим $g(x, y, \dots, y, 0, \dots 0$ (последние $n-r$ — нули). Нетрудно убедиться, что получим $xy + linear \Rightarrow$ получили нелинейную функцию g.

Следствие 5.26

Пусть $f \notin L$, тогда $x \wedge y \in [\{0, \neg, f\}]$

Доказательство:

По лемме построим $g(x, y)$. Понятно, что $g(x, y) \in [\{f, 0\}]$.

$$g(x, y) = xy + ax + by + c, \ a, b, c \in \{0, 1\}$$
$$g(x + b, y + a) = (x + b)(y + a) + a(x + b) + b(y + a) + c =$$
$$= xy + by + xa + ba + ax + ab + by + ab + c = xy + ab + c$$
$$g(x + b, y + a) = \left[\begin{array}{c} x \wedge y \\ \neg(x \wedge y) \end{array}\right. \in [\{f, 0, \neg x\}]$$
$$\Downarrow$$
$$x \wedge y \in [\{f, 0, \neg x\}]$$

5.6.2. Класс S

Определение 5.27

Пусть $f(x_1, \dots, x_n) \in P_2$

Тогда двойственная булевая функция к f — это $f^* = \neg f(\neg x_1, \dots, \neg x_n)$

Пример 5.28

- $x^* = \neg\neg x = x$
- $(x \wedge y)^* = \neg(\neg x \wedge \neg y) = x \vee y$
- $(f^*)^* = f$

Лемма 5.29: Принцип двойственности

$f(x_1, \ldots, x_n) = f_0(f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_n(x_1, \ldots, x_n))$
Тогда
$f(x_1, \ldots, x_n) = f_0^*(f_1^*(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_n^*(x_1, \ldots, x_n))$

Определение 5.30: Класс S

$S = \{f \in P_2 : f = f^*\}$ — самодвойственные функции.

Пример 5.31

- $x = x^*$
- $MAJ(x, y, z) = MAJ^*(x, y, z)$
- $(x \oplus y)^* = \neg(\neg x \oplus \neg y) = x \oplus y \oplus 1 = x \equiv y$

Лемма 5.32

$$[S] = S$$

Доказательство:

$$h(x_1, \ldots, x_n) = f_0(f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_n(x_1, \ldots, x_n)) =$$
$$= f_0^*(f_1^*(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_n^*(x_1, \ldots, x_n)) = h^*(x_1, \ldots, x_n)$$

Лемма 5.33: Лемма о самодвойственной функции

Пусть $f(x_1, \ldots, x_n) \notin S$
Тогда подстановкой вместо переменных $x, \neg x$ можно получить константу.

Доказательство:

$$\exists(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{B}^n : f(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = f(\overline{\alpha_1}, \ldots, \overline{\alpha_n}) \ (f \notin S)$$
$$x_i \to \begin{cases} x, \alpha_i = 0 \\ \neg x, \alpha_i = 1 \end{cases}$$
$$g(0) = f(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) = f(\overline{\alpha_1}, \ldots, \overline{\alpha_n}) = g(1)$$

5.6.3. Классы T_0, T_1

Определение 5.34: T_0, T_1

$$T_0 = \{f \in P_2 : f(0, \dots, 0) = 0\}$$
$$T_1 = \{f \in P_2 : f(1, \dots, 1) = 1\}$$

Пример 5.35

- $x \wedge y, x \vee y \in T_0, T_1$
- $1 \in T_1, 0 \in T_0$
- $x \oplus y \in T_0 \setminus T_1$

Лемма 5.36: Лемма о функции, не сохраняющей константу

1. $f \notin T_0 \Rightarrow f(x, \dots, x) \in \{1, \neg x\}$
2. $f \notin T_1 \Rightarrow f(x, \dots, x) \in \{0, \neg x\}$

5.6.4. Класс M

Определение 5.37

$$0 < 1$$
$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \leq (\beta_1, \dots, \beta_2)$$
$$\Updownarrow$$
$$\forall i \ \alpha_i \leq \beta_i$$

Определение 5.38: Монотонная функция

$f(x_1, \dots, x_n)$ — монотонная, если $\forall \tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathbb{B}^n : (\tilde{\alpha} < \tilde{\beta} \Rightarrow f(\tilde{\alpha}) \leq f(\tilde{\beta}))$

Определение 5.39: Класс M

$$M = \{f \in P_2 : f - \text{ монотонная}\}$$

Пример 5.40

- $1, 0 \in M$
- $MAJ \in M$
- $x \oplus y \notin M$

Упражнение 5.41

$$[M] = M$$

Лемма 5.42: Лемма о немонотонной функции

Пусть $f \notin M$.
Тогда подставляя в f вместо переменных $0, 1, x$ можно получить $\neg x$.

Доказательство:

$$f \notin M \Rightarrow \exists \tilde{\alpha}, \tilde{\beta} \in \mathbb{B}^n : \tilde{\alpha} \leq \tilde{\beta}, f(\tilde{\alpha}) = 1, f(\tilde{\beta}) = 0$$
$$\tilde{\alpha} = (0, \dots, 0, 1, \dots 1, 0, \dots 0)$$
$$\tilde{\beta} = (0, \dots, 0, 1, \dots 1, 1, \dots 1)$$

различающиеся позиции есть, так как значения функции на наборах различны

$$g(x) = (0, \dots, 0, 1, \dots 1, x, \dots x)$$
$$g(0) = f(\tilde{\alpha}) = 1$$
$$g(1) = f(\tilde{\beta}) = 0$$

Теорема 5.43: Критерий Поста

F — полная $\Leftrightarrow F \not\subseteq L, F \not\subseteq S, F \not\subseteq T_0, F \not\subseteq T_1, F \not\subseteq M$

Доказательство:

- $\Rightarrow$

  Тривиально

- $\Leftarrow$

  Покажем, что $x \wedge y, \neg x \in [F]$

  Дано: $\exists f_M \in F \setminus M, f_L \in F \setminus L, f_{T_0} \in F \setminus T_0, f_{T_1} \in F \setminus T_1, f_S \in F \setminus S$

По лемме о функции, не сохраняющей константу:

$$f_{T_0}(x, \dots x) = \left[\begin{array}{l} 1 \in [F] \\ \neg x \in [F] \end{array}\right.$$
$$f_{T_1}(x, \dots x) = \left[\begin{array}{l} 0 \in [F] \\ \neg x \in [F] \end{array}\right.$$

Рассмотрим два случая:

1. $0, 1 \in [F]$
   По лемме о немонотонной функции: $f_M, 0, 1, x \to \neg x \in [F]$
2. $\neg x \in [F]$
   Лемма о несамодвойстенной функции: $f_S, x, \neg x \to const \Rightarrow 0, 1 \in [F]$

Значит $0, 1, \neg x \in [F]$.

По лемме о нелинейной функции и следствию из нее:

$x \wedge y \in [\{0, f_L, \neg x\}] \ \subseteq [F]$

Получили, что $\neg x, x \wedge y \in [F] \Rightarrow [F] = [[F]] = P_2$

5.7. Предполные классы

Определение 5.44: Предполный класс

$F \subseteq P_2$ — предполный класс (в P_2), если

- $[F] = F$
- $F \neq P_2$
- $\forall g \in P_2 \setminus F \ [F \cup \{g\}] = P_2$

Теорема 5.45

В P_2 существует лишь 5 предполных классов: L, S, M, T_0, T_1

Доказательство:
Пусть $F \neq L, S, M, T_0, T_1$ — предполный.
Тогда $[F] = F \neq P_2$.
По критерию Поста $F \subseteq L$ или S или M или T_0 или T_1. Не умаляя общности, $F \subseteq L$. Тогда $\exists g_L \in L \setminus F \Rightarrow P_2 = [F \cup \{g_L\}] \subseteq L$ — противоречие.
Почему эти пять классов подходят?

	T_0	T_1	M	S	L
T_0		0	$x \oplus y$	0	$x \wedge y$
T_1	1		$x \equiv y$	1	$x \wedge y$
M	1	0		1	$x \wedge y$
S	$\neg x$	$\neg x$	$\neg x$		$MAJ(x, y, z)$
L	1	0	$x \oplus y$	1	

6. Формула включений-исключений

Теорема 6.1: Формула включений-исключений

$$|A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n| = \sum_{k=1}^{n} \sum_{1 \le i_1 < \ldots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap \ldots \cap A_{i_k}|$$

Доказательство (через характеристические функции):

7. Опять множества

Определение 7.1: Равномощные множества

Множества A и B равномощны, если существует биекция $f : A \to B$
Обозначается $A \sim B, |A| = |B|$

Пример 7.2

- $\mathbb{N} \sim \mathbb{N} \cup \{0\}$ $n \mapsto n - 1$
- $[0, 1] \sim [0, 2]$ $x \mapsto 2x$
- $(0, 1) \sim (1, +\infty)$ $x \mapsto \frac{1}{x}$

Упражнение 7.3

$[a, b] \sim [c, d],\ a, b, c, d \in \mathbb{R}$

Свойства:

1. $\forall A\ A \sim A$ (рефлексивность)
2. $\forall A, B\ A \sim B \Rightarrow B \sim A$ (симметричность)
3. $\forall A, B, C\ A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$ (транзитивность)

Определение 7.4: Счетные множества

Множество A счетно, если $A \sim \mathbb{N}$

Пример 7.5

- $\mathbb{Z} \sim \mathbb{N}$
- $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$

Лемма 7.6

- A, B — счетны $\Rightarrow A \cup B$ — счетно
- A — конечно, B — счетно $\Rightarrow A \cup B$ — счетно

Лемма 7.7

A — счетно, $B \subseteq A$.
Тогда B не более чем счетно.

Лемма 7.8

A — бесконечно, тогда существует счетное $B \subseteq A$

Доказательство:
Будем строить итеративно: берем любой $a_{n+1} \in A \setminus \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$.

$$B_n = \{a_1, \ldots, a_n\}, B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

Лемма 7.9

$A_1, A_2, \ldots, A_n, \ldots$ — счетны
Тогда $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} \Rightarrow A_n$ — счетно

Лемма 7.10

A, B — счетны
Тогда $A \times B$ — тоже счетно

Доказательство:

$$A \times B = \bigcup_{n=1}^{\infty} A \times \{B_n\}$$

Теорема 7.11

Пусть A — бесконечно, а B — счетно.
Тогда $A \cup B \sim A$

Доказательство:

$$A \cup B = A \cup (B \setminus A)$$
$$A \cup B = A \cup B', A \cap B' = \varnothing$$

Рассмотрим счетное C
$C \sim C \cup B'$
$\exists f : C \to C \cup B'$ — биекция
Построим биекцию $g : A \to A \cup B'$

$$g = \begin{cases} x, x \notin C \\ f(x), x \in C \end{cases}$$

7.1. Несчетные множества

Счетные ($\sim A$): $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{N}^k, \bigcup\limits_{k=1}^{n} \mathbb{N}^k$

Определение 7.12

$$\mathbb{B}^\infty = \{(b_1, b_2, \ldots) \mid b_i \in \{0, 1\}\}$$

Теорема 7.13

$$\mathbb{B}^\infty \not\sim \mathbb{N}$$

Лемма 7.14

$$\mathbb{B}^\infty \sim [0, 1) \sim [0, 1] \sim (0, 1) \sim \mathbb{R} \sim 2^{\mathbb{N}}$$

Доказательство:
$\mathbb{B}^\infty \sim [0, 1)$, так как можно сопоставить последовательности число в двоичной записи.
Все кроме последнего тривиально.
$2^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{B}^\infty$, так как по сути выбираем что взяли в набор, а что нет.

Определение 7.15

Множество A имеет мощность континуум, если $A \sim \mathbb{R}$

Теорема 7.16

$$[0, 1] \sim [0, 1]^2$$

Будем доказывать $\mathbb{B}^\infty = (\mathbb{B}^\infty)^2$
$(x_1, x_2, \ldots) \leftrightarrow (x_1, x_3, \ldots)(x_2, x_4, \ldots)$

Следствие 7.17

$$\mathbb{R}^k \sim \mathbb{R}$$

Определение 7.18

$|A| \leq |B|$, если существует инъекция $f : A \to B$
$|A| < |B|$, если $|A| \leq |B|$ и $|A| \neq |B|$

Свойства:

- $|A| \leq |B| \Leftrightarrow \exists A' \subseteq B : A' \sim A$
- $|A| \leq |A|$
- $|A| \leq |B|, |B| \leq |C| \Rightarrow |A| \leq |C|$
- $|A| \leq |B|, |B| \leq |A| \Rightarrow |A| \sim |B|$ (теорема Кантора-Бернштейна)
- $\forall A, B\ |A| \leq |B| \vee |B| \leq |A|$

Теорема 7.19

$$|X| < |2^X|$$

Доказательство:

1. $|X| \leq |2^X|$
   $\exists f : X \to 2^X$, $f(x) = x$ — инъекция
2. $|X| \neq |2^X|$
   Докажем от противного. Пусть существует $f : X \to 2^X$.
   Определим $Y = \{x \in X \mid x \notin f(x)\} \subseteq X$.
   Поскольку $Y \in 2^X, \exists y \in X : f(y) = Y$
   - $y \in Y \Rightarrow y \notin f(y) = Y$ — противоречие
   - $y \notin Y \Rightarrow y \in f(y) = Y$ — противоречие

Следствие 7.20

Существует бесконечно много мощностей.

$$\mathbb{N} < 2^{\mathbb{N}} < 2^{2^{\mathbb{N}}} < \dots$$

Теорема 7.21: Теорема Кантора Бернштейна

$$|A| \leq |B|, |B| \leq |A| \Rightarrow |A| = |B|$$

Доказательство:
Пусть $f : A \to B, g : B \to A$ — инъекции.
Определим $C_0 = A \setminus g(B)$. $A \supseteq C_{n+1} = g(f(C_n)), n \geq 0$
$C = \bigcup\limits_{n \geq 0} C_n$

Возьмем $h = \begin{cases} f(x), x \in C \\ g^{-1}(x), x \notin C \end{cases}$, $(x \notin C \Rightarrow x \notin C_0 \Rightarrow x \in g(B))$

Покажем, что мы построили биекцию.

1. h — инъекция

   $h(x_1) = h(x_2)$

   - $x_1, x_2 \in C \Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
   - $x_1, x_2 \notin C \Rightarrow g^{-1}(x_1) = g^{-1}(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
   - $x_1 \in C, x_2 \notin C \Rightarrow f(x_1) = g^{-1}(x_2)$. Но тогда $g(f(x_1)) = x_2$. $x_1 \in C_n \Rightarrow x_2 \in C_{n+1}$ — противоречие.

2. h — сюръекция

   Хотим найти такой x, что $h(x) = y$

   - $y \in f(C) \Rightarrow y = f(x) = h(x)$
   - $y \notin f(C)$.
     Рассмотрим $g(y)$
     Если $g(y) \notin C$, то $h(g(y)) = y$.
     В противном случае $g(y) \in C_n, n > 0$.
     В таком случае $g(y) = g(f(x')), x \in C_{n-1} \Rightarrow y = f(x') = h(x')$, так как $x' \in C$.