

คู่มือศัพท์ปฏิบัติการทางการแพทย์

เอกสารนี้เป็นชุดข้อมูล PDF สำหรับ Medical RAG AI ใช้คู่กับไฟล์ CSV ชื่อ medical_terms_glossary.csv
PDF อธิบายบริบทและการใช้คำในเวิร์ด ส่วน CSV เก็บศัพท์เป็นตาราง term, thai, kind, definition

บทที่ 1 แนวคิดที่ใช้แยกอาการและโรค

Symptom คือสิ่งที่ผู้ป่วยบอกเอง เช่น ปวด ทิวน้ำ หายใจลำบาก

Sign คือสิ่งที่ผู้ตรวจวัดหรือเห็นได้ เช่น ไข้ ความดันโลหิต เชื้อยวคล้ำ

Diagnosis คือการสรุปโรคจากประวัติ ตรวจร่างกาย และผลแล็บ

Differential diagnosis คือรายชื่อโรคที่ต้องแยกก่อนสรุป

ตัวอย่าง: ผู้ป่วยบอกว่าเหนื่อย (symptom) ผู้ตรวจพบ cyanosis และ SpO2 ต่ำ (sign) จึงคิดถึง hypoxia และโรคปอดหรือหัวใจ

เอกสารนี้ไม่ใช่แนวทางรักษา ให้ใช้เพื่อทบทวนศัพท์เท่านั้น

บทที่ 2 ศัพท์ห้องปฏิบัติการที่พบบ่อย

CBC คือการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

- Anemia หมายถึงฮีโมโกลบินต่ำ ผู้ป่วยซีด เหนื่อยง่าย
- Leukocytosis เม็ดเลือดขาวสูง มักสัมพันธ์กับ infection
- Thrombocytopenia เกล็ดเลือดต่ำ เสี่ยงเลือดออก

น้ำตาลในเลือด:

- Hyperglycemia พบบ่อยใน diabetes mellitus
- Hypoglycemia อันตราย เพราะอาจสับสนหรือหมดสติ

เมื่อสงสัยการติดเชื้อรุนแรง ต้องคิดถึง sepsis คือการตอบสนองต่อการติดเชื้อจนอวัยวะล้มเหลว

คำที่ใช้คู่กัน: infection คือการติดเชื้อ inflammation คือการอักเสบ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีเชื้อ

บทที่ 3 หัวใจ หลอดเลือด และสมอง

Hypertension คือความดันโลหิตสูงเรื้อรัง เพิ่มความเสี่ยง stroke และโรคไต

Hypotension คือความดันต่ำ อาจจาก dehydration หรือช็อก

Ischemia คือเนื้อเยื่อขาดเลือด หากเกิดที่หัวใจจนเซลล์ตายเรียก myocardial infarction

Heart failure คือหัวใจสูบฉีดไม่พอ มักมี dyspnea และ edema ที่ขา

Arrhythmia ครอบคลุมทั้ง tachycardia (เร็ว) และ bradycardia (ช้า)

Stroke คือสมองขาดเลือดหรือเลือดออกเฉียบพลัน สังเกตพูดไม่ชัด ปากเบี้ยว อ่อนแรงซีกหนึ่ง

Syncope คือเป็นลมจากเลือดไปเลี้ยงสมองลดลง ต้องแยกจาก seizure

ถ้ามี chest pain ร่วมเหงื่อออกเย็น ให้คิดถึง myocardial infarction จนกว่าจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่

บทที่ 4 ระบบหายใจและทางเดินอาหาร

Dyspnea คือหายใจลำบาก พบใน pneumonia, asthma, COPD และ heart failure

Cyanosis คือเขียวคล้ำ เป็น sign ของ hypoxia

Pneumonia คือปอดอักเสบจากเชื้อ มีไข้ ไอ ออกซิเจนต่ำ

Asthma เป็นพักๆ จากหลอดลมตีบ COPD มักเรื้อรังในผู้สูบบุหรี่

ทางเดินอาหาร:

- Hematemesis คืออาเจียนเป็นเลือด

- Melena คืออุจจาระดำจากเลือดส่วนบน

- Jaundice คือตาเหลืองจากบิลิรูบินสูง พบบ่อยใน hepatitis และ cirrhosis

Appendicitis คือไส้ติ่งอักเสบ รักษาด้วย appendectomy

Endoscopy ใช้ส่องทางเดินอาหารส่วนบน โดยเฉพาะเมื่อมี hematemesis ผู้ป่วยมักต้อง NPO ก่อนทำ

บทที่ 5 คำสั่งในวอร์ดและค่าย่อ

NPO งดน้ำงดอาหาร ใช้ก่อนส่องกล้องหรือผ่าตัด

PRN ให้เมื่อมีอาการ เช่น ยาแก้ปวดเมื่อมี pain

BID วันละ 2 ครั้ง TID วันละ 3 ครั้ง

IV เข้าหลอดเลือดดำ IM เข้ากล้ามเนื้อ

BMI ดัชนีมวลกาย สัมพันธ์กับความเสี่ยง diabetes mellitus

Polyuria คือปัสสาวะมาก Polydipsia คือกระหายน้ำมาก มักพบด้วยกันในเบาหวานที่ไม่ควบคุม

Pain ต้องถามตำแหน่ง ลักษณะ ระยะเวลา สิ่งกระตุ้น และสิ่งที่บรรเทา

Fever เป็น sign ร่วมของการติดเชื้อได้บ่อย แต่ไม่มีไข้ก็ยังไม่เป็น sepsis ได้

วิธีใช้เอกสารคู่กัน: อ่านคำอธิบายยาวใน PDF นี้ แล้วเปิดตาราง CSV เพื่อดู kind และความสัมพันธ์ระหว่างศัพท์