

Линейная алгебра и геометрия

Содержание

1	Основные определения и свойства	2
1.1	Введение	2
1.2	Сложение матриц и умножение на скаляр	2
1.3	Умножение матриц	3
1.4	След матрицы	3
2	Системы линейных уравнений	4
2.1	Элементарные преобразования СЛУ	4
2.2	Перестановки	5
2.3	Обратные матрицы	5

1 Основные определения и свойства

1.1 Введение

Определение 1. Матрица размера $m \times n$ – это прямоугольная таблица, состоящая из m строк и n столбцов. Множество матриц размера $m \times n$ над полем F обозначается как $\text{Mat}_{m \times n}(F)$.

Определение 2. Матрицы $A, B \in \text{Mat}_{m \times n}$ называются равными, если:

$$\forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n \ a_{ij} = b_{ij}$$

Определение 3. Пространством $\mathbb{R}^n$ называется:

$$\mathbb{R}^n := \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$$

Определение 4. Матрица $A \in \text{Mat}_{n \times n}$ (или $A \in M_n$) называется квадратной порядка n .

Определение 5. Матрица $A \in M_n$ называется диагональной, если:

$$\forall i, j, i \neq j \ a_{ij} = 0$$

Такие матрицы обозначаются $\text{diag}(a_1, \dots, a_n)$, где a_k – k -й элемент главной диагонали.

Определение 6. Матрица $E_n = \text{diag}(1, \dots, 1)$ называется единичной матрицей порядка n .

Определение 7. Пусть $A \in \text{Mat}_{m \times n}$. Транспонированной матрицей $B = A^T \in \text{Mat}_{n \times m}$ называется матрица, для которой:

$$\forall i, j \ b_{ij} = a_{ji}$$

1.2 Сложение матриц и умножение на скаляр

Определение 8. Пусть $A, B \in \text{Mat}_{m \times n}$. Суммой матриц A и B называется:

$$A + B := C \in \text{Mat}_{m \times n} : c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \ \forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$$

Определение 9. Пусть $A \in \text{Mat}_{m \times n}, \lambda \in \mathbb{R}$. Умножением матрицы A на скаляр λ называется:

$$\lambda A := B \in \text{Mat}_{m \times n} : b_{ij} = \lambda a_{ij} \ \forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$$

Утверждение 1.1 (Свойства сложения матриц и умножения на скаляр). Пусть $A, B, C \in \text{Mat}_{m \times n}, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. $A + B = B + A$ (коммутативность сложения);
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$ (ассоциативность сложения);
3. $A + 0 = A$ (нейтральный элемент по сложению);
4. $1 \cdot A = A$ (нейтральный элемент по умножению на скаляр);
5. $A + (-A) = 0$ (противоположный элемент по сложению);
6. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ (дистрибутивность относительно сложения);
7. $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$ (дистрибутивность относительно скаляров);
8. $\lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A$ (ассоциативность умножения на скаляр).

1.3 Умножение матриц

Определение 10. Пусть $A \in \text{Mat}_{m \times n}$, $B \in \text{Mat}_{n \times p}$, умножением матриц A и B называется:

$$AB := C \in \text{Mat}_{m \times p}: c_{ij} = A_{(i)}B^{(j)} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Утверждение 1.2 (Левая дистрибутивность умножения).

$$A(B + C) = AB + AC; \quad A \in \text{Mat}_{m \times n}, B, C \in \text{Mat}_{n \times p}$$

Доказательство. Пусть $X = A(B + C), Y = AB + AC$. Тогда:

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}(b_{kj} + c_{kj}) = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj} + \sum_{k=1}^n a_{ik}c_{kj} = y_{ij}$$

■

Утверждение 1.3 (Правая дистрибутивность умножения).

$$(A + B)C = AC + BC; \quad A, B \in \text{Mat}_{m \times n}, C \in \text{Mat}_{n \times p}$$

Утверждение 1.4.

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B); \quad A \in \text{Mat}_{m \times n}, B \in \text{Mat}_{n \times p}, \lambda \in \mathbb{R}$$

Утверждение 1.5 (Ассоциативность умножения).

$$(AB)C = A(BC); \quad A \in \text{Mat}_{m \times n}, B \in \text{Mat}_{n \times p}, C \in \text{Mat}_{p \times q}$$

Доказательство. Пусть $X = (AB)C, Y = A(BC), U = AB, V = BC$. Тогда:

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^p u_{ik}c_{kj} = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{l=1}^n a_{il}b_{lk} \right) c_{kj} = \sum_{l=1}^n \left(a_{il} \sum_{k=1}^p b_{lk}c_{kj} \right) = \sum_{l=1}^n a_{il}v_{lj} = y_{ij}$$

■

Утверждение 1.6.

$$(AB)^T = B^T A^T; \quad A \in \text{Mat}_{m \times n}, B \in \text{Mat}_{n \times p}$$

Доказательство. Пусть $X = (AB)^T, Y = B^T A^T$. Тогда:

$$x_{ij} = (AB)_{ji} = A_{(j)}B^{(i)} = (B^T)_{(i)}(A^T)_{(j)} = y_{ij}$$

■

1.4 След матрицы

Определение 11. Следом матрицы называется сумма элементов на её главной диагонали.

Утверждение 1.7 (Свойства следа).

1. $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$;
2. $\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \text{tr}(\lambda A) = \lambda \text{tr}(A)$;
3. $\text{tr}(A^T) = \text{tr}(A)$.

Утверждение 1.8.

$$\forall A \in \text{Mat}_{m \times n}, B \in \text{Mat}_{n \times m} \quad \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$$

Доказательство. Пусть $X = AB, Y = BA$. Тогда:

$$\text{tr}(X) = \sum_{i=1}^m x_{ii} = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}b_{ji} \right) = \sum_{j=1}^n y_{jj} = \text{tr}(Y)$$

■

2 Системы линейных уравнений

Определение 12. СЛУ называется совместной, если у неё есть хотя бы одно решение.

Определение 13. Две СЛУ от одних и тех же неизвестных называются эквивалентными, если множество их решений совпадает.

2.1 Элементарные преобразования СЛУ

Определение 14 (Элементарные преобразование СЛУ).

1. К i -му уравнению прибавить j -е, домноженное на $\lambda \in \mathbb{R}, i \neq j$;
2. Поменять местами i -ю и j -ю строки, $i \neq j$;
3. Умножить i -е уравнение на $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Лемма 2.1. Элементарные преобразования СЛУ сохраняют множество её решений.

Доказательство. Заметим, что для всякого элементарного преобразования СЛУ существует обратное:

Прямое преобразование	Обратное преобразование
$\Theta_1(i, j, \lambda)$	$\Theta_1(i, j, -\lambda)$
$\Theta_2(i, j)$	$\Theta_2(i, j)$
$\Theta_3(i, \lambda)$	$\Theta_3(i, \frac{1}{\lambda})$

Значит всякое решение СЛУ сохраняется при её элементарном преобразовании. ■

Определение 15. Ведущим элементом строки называется её первый ненулевой элемент.

Определение 16. Матрица называется ступенчатой (или имеет ступенчатый вид), если номера ведущих элементов её ненулевых строк строго возрастают, а все нулевые строки находятся в конце.

Определение 17. Матрица имеет улучшенный ступенчатый вид, если:

1. Она имеет ступенчатый вид;
2. Ведущие элементы всех ненулевых строк равны 1;
3. В одном столбце с ведущим элементом находятся только нули.

Теорема 2.2. Всякую матрицу элементарными преобразованиями можно привести к улучшенному ступенчатому виду.

Определение 18. СЛУ называется однородной (ОСЛУ), если все её правые части равны нулю.

Утверждение 2.3. Всякая ОСЛУ имеет тривиальное решение и всякая ОСЛУ, у которой переменных больше, чем уравнений, имеет нетривиальное решение.

Определение 19. Пусть $A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R}), x \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$. Если СЛУ $Ax = b$ совместна, то её частое решение – это какое-нибудь одно её решение.

Лемма 2.4. Пусть $A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R}), x \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}^m$, СЛУ $Ax = b$ совместна, $L \subseteq \mathbb{R}^n$ – её множество решений, $x_0 \in L$ – её частное решение, $S \subseteq \mathbb{R}^n$ – множество решений ОСЛУ. Тогда:

$$L = x_0 + S, \text{ где } x_0 + S := \{x_0 + v \mid v \in S\}$$

Доказательство. Так как $x_0 \in L$, имеем $Ax_0 = b$. Рассмотрим $u \in L$. Пусть $v = u - x_0$, то есть $u = x_0 + v$, значит:

$$Av = A(u - x_0) = Au - Ax_0 = b - b = 0 \implies v \in S \implies u \in x_0 + S \implies L \subseteq x_0 + S$$

Теперь докажем, что $x_0 + S$ также подмножество L :

$$v \in S \implies Av = 0 \implies A(x_0 + v) = Ax_0 + Av = b + 0 = b \implies x_0 + v \in L \implies x_0 + S \subseteq L$$

■

Утверждение 2.5. Всякое элементарное преобразование строк матрицы $A \in \text{Mat}_{m \times n}$ реализуется при помощи умножения слева на подходящую элементарную матрицу:

$$\Theta_1(i, j, \lambda): A \mapsto U_1(i, j, \lambda) \cdot A$$

Где $U_1(i, j, \lambda)$ – единичная матрица, в которой $U_{1ij} = \lambda$.

$$\Theta_2(i, j): A \mapsto U_2(i, j) \cdot A$$

Где $U_2(i, j)$ – единичная матрица, в которой $U_{2ii} = U_{2jj} = 0, U_{2ij} = U_{2ji} = 1$.

$$\Theta_3(i, \lambda): A \mapsto U_3(i, \lambda) \cdot A$$

Где $U_3(i, \lambda)$ – единичная матрица, в которой $U_{3ii} = \lambda$.

Утверждение 2.6. Всякое элементарное преобразование столбцов матрицы $A \in \text{Mat}_{m \times n}$ реализуется при помощи умножения справа на подходящую элементарную матрицу. Причём элементарные матрицы для преобразования столбцов будут иметь вид, аналогичный транспонированным элементарным матрицам для преобразования строк.

2.2 Перестановки

Определение 20. Перестановкой (или подстановкой) множества $M = \{1, \dots, n\}$ называется биективное отображение $\sigma: M \rightarrow M$. Множество S_n – множества всех таких перестановок.

Определение 21. Пусть $\sigma \in S_n, i, j \in \{1, \dots, n\}, i \neq j$. Говорят, что неупорядоченная пара $\{i, j\}$ образует инверсию в σ , если $i - j$ и $\sigma(i) - \sigma(j)$ имеют разный знак.

Определение 22. Знак перестановки $\sigma \in S_n$ – это число:

$$\text{sgn}(\sigma) := (-1)^{\text{число инверсий в } \sigma}$$

Определение 23. Перестановка $\sigma \in S_n$ называется чётной, если $\text{sgn}(\sigma) = 1$. Перестановка называется нечётной, если $\text{sgn}(\sigma) = -1$.

2.3 Обратные матрицы

Определение 24. Пусть $A \in M_n$. Матрица $B = A^{-1} \in M_n$ называется обратной к A , если $AB = BA = E$.

Утверждение 2.7. Если у матрицы существует обратная, то она единственная.

Утверждение 2.8. Если $A, B \in M_n$ таковы, что $AB = E$, то $BA = E$.