

Rwa kulszowa

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Łagodne utrzymanie ruchu, poprawa tolerancji obciążenia i ślizgu struktur nerwowych bez nasilania objawów w nodze.

Uwaga kliniczna
W rwie nie ma jednego dobrego kierunku ruchu dla wszystkich. Wybieraj ćwiczenia, po których ból/drętwienie nie schodzi dalej do stopy. Pilna konsultacja: drętwienie okolicy krocza, zaburzenia oddawania moczu/stolca, szybko narastające osłabienie nogi lub objawy obustronne.

1 JOGA 1 Sfinks -> niska kobra, jeśli tolerowana

Położ się na brzuchu, oprzyj przedramiona pod barkami i unieś klatkę bez zaciskania pośladków. Biodra zostają na podłożu. Oddychaj spokojnie. Wykonuj tylko wtedy, gdy objawy w nodze nie nasilają się ani nie schodzą niżej. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Ruch ma być komfortowy; może być odczuwalny w plecach, ale nie powinien zwiększać promieniowania. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Pozycja dziecka -> klęk podparty

Usiądź pośladkami w kierunku pięt, kolana ustaw szerzej i wyciągnij ręce do przodu. Nie wciskaj się na siłę w zgięcie. Jeśli zgięcie nasila promieniowanie, pominię tę pozycję. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Wybieraj tylko kierunek, po którym noga czuje się tak samo lub lepiej. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Ślizg nerwu w pozycji funkcjonalnej

Położ się na plecach. Zegnij biodro i kolano do wygodnej pozycji, podtrzymując udo rękami. Powoli prostuj kolano i jednocześnie kieruj palce stopy do siebie; wracając, zegnij kolano i rozluźnij stopę. To ma być płynny ślizg, nie mocne rozciąganie. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Bez długiego przytrzymania i bez wywoływania narastającego mrowienia. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Most z marszem naprzemiennym

Leżenie na plecach, kolana ugięte, stopy na szerokość bioder. Lekko napnij brzuch i unieś miednicę do linii barki-biodrakolana. Opuść powoli. Nie wyginaj mocno odcinka lędźwiowego. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ciężar rozłóż równo na obu stopach. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Bird dog kolano-łokieć

Klęk podparty. Utrzymaj spokojny tułów i wyprostuj jednocześnie jedną nogę oraz przeciwną rękę. Wróć bez kołysania miednicą i zmień stronę. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Zakres kończyny mniejszy, jeśli pojawia się ból promieniujący. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.