

Przodopochylenie miednicy

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Nauka ustawienia miednicy bliżej pozycji neutralnej, poprawa kontroli mięśni brzucha i pośladków oraz tolerancji wyprostu biodra.

Uwaga kliniczna
Samo przodopochylenie nie jest chorobą. Ćwiczymy wtedy, gdy to ustawienie wiąże się z bólem, przeciążeniem lub słabą kontrolą ruchu.

1 JOGA 1 Niski wykrok z podwinięciem miednicy - wariant funkcjonalny

Z kłku wysuń jedną stopę do przodu. Delikatnie podwiń miednicę „ogon pod siebie”, napnij pośladek nogi zakrocznej i przesun tułów minimalnie do przodu. Nie rób przeprostu lędźwi. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Rozciąganie powinno być z przodu biodra nogi zakrocznej. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Pozycja dziecka -> klęk podparty

Usiądź w kierunku pięt i wydłuż plecy, wyciągając ręce przed siebie. Oddychaj do dolnych żeber i rozluźnij odcinek lędźwiowy. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie dociskaj pośladków na siłę do pięt. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Tyłopochylenie miednicy w leżeniu - wariant funkcjonalny

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Na wydechu delikatnie zbliż dolne żebra do miednicy i spłaszcz lędźwie do podłoża. Wróć do neutralnej pozycji bez odrywania stóp. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch ma pochodzić z miednicy, nie z mocnego napinania szyi. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Most z marszem naprzemiennym

Najpierw delikatnie ustaw miednicę neutralnie lub lekko podwiń, potem unieś biodra. Utrzymaj żebra „nad miednicą”, bez wypychania brzucha w górę. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Poczuj pośladki, nie tylko lędźwie. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wykrok w tył z kontrolą tułowia - wariant funkcjonalny

Stań prosto, zrób krok w tył i zejźdź w dół. Utrzymuj żebra nad miednicą, brzuch lekko aktywny i pośladek nogi podporowej napięty. Wróć do stania. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie pozwalaj, aby miednica uciekała w duży przeprost lędźwiowy. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.