

Koślawość kolan

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Poprawa kontroli osi biodro-kolano-stopa podczas przysiadu, wstawania i podporu jedno nogi.

Uwaga kliniczna
U dzieci i dorosłych część koślawości może wynikać z budowy anatomicznej. Ćwiczenia poprawiają kontrolę funkcjonalną, ale nie „prostują kości”.

1 JOGA 1 Wojownik II z dłuższym utrzymaniem

Stań szeroko. Ugnij przednie kolano nad stopą, pilnując aby kierowało się w stronę 2.-3. palca. Tylna noga wyprostowana, miednica stabilna. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Kolano nie zapada się do środka. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Krzesło - dłuższe utrzymanie

Stań na szerokość bioder, cofnij biodra jak do siadania i ugnij kolana. Utrzymuj stopy w trzech punktach podparcia i kolana nad stopami. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie ściskaj kolan na siłę; utrzymuj naturalną oś. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Odwodzenie nogi bokiem w leżeniu - progresja

Położ się na boku, dolna noga może być ugięta. Górną nogę wyprostuj i unieś lekko w bok, z palcami skierowanymi do przodu. Powoli opuść. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie obracaj miednicy do tyłu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Wstawanie z niższego krzesła

Usiądź na brzegu krzesła, stopy na szerokość bioder. Wstań, utrzymując kolana w osi stóp, potem powoli usiądź. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Możesz zacząć od wyższego krzesła. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Przysiad jedno nogi do krzesła - progresja

Stań przed wysokim krzesłem na jednej nodze. Cofnij biodro i dotknij pośladkiem siedziska, następnie wstań. Kolano utrzymuj nad 2.-3. palcem stopy. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Zaczynaj od bardzo wysokiego podparcia i małego zakresu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.