

# Koślawość kolan

**Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.**

**Cel**  
Poprawa kontroli osi biodro-kolano-stopa podczas przysiadu, wstawania i podporu jedno nogi.

**Uwaga kliniczna**  
U dzieci i dorosłych część koślawości może wynikać z budowy anatomicznej. Ćwiczenia poprawiają kontrolę funkcjonalną, ale nie „prostują kości”.

## 1 JOGA 1 Wojownik II podtrzymująco

Stań szeroko. Ugnij przednie kolano nad stopą, pilnując aby kierowało się w stronę 2.-3. palca. Tylna noga wyprostowana, miednica stabilna. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Kolano nie zapada się do środka. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

## 2 JOGA 2 Krzesło podtrzymująco 2-3x/tydz.

Stań na szerokość bioder, cofnij biodra jak do siadania i ugnij kolana. Utrzymuj stopy w trzech punktach podparcia i kolana nad stopami. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie ściskaj kolan na siłę; utrzymuj naturalną oś. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

## 3 POZIOM 1 - łatwy Odwodzenie nogi bokiem w leżeniu - wariant podtrzymujący

Położ się na boku, dolna noga może być ugięta. Górną nogę wyprostuj i unieś lekko w bok, z palcami skierowanymi do przodu. Powoli opuść. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie obracaj miednicy do tyłu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

## 4 POZIOM 2 - średni Wstawanie - 2 serie 2-3x/tydz.

Usiądź na brzegu krzesła, stopy na szerokość bioder. Wstań, utrzymując kolana w osi stóp, potem powoli usiądź. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Możesz zacząć od wyższego krzesła. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

## 5 POZIOM 3 - trudniejszy Przysiad jedno nogi do krzesła - wariant podtrzymujący

Stań przed wysokim krzesłem na jednej nodze. Cofnij biodro i dotknij pośladkiem siedziska, następnie wstań. Kolano utrzymuj nad 2.-3. palcem stopy. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zaczniij od bardzo wysokiego podparcia i małego zakresu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.  
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.