

Płaskostopie

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Aktywacja mięśni krótkich stopy, poprawa kontroli łuku podłużnego i równowagi bez „zaciskania” palców.

Uwaga kliniczna
Ćwiczenia mogą poprawiać funkcję stopy, ale nie każda płaska stopa wymaga korekcji. Szczególnie u dzieci ocena zależy od wieku, elastyczności i objawów.

1 JOGA 1 Góra - Tadasana z „trójnogiem” stopy - wariant podtrzymujący

Stań boso. Dociśnij trzy punkty: piętę, podstawę palucha i podstawę małego palca. Palce rozluźnione. Delikatnie unieś łuk stopy bez podwijania palców. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ciężar równomiernie na całej stopie. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Pies z głową w dół - wariant podtrzymujący

Z podporu unieś biodra w górę i cofnij je. Pięty mogą zostać uniesione. Wydłużaj tył nóg i łydki bez bólu w stopie. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie wymuszaj kontaktu pięt z podłożem. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Krótka stopa podczas chodu i stania

Siedząc lub stojąc, utrzymaj piętę i głowy I oraz V kości śródstopia na podłożu. Delikatnie „skróć” stopę, przyciągając przodostopie w stronę pięty bez zginania palców. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Palce mają pozostać długie i rozluźnione. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Wspięcia podtrzymujące 2-3x/tydz.

Stań przy ścianie. Utrzymaj trójnog stopy i unieś piętę. Powoli zejdź w dół, nie pozwalając kostkom zapadać się do środka. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nacisk pozostaje także pod podstawą palucha. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Stanie jednonóż z krótką stopą - wariant podtrzymujący

Stań na jednej nodze i utrzymaj aktywny łuk bez chwytania podłoża palcami. Gdy jest łatwo, wykonuj powolne ruchy drugą nogą w przód, bok i tył. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Kolano ustawione nad stopą, miednica stabilna. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.