

Wzmocnienie mięśni core

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Poprawa kontroli tułowia podczas ruchu kończyn, bez wstrzymywania oddechu i bez nadmiernego usztywnienia.

Uwaga kliniczna
„Core” to nie tylko mięśnie brzucha. W ćwiczeniach współpracują przepona, mięśnie brzucha, grzbietu, dna miednicy i obręczy biodrowej.

1 JOGA 1 Deska na kolanach lub stopach

Oprzyj dłonie lub przedramiona pod barkami. Utrzymaj linię głowa-tułów-miednica. Zaczynij od wersji na kolanach, potem przejdź na stopy.

Dawka: 10-30 s x 2-4

Wskazówka: Oddychaj, nie zapadaj lędźwi.

2 JOGA 2 Łódka - łatwa wersja

Usiądź, ugnij kolana i odchyl tułów lekko do tyłu. Unieś jedną, a potem obie stopy, utrzymując długi kręgosłup. Ręce mogą trzymać uda.

Dawka: 10-20 s x 2-3

Wskazówka: Zmniejsz zakres, jeśli czujesz lędźwie bardziej niż brzuch.

3 POZIOM 1 - łatwy Napięcie brzucha + ślizg pięty

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Delikatnie napnij brzuch jak przed kaszlnięciem i wysuwaj jedną piętę po podłożu, nie zmieniając ustawienia miednicy.

Dawka: 6-10/stronę x 2

Wskazówka: Oddychaj swobodnie przez cały ruch.

4 POZIOM 2 - średni Dead bug

Leżenie na plecach, biodra i kolana około 90°. Utrzymując stabilny tułów, opuszczaj jedną piętę w stronę podłogi i wracaj. Trudniej: dodaj przeciwną rękę.

Dawka: 6-10/stronę x 2-3

Wskazówka: Plecy nie muszą być mocno dociśnięte - ważna jest kontrola bez bólu.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Deska z naprzemiennym dotknięciem barku

Pozycja wysokiej deski. Oderwij jedną dłoń i dotknij przeciwnego barku, nie kołysząc miednicą. Zmień stronę.

Dawka: 6-12/stronę x 2-3

Wskazówka: Ustaw stopy szerzej, jeśli trudno utrzymać stabilność.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.