

Wzmocnienie mięśni core

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Poprawa kontroli tułowia podczas ruchu kończyn, bez wstrzymywania oddechu i bez nadmiernego usztywnienia.

Uwaga kliniczna
„Core” to nie tylko mięśnie brzucha. W ćwiczeniach współpracują przepona, mięśnie brzucha, grzbietu, dna miednicy i obręczy biodrowej.

1 JOGA 1 Deska - dłuższa pauza

Oprzyj dłonie lub przedramiona pod barkami. Utrzymaj linię głowa-tułów-miednica. Zacznij od wersji na kolanach, potem przejdź na stopy. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Oddychaj, nie zapadaj lędźwi. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Łódka - łatwa wersja - progresja

Usiądź, ugnij kolana i odchyl tułów lekko do tyłu. Unieś jedną, a potem obie stopy, utrzymując długi kręgosłup. Ręce mogą trzymać uda. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Zmniejsz zakres, jeśli czujesz lędźwie bardziej niż brzuch. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Napięcie brzucha + ślizg pięty - progresja

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Delikatnie napnij brzuch jak przed kaszlnięciem i wysuwaj jedną piętę po podłożu, nie zmieniając ustawienia miednicy. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Oddychaj swobodnie przez cały ruch. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Dead bug - progresja

Leżenie na plecach, biodra i kolana około 90°. Utrzymując stabilny tułów, opuszczaj jedną piętę w stronę podłogi i wracaj. Trudniej: dodaj przeciwną rękę. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Plecy nie muszą być mocno dociśnięte - ważna jest kontrola bez bólu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Deska - dłuższa pauza

Pozycja wysokiej deski. Oderwij jedną dłoń i dotknij przeciwnego barku, nie kołysząc miednicą. Zmień stronę. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ustaw stopy szerzej, jeśli trudno utrzymać stabilność. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.