

Poprawa ruchomości całego kręgosłupa

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Łagodny ruch odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego w kilku kierunkach, bez forsowania końcowych zakresów.

Uwaga kliniczna
Przy osteoporozie, świeżym urazie, zawrotach głowy po ruchu szyi lub objawach neurologicznych zakres powinien ustalić fizjoterapeuta.

1 JOGA 1 Kot-krowa

W klęku podpartym na wydechu zaokrąglaj plecy i opuść głowę, a na wdechu delikatnie unieś mostek i kość ogonową. Ruch prowadź płynnie od miednicy po szyję.

Dawka: 8-12 cykli

Wskazówka: Nie dociskaj szyi do końcowego zakresu.

2 JOGA 2 Dziecko -> sfinks

Z pozycji dziecka przejdź płynnie do leżenia na brzuchu i podeprzyj się na przedramionach w sfinksie. Następnie wróć.

Dawka: 5-8 cykli

Wskazówka: Ruch spokojny, bez ostrego bólu i bez szarpania.

3 POZIOM 1 - łatwy Rotacja „otwieranie książki”

Leżenie na boku, biodra i kolana ugięte, ręce wyciągnięte przed sobą. Otwórz górną rękę do tyłu, prowadząc za nią klatkę piersiową. Kolana pozostają razem.

Dawka: 6-10/stronę

Wskazówka: Głowa może podążać za dłonią, jeśli nie wywołuje zawrotów.

4 POZIOM 2 - średni Wyprost piersiowy na krześle

Usiądź, oprzyj górną część pleców o oparcie. Dłonie za głowę. Delikatnie odchyl klatkę piersiową nad oparciem, bez dużego przeprostu lędźwi.

Dawka: 6-10 powt. x 2

Wskazówka: Ruch ma być głównie w piersiowym odcinku kręgosłupa.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Skłon + wyprost segmentalny w staniu

Z pozycji stojącej powoli opuszczaj brodę i zaokrąglaj kręgosłup od góry, schodząc tylko do wygodnego zakresu. Wróć powoli, ustawiając kręgi „jeden po drugim”.

Dawka: 5-8 powt.

Wskazówka: Nie wykonuj przy osteoporozie bez wcześniejszej konsultacji.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.