

Poprawa ruchomości całego kręgosłupa

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Łagodny ruch odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego w kilku kierunkach, bez forsowania końcowych zakresów.

Uwaga kliniczna
Przy osteoporozie, świeżym urazie, zawrotach głowy po ruchu szyi lub objawach neurologicznych zakres powinien ustalić fizjoterapeuta.

1 JOGA 1 Kot-krowa z oddechem

W klęku podpartym na wydechu zaokrąglaj plecy i opuść głowę, a na wdechu delikatnie unieś mostek i kość ogonową. Ruch prowadź płynnie od miednicy po szyję. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie dociskaj szyi do końcowego zakresu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2 Sfinks z aktywnym wydłużeniem

Z pozycji dziecka przejdź płynnie do leżenia na brzuchu i podeprzyj się na przedramionach w sfinksie. Następnie wróć. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Ruch spokojny, bez ostrego bólu i bez szarpania. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy Otwieranie książki z pełniejszym oddechem

Leżenie na boku, biodra i kolana ugięte, ręce wyciągnięte przed sobą. Otwórz górną rękę do tyłu, prowadząc za nią klatkę piersiową. Kolana pozostają razem. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Głowa może podążać za dłonią, jeśli nie wywołuje zawrotów. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni Wyprost piersiowy na krześle - progresja

Usiądź, oprzyj górną część pleców o oparcie. Dłonie za głowę. Delikatnie odchyl klatkę piersiową nad oparciem, bez dużego przeprostu lędźwi. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ruch ma być głównie w piersiowym odcinku kręgosłupa. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Skłon + wyprost segmentalny w staniu - progresja

Z pozycji stojącej powoli opuszczaj brodę i zaokrąglaj kręgosłup od góry, schodząc tylko do wygodnego zakresu. Wróć powoli, ustawiając kręgi „jeden po drugim”. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie wykonuj przy osteoporozie bez wcześniejszej konsultacji. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.