

Poprawa ruchomości całego kręgosłupa

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Łagodny ruch odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego w kilku kierunkach, bez forsowania końcowych zakresów.

Uwaga kliniczna
Przy osteoporozie, świeżym urazie, zawrotach głowy po ruchu szyi lub objawach neurologicznych zakres powinien ustalić fizjoterapeuta.

1 JOGA 1 Kot-krowa jako mobilizacja podtrzymująca

W klęku podpartym na wydechu zaokrąglaj plecy i opuść głowę, a na wdechu delikatnie unieś mostek i kość ogonową. Ruch prowadź płynnie od miednicy po szyję. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie dociskaj szyi do końcowego zakresu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Sfinks/kobra - płynna mobilizacja

Z pozycji dziecka przejdź płynnie do leżenia na brzuchu i podeprzyj się na przedramionach w sfinksie. Następnie wróć. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch spokojny, bez ostrego bólu i bez szarpania. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Otwieranie książki 2-3x/tydz.

Leżenie na boku, biodra i kolana ugięte, ręce wyciągnięte przed sobą. Otwórz górną rękę do tyłu, prowadząc za nią klatkę piersiową. Kolana pozostają razem. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Głowa może podążać za dłonią, jeśli nie wywołuje zawrotów. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Wyprost piersiowy na krześle - wariant podtrzymujący

Usiądź, oprzyj górną część pleców o oparcie. Dłonie za głowę. Delikatnie odchyl klatkę piersiową nad oparciem, bez dużego przeprostu lędźwi. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch ma być głównie w piersiowym odcinku kręgosłupa. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Skłon + wyprost segmentalny w staniu - wariant podtrzymujący

Z pozycji stojącej powoli opuszczaj brodę i zaokrąglaj kręgosłup od góry, schodząc tylko do wygodnego zakresu. Wróć powoli, ustawiając kręgi „jeden po drugim”. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie wykonuj przy osteoporozie bez wcześniejszej konsultacji. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.