

Ból głowy

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Zmniejszenie napięcia szyi i obręczy barkowej przy bólach napięciowych lub szyjnopochodnych oraz poprawa kontroli odcinka szyjnego.

Uwaga kliniczna
Te ćwiczenia nie są przeznaczone do nagłego, bardzo silnego bólu głowy ani bólu z niedowładem/drętwieniem twarzy lub kończyn, zaburzeniami mowy, widzenia, równowagi, gorączką ze sztywnością karku albo po urazie głowy.

1 JOGA 1 **Pozycja dziecka jako reset ruchowy**

Usiądź w kierunku pięt, oprzyj czoło na dłoniach lub poduszce i pozwól barkom opaść. Oddychaj spokojnie, wydłużając wydech. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Szyja ma być całkowicie rozluźniona. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 **Nogi na ścianie - Viparita Karani - wariant podtrzymujący**

Położ się na plecach blisko ściany i oprzyj na niej nogi. Podeprzyj głowę cienką poduszką, jeśli tego potrzebujesz. Rozluźnij szczękę i barki. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Pomiń, jeśli pozycja zwiększa ból głowy lub ciśnienie w głowie. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy **Cofnięcie brody w przerwach od pracy**

Siedząc lub leżąc, przesuń głowę poziomo do tyłu, jakbyś robił delikatny „podwójny podbródek”. Nie pochylaj głowy w dół. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch ma być mały i bez bólu promieniującego. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni **Łopatki w dół i lekko do tyłu - wariant podtrzymujący**

Usiądź prosto. Delikatnie ustaw łopatki w dół i do środka, bez wypinania klatki i bez unoszenia barków. Utrzymaj, rozluźnij. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie ściskaj łopatek maksymalnie. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy **Kontrolowana rotacja szyi - wariant podtrzymujący**

Usiądź prosto. Powoli obróć głowę w prawo do komfortowego zakresu, wróć do środka i powtórz w lewo. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Przerwij przy zawrotach, zaburzeniach widzenia lub wyraźnym nasileniu bólu głowy. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.