

# Ból karku

## +2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

**Cel**  
Utrzymanie ruchomości szyi, aktywacja głębokich mięśni szyi i poprawa pracy łopatek.

**Uwaga kliniczna**  
Przy bólu po urazie, nasilającej się słabości ręki, niezgrabności dłoni, zaburzeniach chodu lub nowych zaburzeniach zwieraczy potrzebna jest pilna ocena lekarska.

### 1 JOGA 1

#### Szczeniak - Uttana Shishosana - progresja

Z kłku podpartego cofnij biodra lekko w stronę pięt, a dłonie wysuń daleko do przodu. Klatkę kieruj w dół, ale szyję utrzymuj długą i swobodną. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Nie wciskaj głowy w podłogę. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

### 2 JOGA 2

#### Orzeł - same ramiona - progresja

Siedząc lub stojąc, skrzyżuj ramiona przed sobą i połącz przedramiona tak, jak pozwala zakres. Unieś łokcie lekko, oddychając w górną część pleców. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Barki pozostają z dala od uszu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

### 3 POZIOM 1 - łatwy

#### Cofnięcie brody przy ścianie

Przesuń głowę prosto do tyłu, utrzymując wzrok na wprost. Utrzymaj krótko i wróć. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie unosz ani nie opuszczaj brody. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

### 4 POZIOM 2 - średni

#### Izometria szyi - progresja

Położ dłonie na czole i delikatnie napieraj głową na dłonie bez ruchu. Powtórz z dłonią z boku głowy po obu stronach. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Siła umiarkowana, bez zaciskania zębów. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

### 5 POZIOM 3 - trudniejszy

#### Anioł przy ścianie - progresja

Oprzyj plecy o ścianę, broda lekko cofnięta. Przesuwaj ramiona po ścianie w górę i w dół w wygodnym zakresie, utrzymując łopatki pod kontrolą. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Nie wypychaj żeber do przodu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.  
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.