

Ból karku

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Utrzymanie ruchomości szyi, aktywacja głębokich mięśni szyi i poprawa pracy łopatek.

Uwaga kliniczna
Przy bólu po urazie, nasilającej się słabości ręki, niezgrabności dłoni, zaburzeniach chodu lub nowych zaburzeniach zwieraczy potrzebna jest pilna ocena lekarska.

1 JOGA 1

Szczeniak - Uttana Shishosana - wariant funkcjonalny

Z kłękę podpartego cofnij biodra lekko w stronę pięt, a dłonie wysuń daleko do przodu. Klatkę kieruj w dół, ale szyję utrzymuj długą i swobodną. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie wciskaj głowy w podłogę. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2

Orzeł - same ramiona - wariant funkcjonalny

Siedząc lub stojąc, skrzyżuj ramiona przed sobą i połącz przedramiona tak, jak pozwala zakres. Unieś łokcie lekko, oddychając w górną część pleców. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Barki pozostają z dala od uszu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy

Cofnięcie brody + mała rotacja

Przesuń głowę prosto do tyłu, utrzymując wzrok na wprost. Utrzymaj krótko i wróć. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie unosz ani nie opuszczaj brody. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni

Izometria szyi - wariant funkcjonalny

Połóż dłoń na czole i delikatnie napieraj głową na dłoń bez ruchu. Powtórz z dłonią z boku głowy po obu stronach. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Siła umiarkowana, bez zaciskania zębów. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Anioł przy ścianie - wariant funkcjonalny

Oprzyj plecy o ścianę, broda lekko cofnięta. Przesuwaj ramiona po ścianie w górę i w dół w wygodnym zakresie, utrzymując łopatki pod kontrolą. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Nie wypychaj żeber do przodu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.