

Drętwienie palców u dłoni

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Łagodny ruch szyi, łopatki i nerwów kończyny górnej po wcześniejszej ocenie przyczyny objawów.

Uwaga kliniczna
Drętwienie palców może pochodzić z szyi, nadgarstka, łokcia lub innych przyczyn. Zestaw należy dobrać do rozpoznania. Pilna ocena, jeśli narasta osłabienie/chwyt, pojawia się niezgrabność obu rąk, zaburzenia chodu lub nagłe objawy neurologiczne.

1 JOGA 1 Góra z rozluźnieniem barków

Stań prosto, dłonie skieruj do przodu, barki opuść i wydłuż szyję. Zrób 5-6 spokojnych oddechów, nie zaciskając palców.

Dawka: 30-45 s x 2

Wskazówka: Dłonie i szczeka pozostają rozluźnione.

2 JOGA 2 Anjali Mudra - dłonie przed klatką

Złącz dłonie przed mostkiem bez mocnego dociskania. Ustaw nadgarstki neutralnie lub tylko lekko zgięte. Oddychaj spokojnie.

Dawka: 20-30 s x 2

Wskazówka: Jeśli drętwienie się nasila, zmniejsz zgięcie nadgarstka lub pomiń.

3 POZIOM 1 - łatwy Cofnięcie brody + ustawienie łopatki

Usiądź prosto. Lekko cofnij brodę, a łopatkę po stronie objawów ustaw swobodnie w dół. Nie ciągnij barku na siłę.

Dawka: 5 s x 8-10

Wskazówka: Objawy w dłoni nie powinny narastać.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg nerwu pośrodkowego - delikatny

Ramię przy boku, łokieć zgięty. Powoli prostuj łokieć, jednocześnie odchylając nadgarstek i palce tylko do lekkiego napięcia, potem wróć. Stosuj szczególnie, gdy objawy obejmują kciuk, palec wskazujący i środkowy - po ocenie fizjoterapeuty.

Dawka: 6-10 powt.

Wskazówka: To ma być ślizg, nie mocne rozciąganie. Nie przytrzymuj końcowej pozycji.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Ślizg ramion po ścianie

Stań twarzą do ściany, przedramiona oprzyj o nią. Powoli przesuwaj ręce w górę, pozwalając łopatkom obracać się w górę, potem wróć.

Dawka: 8-12 x 2

Wskazówka: Przerwij, jeśli drętwienie wyraźnie narasta lub utrzymuje się po ćwiczeniu.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.