

Drętwienie palców u dłoni

+2. tydzień - Progresja - większa kontrola, nieco większy zakres lub dłuższy czas pracy.

Cel
Łagodny ruch szyi, łopatki i nerwów kończyny górnej po wcześniejszej ocenie przyczyny objawów.

Uwaga kliniczna
Drętwienie palców może pochodzić z szyi, nadgarstka, łokcia lub innych przyczyn. Zestaw należy dobrać do rozpoznania. Pilna ocena, jeśli narasta osłabienie/chwyt, pojawia się niezgrabność obu rąk, zaburzenia chodu lub nagłe objawy neurologiczne.

1 JOGA 1

Góra z rozluźnieniem barków - progresja

Stań prosto, dłonie skieruj do przodu, barki opuść i wydłuż szyję. Zrób 5-6 spokojnych oddechów, nie zaciskając palców. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Dłonie i szczeka pozostają rozluźnione. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

2 JOGA 2

Anjali Mudra - dłonie przed klatką - progresja

Złącz dłonie przed mostkiem bez mocnego dociskania. Ustaw nadgarstki neutralnie lub tylko lekko zgięte. Oddychaj spokojnie. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 30-45 s x 2-3

Wskazówka: Jeśli drętwienie się nasila, zmniejsz zgięcie nadgarstka lub pomiń. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

3 POZIOM 1 - łatwy

Cofnięcie brody przy ścianie

Usiądź prosto. Lekko cofnij brodę, a łopatkę po stronie objawów ustaw swobodnie w dół. Nie ciągnij barku na siłę. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Objawy w dłoni nie powinny narastać. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

4 POZIOM 2 - średni

Ślizg nerwu w większym bezbolesnym zakresie

Ramię przy boku, łokieć zgięty. Powoli prostuj łokieć, jednocześnie odchylając nadgarstek i palce tylko do lekkiego napięcia, potem wróć. Stosuj szczególnie, gdy objawy obejmują kciuk, palec wskazujący i środkowy - po ocenie fizjoterapeuty. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: To ma być ślizg, nie mocne rozciąganie. Nie przytrzymuj końcowej pozycji. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Ślizg ramion po ścianie z pauzą

Stań twarzą do ściany, przedramiona oprzyj o nią. Powoli przesuwaj ręce w górę, pozwalając łopatkom obracać się w górę, potem wróć. W tej fazie zwiększ zakres tylko wtedy, gdy technika pozostaje dobra i następnego dnia nie ma pogorszenia.

Dawka: 10-15 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Przerwij, jeśli drętwienie wyraźnie narasta lub utrzymuje się po ćwiczeniu. Jeśli objawy utrzymują się dłużej po ćwiczeniu, wróć do etapu 1.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.