

Drętwienie palców u dłoni

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Łagodny ruch szyi, łopatki i nerwów kończyny górnej po wcześniejszej ocenie przyczyny objawów.

Uwaga kliniczna
Drętwienie palców może pochodzić z szyi, nadgarstka, łokcia lub innych przyczyn. Zestaw należy dobrać do rozpoznania. Pilna ocena, jeśli narasta osłabienie/chwyt, pojawia się niezgrabność obu rąk, zaburzenia chodu lub nagłe objawy neurologiczne.

1 JOGA 1

Góra z rozluźnieniem barków - wariant podtrzymujący

Stań prosto, dłonie skieruj do przodu, barki opuść i wydłuż szyję. Zrób 5-6 spokojnych oddechów, nie zaciskając palców. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Dłonie i szczeka pozostają rozluźnione. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2

Anjali Mudra - dłonie przed klatką - wariant podtrzymujący

Złącz dłonie przed mostkiem bez mocnego dociskania. Ustaw nadgarstki neutralnie lub tylko lekko zgięte. Oddychaj spokojnie. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Jeśli drętwienie się nasila, zmniejsz zgięcie nadgarstka lub pomiń. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy

Cofnięcie brody w przerwach od pracy

Usiądź prosto. Lekko cofnij brodę, a łopatkę po stronie objawów ustaw swobodnie w dół. Nie ciągnij barku na siłę. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Objawy w dłoni nie powinny narastać. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni

Ślizg nerwu - dawka podtrzymująca

Ramię przy boku, łokieć zgięty. Powoli prostuj łokieć, jednocześnie odchylając nadgarstek i palce tylko do lekkiego napięcia, potem wróć. Stosuj szczególnie, gdy objawy obejmują kciuk, palec wskazujący i środkowy - po ocenie fizjoterapeuty. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: To ma być ślizg, nie mocne rozciąganie. Nie przytrzymuj końcowej pozycji. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Ślizg po ścianie 2-3x/tydz.

Stań twarzą do ściany, przedramiona oprzyj o nią. Powoli przesuwaj ręce w górę, pozwalając łopatom obracać się w górę, potem wróć. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Przerwij, jeśli drętwienie wyraźnie narasta lub utrzymuje się po ćwiczeniu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.