

Drętwienie pośladków

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Poprawa ruchu lędźwi i bioder oraz tolerancji pozycji siedzącej, jeśli przyczyna ma charakter mechaniczny i poważne przyczyny neurologiczne zostały wykluczone.

Uwaga kliniczna
Drętwienie obu pośladków lub okolicy krocza, zwłaszcza z zaburzeniami oddawania moczu/stolca, jest objawem alarmowym - nie ćwiczyć, tylko pilnie zgłosić się do pomocy medycznej.

1 JOGA 1 Gołąb na plecach - „4”

Leżąc na plecach, połóż kostkę jednej nogi na przeciwległym udzie. Przyciągnij udo do siebie tylko do łagodnego rozciągania pośladka.

Dawka: 20-30 s/stronę x 2

Wskazówka: Nie dociskaj kolana na siłę.

2 JOGA 2 Kot-krowa

W kłku podpartym naprzemiennie zaokrąglaj i delikatnie wyginaj kręgosłup, poruszając miednicą.

Dawka: 8-12 cykli

Wskazówka: Wybierz zakres, który nie zwiększa drętwienia.

3 POZIOM 1 - łatwy Przetaczanie miednicy w leżeniu

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Naprzemiennie delikatnie spłaszczaj lędźwie i wracaj do lekkiego łuku.

Dawka: 10-15 powt.

Wskazówka: Ruch ma być mały i płynny.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg nerwu kulszowego

Leżenie na plecach. Unieś udo, podtrzymując je rękami. Prostuj i zginaj kolano w małym zakresie, synchronizując ruch stopy tak, aby nie utrzymywać napięcia.

Dawka: 8-12/stronę

Wskazówka: Bez nasilania drętwienia po ćwiczeniu.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Most biodrowy

Unieś miednicę z leżenia na plecach, utrzymując ciężar na obu stopach i spokojny oddech. Powoli wróć.

Dawka: 8-12 x 2-3

Wskazówka: Jeśli objawy stają się bardziej rozlane lub schodzą niżej do nogi - przerwij.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.