

Drętwienie pośladków

+4. tydzień - Etap funkcjonalny - mniej podparcia, większa kontrola i tolerancja obciążenia.

Cel
Poprawa ruchu lędźwi i bioder oraz tolerancji pozycji siedzącej, jeśli przyczyna ma charakter mechaniczny i poważne przyczyny neurologiczne zostały wykluczone.

Uwaga kliniczna
Drętwienie obu pośladków lub okolicy krocza, zwłaszcza z zaburzeniami oddawania moczu/stolca, jest objawem alarmowym - nie ćwiczyć, tylko pilnie zgłosić się do pomocy medycznej.

1 JOGA 1 Gołąb na plecach - „4” - wariant funkcjonalny

Leżąc na plecach, połóż kostkę jednej nogi na przeciwległym udzie. Przyciągnij udo do siebie tylko do łagodnego rozciągania pośladka. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Nie dociskaj kolana na siłę. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

2 JOGA 2 Kot-krowa + przejście do neutralnej stabilizacji

W kłku podpartym naprzemiennie zaokrąglaj i delikatnie wyginaj kręgosłup, poruszając miednicą. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 30-60 s x 2-3

Wskazówka: Wybierz zakres, który nie zwiększa drętwienia. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

3 POZIOM 1 - łatwy Przetaczanie miednicy w leżeniu - wariant funkcjonalny

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Naprzemiennie delikatnie spłaszczaj lędźwie i wracaj do lekkiego łuku. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Ruch ma być mały i płynny. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg nerwu w pozycji funkcjonalnej

Leżenie na plecach. Unieś udo, podtrzymując je rękami. Prostuj i zginaj kolano w małym zakresie, synchronizując ruch stopy tak, aby nie utrzymywać napięcia. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Bez nasilania drętwienia po ćwiczeniu. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Most z marszem naprzemiennym

Unieś miednicę z leżenia na plecach, utrzymując ciężar na obu stopach i spokojny oddech. Powoli wróć. Wykonuj wolniej i z mniejszym podparciem lub większą kontrolą, ale bez utraty jakości ruchu.

Dawka: 8-15 powt. x 2-4 serie

Wskazówka: Jeśli objawy stają się bardziej rozlane lub schodzą niżej do nogi - przerwij. Jakość ruchu jest ważniejsza niż zakres i liczba powtórzeń.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.