

# Drętwienie pośladków

**Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.**

**Cel**  
Poprawa ruchu lędźwi i bioder oraz tolerancji pozycji siedzącej, jeśli przyczyna ma charakter mechaniczny i poważne przyczyny neurologiczne zostały wykluczone.

**Uwaga kliniczna**  
Drętwienie obu pośladków lub okolicy krocza, zwłaszcza z zaburzeniami oddawania moczu/stolca, jest objawem alarmowym - nie ćwiczyć, tylko pilnie zgłosić się do pomocy medycznej.

## **1 JOGA 1 Gołąb na plecach - „4” - wariant podtrzymujący**

Leżąc na plecach, połóż kostkę jednej nogi na przeciwległym udzie. Przyciągnij udo do siebie tylko do łagodnego rozciągania pośladka. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie dociskaj kolana na siłę. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

## **2 JOGA 2 Kot-krowa jako mobilizacja podtrzymująca**

W klęku podpartym naprzemiennie zaokrąglaj i delikatnie wyginaj kręgosłup, poruszając miednicą. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Wybierz zakres, który nie zwiększa drętwienia. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

## **3 POZIOM 1 - łatwy Przetaczanie miednicy w leżeniu - wariant podtrzymujący**

Leżenie na plecach, kolana ugięte. Naprzemiennie delikatnie spłaszczaj lędźwie i wracaj do lekkiego łuku. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch ma być mały i płynny. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

## **4 POZIOM 2 - średni Ślizg nerwu - dawka podtrzymująca**

Leżenie na plecach. Unieś udo, podtrzymując je rękami. Prostuj i zginaj kolano w małym zakresie, synchronizując ruch stopy tak, aby nie utrzymywać napięcia. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Bez nasilania drętwienia po ćwiczeniu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

## **5 POZIOM 3 - trudniejszy Most - 2 serie kontrolne 2-3x/tydz.**

Unieś miednicę z leżenia na plecach, utrzymując ciężar na obu stopach i spokojny oddech. Powoli wróć. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Jeśli objawy stają się bardziej rozlane lub schodzą niżej do nogi - przerwij. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.  
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.