

Drętwienie łydek

Podtrzymanie - Utrzymanie efektu - mniejsza częstotliwość, dobra jakość i funkcjonalne warianty.

Cel
Łagodny ruch nerwowo-mięśniowy kończyny dolnej, poprawa pracy stawu skokowego i łydki po wcześniejszej ocenie źródła drętwienia.

Uwaga kliniczna
Nagłe drętwienie z wyraźnym osłabieniem stopy, opadaniem stopy, obustronnymi objawami lub zaburzeniami zwieraczy wymaga pilnej oceny. Obrzęk, zaczerwienienie i ból łydki wymagają wykluczenia problemu naczyniowego.

1 JOGA 1 Pies z głową w dół z ugiętymi kolanami - wariant podtrzymujący

Z podporu unieś biodra. Kolana pozostaw lekko ugięte i naprzemiennie kieruj pięty w dół, bez mocnego ciągnięcia łydki. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Nie trzymaj rozciągnięcia, jeśli wywołuje mrowienie. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

2 JOGA 2 Skłon do jednej nogi w siadzie - łagodny - wariant podtrzymujący

Usiądź z jedną nogą wyprostowaną, drugą ugiętą. Pochyl się z bioder tylko do lekkiego napięcia tyłu nogi. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 30-60 s x 1-2, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Przy drętwieniu nie pogłębiaj rozciągania nerwu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

3 POZIOM 1 - łatwy Pompowanie stopy - wariant podtrzymujący

Siedząc lub leżąc, naprzemiennie kieruj palce stopy do siebie i od siebie w pełnym, komfortowym zakresie. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Ruch płynny, bez bolesnego skurczu. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

4 POZIOM 2 - średni Ślizg nerwu - dawka podtrzymująca

Usiądź prosto. Prostuj kolano i jednocześnie unieś głowę; wracając zginaj kolano i lekko opuszczaj brodę. Ruch wykonuj płynnie, bez przytrzymania. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Zakres ma nie zwiększać mrowienia po serii. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

5 POZIOM 3 - trudniejszy Wspięcia podtrzymujące 2-3x/tydz.

Stań przy ścianie. Unieś piętę jednej nogi, powoli opuść. Utrzymuj stopę w osi i nie skręcaj kostki. Traktuj jako ćwiczenie podtrzymujące: pełny komfortowy zakres, dobra technika i regularność zamiast maksymalnej intensywności.

Dawka: 8-12 powt. x 2 serie, 2-3x/tydz.

Wskazówka: Jeśli pojawia się narastająca słabość, zakończ i skonsultuj objaw. Utrzymuj wersję, po której funkcja jest dobra także następnego dnia.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.